QL
675
N39
Birds

NACHTRÄGE
ZU
NEHRKORN'S EIERKATALOG

Smithsonian Institution
Libraries

Alexander Wetmore

1946 *Sixth Secretary* 1953

G. Wilmore

QL
675
N39
Birds

NACHTRÄGE

ZU

NEHRKORN'S EIERKATALOG

VON

ADOLPH NEHRKORN

MIT 2 EIERTAFELN IN FARBIGEM STEINDRUCK

BERLIN
VERLAG VON R. FRIEDLÄNDER & SOHN
1914

Vorwort.

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage meines Eierkataloges im Jahre 1910 hat sich meine Sammlung um 382 Spezies vergrößert. Ich lasse die Aufzählung und Beschreibung derselben im Anschluß an den Hauptkatalog hier folgen und füge gleichzeitig ein kurzes, übersichtliches Verzeichnis der ganzen Sammlung hinzu.

Braunschweig, im Mai 1914.

Adolph Nehrkorn.

Fam. Casuariidae.

5441. (14) XXVII, —. **Casuarius aurantiacus Rothsch.** Deutsch-Neu-Guinea (Berl. Zool. Gart.).
Hell- bis dunkelgraugrün mit dicker granulierter Schicht; die Vertiefungen zwischen den Mamillen hellgelblichgrün, elliptisch. 136×89 mm.

Fam. Megapodiidae.

5442. (67) XXII, 452. **Megapodius brunneiventris, A. B. Meyer** . . . . . Südost-Neu-Guinea.
Hellrotbraun, fleischfarben, ohne Glanz, elliptisch, 81×50 mm.

Fam. Cracidae.

5443. (87) XXII, 480. **Crax grayi, Ogilvie Grant** = *sclateri, Gr.* Vaterl. unbek. (A. d. Zool. Gart.)
Weiß, rauhschalig, nahezu elliptisch. 79—89 ×60—64 mm.

5444. (91) „ 483. **Crax alberti, Fraser** . . . . . Columbien (A. d. Zool. Gart.).
Weiß, rauhschalig, nahezu elliptisch. 88—89 ×60—64 mm.

5445. (92) „ 484. **Nothocrax urumutum (Spix)** . . . . . Guayana (A. d. Zool. Gart.).
Weiß, mit sehr stark gekörnter Schale. 70,5×53 mm.

5446. (104) „ 512pt. **Ortalis pallidiventris, Ridgw.** . . . . Yucatan.
Rahmweiß bis gelblich, rauhschalig und elliptisch. 55×38 mm.

Fam. Tetraonidae.

5447. (118) XXII, 67. **Tetrao kamtschaticus (Kittl.)** . . . Kamtschatka.
Wie urogallus.

Anmerkungen: Die erste Zahl vor jeder Species ist die fortlaufende Nummer des Hauptkataloges; die darunterstehende eingeklammerte Zahl ist die Nummer, hinter welche die Species einzureihen ist.

Die römische Ziffer bedeutet die Nummer des Bandes des „Catalogue of the British Museum“ und die betreffende Seitenzahl.

Fam. Phasianidae.

5448. XXII, —. **Ammoperdix cholmleyi Ogilvie Grant** . . Nubien
(144) Hellerbsengelb und stark glänzend. 36—38,5 ×27—30 mm. (A. d. Zool. Gart.).

5449. „ 168. **Francolinus hildebrandti Cab.** . Deutsch-Ost-Afrika.
(164) Hellgelblich weiß. 42—33 mm.

5450. „ 169. **Francolinus squamatus Cass.** . . . . . Congo.
(164a) Rotbraun wie dunkle Milchschokolade, mit feinen weißen, aber flachen Poren, dickschalig. 40,5×35 mm.

5451. „ 172. **Francolinus erckeli (Rüpp.)** . . . . . Erythraea.
(165) Rotbräunliche Grundfarbe. Auf der ganzen Fläche verteilt matt dunkelbräunliche Fleckchen. 47×37 mm.

5452. „ 176. **Pternistes humboldti (Peters)** . . Deutsch-Ost-Afrika
(166) Einfarbig graugelb wie sehr helle Milchschokolade. 44×36 mm. (Mikindani).

5453. „ 179. **Pternistes boehmi Reichn.** . . . Deutsch-Ost-Afrika
(167) Rötlichbraun, auch violettgrau. 45×33 mm. (Langenburg).

5454. „ 193. **Perdix hodgsoniae (Hodgs)** . . . . . Thibet.
(173) Wie die Eier unserer Rebhühner gefärbt, aber bedeutend größer. 37,5×28 mm.

5455. „ —. **Arboricola batemani Oates** . . . . . Birma.
(179) Weiß, glattschalig, stark glänzend. 37×29 mm.

5456. „ 211. **Arboricola intermedia Blyth** . . . . Nord-Cachar.
(180) Weiß, glattschalig, stark glänzend. 40×30 mm.

5457. „ 341. **Chrysolophus obscurus (Schl.)** China (A. d. Zool. Gart.).
(240) Sehr matt rötlichgrau. 43×34 mm.

Fam. Numididae.

5458. XXII, —. **Guttera makondorum Grote** . . Deutsch-Ost-Afrika.
(261) Hellgelbbraun. 51×43 mm. (Mikindani).

Fam. Odontophoridae.

5459. XXII, —. **Oreortyx confinis Anthony** . . . . . Kalifornien
(269) (Aus dem Southwest-Museum Los Angeles Californien, dem ich viele Seltenheiten verdanke). Gelblichweiß mit einem Stich ins Rötliche, mithin nicht verschieden von pictus. 33×27 mm. (San Gorgonio Pass).

5460. „ 432. **Odontophorus guianensis (Gm.)** . . . Brit. Guayana.
(283) Weiß. 36×29 mm.

Fam. Pteroclidae.

5461. XXII, 21. **Pteroclis decoratus Cab.** . . . . . Ost-Afrika.
(311)
Ölgrau mit mattgraugelben und violettgrauen gleichmäßig verteilten Unter- und etwas dunkleren nicht markierten Oberflecken. Unseren arenarius-Eiern sehr ähnlich, nur weit kleiner. 37×26 mm.

Fam. Treronidae.

5462. XXI, 18. **Vinago australis (L.)** . . . . . Madagascar.
(320)
36—37×27 mm.

5463. „ 140. **Thoracotreron johannis Scl.** . . . . Neu-Pommern.
(351)
Sehr gestreckt wie die meisten Gattungsverwandten. 33×23 mm.

Fam. Peristeridae.

5464. XXI, 373. **Zenaidura yucatanensis Lawr.** . . . . . Yucatan.
(418)
28×21 mm.

Fam. Gouridae.

5465. XXI, 623. **Goura albertisi Salvad.** . . . . Südost-Neu-Guinea
(502)
Weiss. 60×40 mm. (A. d. Z. G.).

Fam. Rallidae.

5466. XXIII, 137. **Creciscus coturniculus (Ridgw.)** . . . . Kalifornien
(561)
Die von Chas. S. Thompson gesammelten hochinteressanten und sehr seltenen Eier haben weiße Grundfarbe mit nur nadelstichgroßen rostbraunen und auch helleren Flecken. Es soll auch crêmefarbige Eier mit dunkelrötlichbraunen Flecken geben. 26—26,5×19 mm. (San Diego Co.).
(Abbildung s. Tafel VI, Fig. 6.)

Fam. Procellariidae.

5467. XXV, 361. **Garrodia nereis (Gould)** . . . . . Neu-Seeland.
(653)
Gelblichweiß mit sehr feinen, meist nur nadelstichgroßen, schwarzbraunen Ober- und violettgrauen Schalenflecken. 34×26 mm.

Fam. Puffinidae.

5468. XXV, 389. **Puffinus nativitatis Streets.** . . . . Laysan-Insel.
(674)
Weiß. 65×44,5 mm.

5469. XXV, 407. **Oestrelata phaeopygia (Salv.)** . . . Sandwich-Insel.
(679) Weiß mit nur sehr geringem Glanze wie alle Puffiniden. 61×45 mm.

5470. „ 409. **Oestrelata hypoleuca Salv.** . . . . . Laysan-Insel.
(680) Weiß. 50×37 mm.

Fam. Alcidae.

5471. XXV, 590. **Brachyrhamphus marmoratus (Gm.)** . . Alaska
(725) Schmutzigweiß mit ganz gleichmäßig verteilten feinen rostbraunen Ober- und violettgrauen Unterflecken. 64×38 mm. (St. Lawrence-Isl.).

5472. „ 594. **Micruria hypoleuca (Xantus)** . . . . . Mexiko
725a) Ich erhielt zwei extreme Farbenvaritäten. Das eine Ei ist dunkelgraugelb mit dunkelgrauen bis nahezu schwarzen, meist verwischten größeren und kleineren Flecken, die am stumpfen Ende gedrängter stehen. Das zweite Ei hat sehr hellgrauweiße Grundfarbe mit gleichmäßig verteilten violetten Schalen- und rostbraunen mittleren Oberflecken. 50—55×35—37 mm. (Los Coronados-Isl.).
(Abbildungen s. Tafel VI, Fig. 1 und 2.)

Fam. Charadriidae.

5473. XXIV, 335. **Ibidorhynchus struthersi Vig.** . . . . Himalaya.
912 Hellgrauer Grund mit rostbraunen, meist kleineren sehr markierten runden oder nur selten verwischten Ober- und violetten schattenartigen Unterflecken. 51—53×37 mm.

5474. „ 379. **Limosa novae-zealandiae Gray** = *uropygialis Gould* . . . . . Nordost-Sibirien.
(920) Von lapponica nicht verschieden.

Fam. Oedicnemidae.

5475. XXIV, 12. **Oedicnemus bistriatus (Wagl.)** . . Central-Amerika.
(1003) Sehr hellsandfarbig, aber sonst wie unsere oedicnemus gefärbt. 52×38 mm.

Fam. Otididae.

5476. XXIII, 292. **Lophotis gindiana (Oust.)** . . . . . Somaliland.
(1010) Schmutzig graugelb mit meist in die Länge gezogenen matt dunkel- und hellbraunen wolkenartigen Flecken, wie bei den meisten Trappen. 53×43 mm.

5477. XXIII, 309. **Trachelotis canicollis Reichn.** . . . . Somaliland.
(1017)
Gelbbräunliche Grundfarbe mit verwischten matt dunkel- und graubräunlichen trappenartigen Flecken. Sehr dickbauchig. 59×55 mm.

Fam. Rhinochetidae.

5478. XXIII, 246. **Rhinochetus jubatus Verr. & Des Murs.** . . . . . Neu-Caledonien.
(1045)
Hellgelblichgrau mit gleichmäßig verteilten violettgrauen Schalenflecken und meist scharf begrenzten schwarzbraunen und schwarzen Oberflecken. Ich möchte die Eier als Riesen-Oedicnemuseier bezeichnen. 61×46,5 mm.
(Abbildung s. Tafel VI Fig. 4.)

Fam. Ardeidae.

5479. XXVI, —. **Canchroma zeledoni Ridgw.** . . . . . Honduras.
(1119)
Grauweiß bis bläulich mit fast nur am stumpfen Pole sehr dicht stehenden feinen rotbräunlichen Flecken in nahezu kranzartiger Anhäufung. 48×38 mm.

5480. „ 250. **Dupetor nesophilus (Shp.)** . . . . Neu-Pommern.
(1146)
Weiß. 44,5×31,5 mm.

Fam. Anatidae.

5481. XXVII, 60pt. **Asarcornis leucoptera (Blyth)** . . . . Assam.
(1167)
Schmutzig rötlichweiß. 71×51 mm.

Fam. Falconidae.

5482. I, 85. **Parabuteo unicinctus Temm.** . . . . . Chile.
(1405)
Wie unsere Palumbarius-Eier, nur kleiner. 55×41 mm.

5483. „ —. **Tachytriorchis sennetti Allen.** . . . Mexiko (Tamaulipas).
(1438)
Weiß mit wenigen rostbraunen Pünktchen und Haarstrichen. Vermutlich kommen auch, wie bei den Verwandten, dunklere Eier vor. 62,5×46,5 und 62×45 mm.

5484. „ —. **Buteo zimmermanni Ehmcke** . . . . . Dobrudscha.
(1445)
Wie vulgaris.

5485. „ —. **Buteo menetriesi Bogd.** . . . . . Kaukasus.
(1445a)
Wie vulgaris.

5486. I, (1445b) —. **Rupornis griseicauda Ridgw.** . . . Mexiko (Tamaulipas).
Schmutzigweiß mit wenigen verwischten graubläulichen Flecken, oder mit sperberartigen in die Länge gezogenen Flatschen und Klecksen. 42×35,5 und 46×36 mm.

5487. „ (1485) —. **Archibuteo strophiatus (Hodgs.)** = *hemiptilopus Blyth* . . . . . Mongolei.
Wie lagopus.

5488. „ (1490) 266. **Spizaëtus coronatus (L.)** . . . . . West-Afrika (A. d. Z. G.).
In der Farbe und Form unserer Astur palumbarius. Tief dunkelgrün durchscheinend. 70×54 mm.

5489. „ (1523) 339. **Elanus leucurus (Vieill.)** . . . . . Costa Rica.
Von der typischen und charakterischen Fleckung der bekannten caeruleus nicht abweichend. 38×31,5 mm.

5490. „ (1535) 382. **Falco peregrinator Sundev.** . . . . . Nord-Cachar.
In der Färbung von peregrinus nicht verschieden, und in allen Variationen desselben vorkommend. 50—52×40—43 mm.

5491. „ (1544) 397. **Falco severus Horsf.** . . . . . Nord-Cachar.
Wie subbuteo. Durchschnittlich 41×31 mm.

Fam. Bubonidae.

5492. II, (1584) 5. **Ketupa flavipes (Hodgs.)** . . . . . Assam.
53×44 mm.

5493. „ (1590) 19pt. **Bubo pacificus Cass.** . . . . Kalifornien (San Juan).
54,5×46,5 mm.

5494. „ (1591) —. **Bubo kiautschensis Reichn.** . . . . . Kiautschou.
62×48,5 mm.

5495. „ (1597) 37. **Huhua nipalensis Hodgs.** . . . . . Assam.
52×44 mm.

5496. „ (1610) 98. **Scops sagittata (Cass.)** . . . . . Perak.
32×29 mm.

5497. „ (1617) 117. **Scops kennicotti Elliot** . . . . . Oregon.
36×32 mm.

5498. „ (1621) 175. **Ninox connivens (Lath.)** . . . . . Nord-Amerika.
48,5×38 mm.

5499. „ (1623) —. **Syrnium biddulphi Scully** . . . . . Afghanistan.
47×38,5 mm.

5500. „ (1633) 284pt. **Nyctala richardsoni Bp.** . . . . . Labrador.
30,5×27 mm.

Fam. Loriidae.

5501. XX, (1667) 30. **Eos fuscata Blyth** . . . . . Insel Jobi
Sphärisch. 27,5×24 mm. (A. d. Gef.).

5502. „ (1668a) 49. **Trichoglossus haematodes (L.)** . . . . Timor
24×19 mm. (A. d. Gef.).

5503. „ (1669) 53. **Trichoglossus massena Bp.** . . . Südost-Neu-Guinea
28×23 mm. (A. d. Gef.).

5504. „ (1675) 75. **Hypocharmosyna subplacens (Scl.)** . . Neu-Pommern
Ursprünglich weiß; vom Nestmaterial tief dunkelbraun gefärbt, sphärisch. 19×17 mm. (A. d. Gef.).

Fam. Psittacidae.

5505. XX, (1698a) 183. **Conurus frontatus Cab.** . . . . . West-Ecuador.
31×26 mm.

5506. „ (1701) 197. **Conurus ocularis Salv.** . . . . . Panama
28×23 mm. (A. d. Gef.).

5507. „ (1713) 248. **Psittacula flavescens Salvad.** . . . . . Bolivien.
28×13 mm.

5508. „ (1717) 258. **Brotogerys pyrrhopterus (Lath.)** . . . . Ecuador
22×19 mm. (A. d. Gef.).

5509. „ (1719) 282. **Amazona mercenaria (Tsch.)** . . . . West-Ecuador.
Weiß, glänzend. 38×31 mm.

5510. „ (1729) 364. **Poeocephalus fuscicollis (Kuhl)** = *pachyrhynchus (Hartl.)* . . . . . Togo.
28×24 mm.

5511. „ (1730) —. **Poeocephalus matschiei O. Neum.** Deutsch-Ost-Afrika
29,5×24 mm. (Mohoro).

5512. „ (1761) 521. **Loriculus flosculus Wall.** . . . . . Ins. Flores.
20×16,5 mm.

5513. „ (1768) 554. **Platycercus icterotis (Kuhl)** . . Südwest-Australien.
28,5×24 mm.

5514. „ (1771) 563. **Psephotes xanthorrhous Bp.** . . . Süd-Australien.
25,5×20 mm. (A. d. Gef.).

Fam. Podargidae.

5515. XVI, (1797b) 644. **Batrachostomus moniliger Blyth.** . . . Süd-Indien
Weiß, elliptisch. 26,5×17,5 mm. (Travancore).

Fam. Leptosomatidae.

5516. XVII, 1. **Leptosoma discolor (Herm.)** . . . . . Madagascar.
(1798)
Weiß mit einem Stich ins gelbliche, glänzend, sphärisch. 44×38 mm.

Fam. Alcedinidae.

5517. XVII, 184. **Ceyx sacerdotis Ramsay** . . . . . Neu-Pommern.
(1834)
Sehr glänzend und fast sphärisch. 20×19 mm.

Fam. Bucerotidae.

5518. XVII, 386. **Rhytidoceros plicatus (Forst.)** = *ruficollis Vieill.* . . . . . Neu-Guinea (A. d. Gef.).
(1873)
Schmutzigweiß bis gelblich mit rauher Oberfläche. 61×14 mm.

5519. „ 389. **Ceratogymna atrata (Temm.)** . . . . . Kamerun.
(1873a)
Schmutzig gelblichweiß, nicht sehr glattschalig, mit zahlreichen tiefen Poren. 58,5 ×38 mm.

5520. „ 393. **Ptilolaemus austeni (Jerd.)** . . . . . Assam.
(1874)
Weiß, meist schmutziggelb. 51×38 mm.

5521. „ 408. **Lophoceros epirhinus (Sundev.)** . . . . Transvaal.
(1877)
Weiß. 37×25 mm.

Fam. Meropidae.

5522. XVII, 90. **Nyctiornis amicta (Temm.)** . . . . Malakka (Perak).
(1897)
Weiß, glänzend, sphärisch. 30×26 mm.

Fam. Caprimulgidae.

5523. XVI, 621. **Lurocalis semitorquatus (Gm.)** . . . Süd-Brasilien.
(1919)
Gelblich fleischfarben, mit verwischten und gleichmäßig verteilten graubräunlichen und violettgrauen Caprimulgidenflecken. 28×19 mm.

5524. „ 577. **Caprimulgus enerratus Gray** . . . . . Madagascar.
1947)
Die Grundfarbe ist weiß. Schwarze, graue und lila Wolken bedecken den größten Teil der Fläche und vereinigen sich meist zu einem Kranze am stumpfen Pole. 26×20 mm.

Fam. Cypselidae.

5525. XVI, 472. **Chaetura caudacuta (Lath.)** . . . . . Amur.
(1979) Langgestreckt. 30×18,5 mm.

5526. „ 496. **Cypseloides fumigatas (Streub.)** . . Südost-Brasilien.
(1982a) Walzenförmig. 21×14 mm.

5527. „ —. **Tachornis myochrous Reichn.** . . Deutsch-Ost-Afrika
(1983) Elliptisch. 18×12 mm. (Mohoro).

5528. „ 464. **Tachornis gracilis (Shp.)** . . . . . Togo.
(1988a) Elliptisch. 16×10,5 mm.

5529. „ 444pt. **Cypselus acuticaudus Blyth** . . . . . Ostindien.
(1989) Weiß. 22×15 mm.

Fam. Trochilidae.

5530. XVI, 268. **Phaëthornis emiliae (Bourc. & Muls.)** . . Columbien.
(2003)

5531. „ 270. **Phaëthornis superciliosus (L.)** . . . . Ost-Peru.
(2003a)

5532. „ 272. **Phaëthornis lougirostris (Less. & Del.)** . Honduras.
(2003b)

5533. „ 282. **Phaëthornis adolphi Gould** . . . . . Honduras.
(2005)

5534. „ 184. **Agyrtria bartletti (Gould)** . . . . . Ost-Peru.
(2013)

5535. „ 342. **Rhamphomicrum microrhynchum (Boiss.)** Venezuela
(2078) (Merida).

5536. „ 420. **Lophornis ornatus (Bodd.)** . . . . . Venezuela.
(2104)

Fam. Coliidae.

5537. XVII, —. **Colius pallidus Reichn.** Deutsch-Ost-Afrika (Mikindani).
(2009) Schmutzigweiß bis trübgelblich, mit einem Kranz von schwarzbraunen kleinen Fleckchen und Stricheln. 20×15,5 mm.

Fam. Trogonidae.

5538. XVII, 474. **Trogon massena Gould** . . . . . Honduras.
(2119) Weiß, sehr wenig glänzend, sehr rundlich. 30×25 mm.

Fam. Cuculidae.

5539. XIX, 244. **Cuculus gularis Steph.** . . . . . Kapland.
(2139)
Das von Layard in einem Neste mit 3 Eiern von Lanius collaris gefundene Kuckucksei ist lehmgelb und zeigt verwischte mattgraue und bläulichgraue Flecken, wie bei den meisten Eiern unseres canorus. 23×16 mm.

5540. „ 276. **Cacomantis simus (Peale)** . . . . . Viti-Inseln.
(2150)
Hellfuchsigbraun wie viele unserer Cettien mit einem dichten Kranz am stumpfen Pole von kaum zu trennenden dunkeln fuchsigbraunen Fleckchen. 22×15 mm. Aus dem Nest mit 1 Ei von Drymochaera badiceps.

5541. „ 338. **Centropus bernsteini Schl.** . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(2167)
Weiß, fettig anzufassen. 34×25,5 mm.

5542. „ 342. **Centropus chlororhynchus Blyth.** . . . . Ceylon.
(2170)
Weiß, meist schmutziggelb. 38×29 mm.

5543. „ 359. **Centropus monachus Rüpp.** . . . Deutsch-Ost-Afrika
(2175)
Weiß mit gelblichem Schimmer, fettig, glänzend. 31×24 mm. (Mikindani).

5544. „ 366. **Centropus andamanensis Beavan** . Andaman-Inseln.
(2179)
Weiß. 35×29 mm.

5545. „ 395. **Phoenicophaës pyrrhocephalus (Forst.)** . . Ceylon.
(2189)
Weiß. elliptisch. 33—36×25—26,5 mm.

5546. „ 412. **Coua coquerelli Grand.** . . . . . West-Madagascar.
(2194)
Weiß, fettig anzufassen. 30×24 mm.

Fam. Capitonidae.

5547. XIX, 41. **Barbatula affinis Reichn.** . . . Deutsch-Ost-Afrika
(2204)
Weiß, matt, fast elliptisch. 17×12 mm. (Daressalam).

5548. „ —. **Barbatula bilineata Reichn.** . . Deutsch-Ost-Afrika
(2204a)
Einfarbig tief dunkelblau und sehr glänzend, mithin sehr abweichend von den Gattungsverwandten (Ob zweifellos?) 16×12,5 mm. (Mikindani).

5549. „ —. **Cyanops rubescens Baker** . . . . . Nord-Cachar.
(2209)
Weiß. 30 31×20,5 mm.

Fam. Picidae.

5550. XVIII, 151. **Melanerpes melanopogon (Temm.)** . . . Kalifornien.
(2267)
24×19 mm.

5551. „ 179. **Melanerpes santacruzi (Bp.)** . . . . . Honduras.
(2274)
26×19—19.5 mm.

5552. (2288) XVIII, 223. **Dendrocopus cathpharius (Blyth)** . . . Darjiling.
25×18 mm.

5553. (2292) „ 237. **Dendrocopus jardinei (Malh.)** . . . . . Honduras.
22×17 mm.

5554. (2304) „ 263. **Dendrocopus atratus (Blyth)** . . . . . Assam.
23×17,5 mm.

5555. (2306) „ 267. **Dendrocopus andamanensis (Blyth)** Andaman-Inseln.
20×15 mm.

5556. (2329) „ 396. **Micropternus brachyurus (Vieill.)** . . . . Perak.
28×21 mm.

5557. (2338) „ 477. **Campophilus robustus (Licht.)** . . Südost-Brasilien (St. Catharina).
31,5×23 mm.

Fam. Eurylaimidae.

5558. (2358) XIV, 466. **Corydon sumatranus (Raffl.)** . . . . . Malakka.
Goldgelbe Grundfarbe. Die sehr dicht stehenden und über die ganze Fläche gleichmäßig verteilten oft in die Länge gezogenen kleinen Flecken sind zu unterst mattbräunlich, und die scharfen braungelben, auch ab und zu schwarzen Stipperchen treten mehr hervor. 28×21,5 mm.
(Abbildung s. Tafel VI Fig. 8.)

Fam. Formicariidae.

5559. (2373) XV. 195. **Thamnophilus murinus Pelz.** . . . . . Ost-Peru.
Gelblichweißer Grund mit einem Gewirr von hell- und dunkelkastanienbraunen Flecken, Strichen und Haarlinien, namentlich am oberen Drittel. 23×15 mm.

5560. (2383) „ —. **Thamnophilus berlepschi Tacz.** . . . West-Ecuador.
Rötlichgrauer Grund mit sehr feinen und ziemlich gleichmäßig verteilten, nur am stumpfen Pole mehr gehäuften rostbraunen und grauvioletten Flecken. 21×16 mm.

5561. (2391) „ 232. **Myrmotherula gularis (Spix)** . . . Südost-Brasilien
Weiß mit sehr feinen kaum nadelstichgroßen braunen Pünktchen, welche am stumpfen Pole sich meist zu einem Kranze verdichten. 16×12 mm.

5562. (2392) „ 240. **Myrmotherula ménétriesi (d'Orb.)** . . . . . Peru.
Den vorigen sehr nahestehend.

5563. (2409) „ 313. **Grallaria guatemalensis Prev.** Guatemala, Honduras.
Einfarbig blau. Dickbauchig und wenig glänzend. 30×25 mm.

Fam. Dendrocolaptidae.

5564. (2446) XV, 56. **Synallaxis torquata Pz. Wied** . . . . . Peru.
Weiß mit einem Stich ins gelbliche. 23×16,5 mm.

5565. (2453) „ 70. **Siptornis hudsoni (Scl.)** . . . . . Argentina.
Rahmweiß und glänzend. 22×17 mm.

5566. (2465) „ 91. **Automolus rubiginosus (Scl.)** . . . . . Mexiko.
Weiß. 29,5×21,5 mm.

5567. (2468) „ 98. **Philydor columbianus Cab. & Heine** . . Venezuela
Weiß, glänzend. 21×16 mm.

5568. (2475) „ 152. **Picolaptes souleyeti (Des Murs)** . . . West-Ecuador.
Weiß. 24×19 mm.

Fam. Tyrannidae.

5569. (2488) XIV, **Fluvicola atripennis Scl.** . . . . . West-Ecuador.
Weiß mit geringem rötlichen Schimmer und wenigen rostbraunen Pünktchen. 20×15 mm.

5570. (2513) „ 79. **Euscarthmus orbitatus Pz. Wied** . Südost-Brasilien (St. Catharina).
Gelblichweiß mit wenigen rostbraunen Pünktchen, namentlich am stumpfen Pole. 19×13 mm.

5571. (2530) „ 117. **Leptopogon amaurocephalus Cab.** . . . Ost-Peru.
Weiß mit nur nadelstichgroßen violetten und dunkelbraunen Fleckchen, welche am stumpfen Pole einen unzusammenhängenden Kranz bilden. 18×12 mm.

5572. (2587) „ 231. **Empidonax salvini Ridgw.** . . . . . Guatemala.
Gelblichweiß bis crêmefarben mit hell- und dunkelbraunen markierten und teilweise auch umschatteten Flecken, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen. 16,5×13,5 mm.

Fam. Pittidae.

5573. (2651) XIV, 416. **Hydrornis oatesi Hume** . . . . . Tenasserim.
Weiß mit geringem rötlichen Schimmer, und violetten und hell- und dunkelbraunen Flecken und Schnörkeln, welche ziemlich gleichmäßig verteilt sind. Von nipalensis nur durch etwas geringere Größe abweichend. 28×24 mm.

Fam. Hirundinidae.

5574. (2726) X, —. **Lecythoplastes preussi Peichm.** . . . . . Kamerun.
Rosenroter Grund mit sehr feinen und dicht stehenden rostbraunen und untermischten violettrötlichen Flecken, welche am stumpfen Pole einen Kranz bilden. 18×13,5 mm. Die Eier sehen denen der Cistothorus platensis zum Verwechseln ähnlich, und passen oologisch nimmermehr in die Familie der Hirundinidae. Einige Eier ähneln denen unserer Muscicapa grisola.
(Abbildung s. Tafel VI Fig. 3.)

5575. (2734) „ 204. **Psalidoprocne nitens (Cass.)** . . . . . Elfenbeinküste.
Weiß. 16×11 mm.

Fam. Muscicapidae.

5576. (2749) III, —. **Bradyornis modesta Shelley** . . . . . Togo.
Graubläuliche Grundfarbe mit sehr dichtstehenden und gleichmäßig verteilten sehr mattbräunlichen und grauen Flecken. 19,5×14,5 mm.

5577. (2761) IV, 444. **Cyornis pallidipes (Jerdon)** . Süd-Indien (Travancore).
Graugrünlicher Grund mit fuchsigbraunen verwischten Flecken und Klecksen, die am stumpfen Pole ineinanderfließen. Unseren Muscicapa grisola ähnlich. 20,5×15 mm.

5578. (2770) „ —. **Anthipes poliogenys Brooks** . . . . . Assam.
Graurötlicher Grund, und die sehr dichte feine Fleckung kaum als solche erkennbar. 19×14 mm. Da die Eier große Ähnlichkeit mit denen der Cyornis rubeculoides haben, so zweifle ich an ihrer richtigen Bestimmung, obgleich mir solche von verschiedenen Seiten bestätigt wird.

5579. (2780) „ —. **Petroeca bivittata De Vis** . . . Deutsch-Neu-Guinea.
Ölgraubraun mit einem verschwommenen Kranz von dunkelgraubräunlichen Flecken. Den Eiern von bicolor und vittata ähnlich. 22—24×16—18 mm.

5580. (2784) „ 203. **Poliomyias hodgsoni (Verr.)** . . . . . Assam.
Graugrünlicher Grund mit verwischten über die ganze Fläche dicht verteilten, aber am stumpfen Pole kranzförmig gehäuften fuchsigroten Fleckchen. 18,5×13 mm.

5581. (2785) „ 205. **Muscicapula astigma (Hodgs.)** . . . . . Assam.
Weiß bis gelblichweiß mit fuchsigen verwischten zarten Flecken, welche am stumpfen Pole gehäufter stehen. 18×14 mm.

5582. IV, 221. **Pseudogerygone conspicillata (Gr.)** Deutsch-Neu-Guinea.
(2794) Weiß bis rötlichweiß mit sehr feinen grauen bis dunkelbräunlichen Fleckchen, welche am stumpfen Ende teils gehäuft stehen, teils einen Kranz bilden. 15,5—16×12—13 mm.

5583. „ —. **Pseudogerygone ramuensis Reichn.** Deutsch-Neu-Guinea.
(2798) Rötlichweiß bis rosafarben, mit feinen hell- und dunkelbraunen Fleckchen, welche am stumpfen Pole einen Kranz bilden. 15,5×12—12,5 mm.

5584. „ —. **Poecilodyras melanogenys A. B. Meyer** Deutsch-Neu-
(2807) Guinea.
Der Grundton ist graulich bis bläulichgrau. Die ziemlich dichtstehenden meist markierten Flecken sind violettgrau bis rotbräunlich. 19—21×14,5—16 mm.

5585. „ 283. **Todopsis wallacei Gray** . . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(2829) Die Grundfarbe ist weiß Die sehr verwischten über die ganze Fläche verteilten, nur am stumpfen Pole gehäuften und auch zuweilen einen Kranz bildenden Flecke sind mattrostbräunlich. Bei einigen Eiern sind die Flecken matt violett und graubräunlich, und auch öfter in die Länge gezogen. 19×14 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 1.)

5586. „ 324. **Rhipidura phoenicura Müll. & Schl.** . . . . . Java.
(2837a) Gelblichweißer Grund mit einem dichten Kranz am oberen Drittel der Eier von matt graubläulichen Fleckchen. 16,5×12,5 mm.

5587. „ 327. **Rhipidura leucothorax Salvad.** . . Deutsch-Neu-Guinea.
(2837b) Weiß bis gelblichweiß mit hell- und dunkelfuchsigen kleinen und größeren unregelmäßigen Flecken, welche teils die ganzen Eier bedecken, teils am stumpfen Pole gehäuft stehen. 16—17×13—13,5 mm.

5588. „ —. **Terpsiphone suahelica Reichn.** . . Deutsch-Ost-Afrika.
(2854) Mattrötlichweiß bis rosa mit über die ganzen Eier verteilten tiefdunkelbraunen und violetten kleinen Flecken, welche sich am stumpfen Pole zu einem Kranze verdichten. 17,5—20×14 mm.

5589. „ 381. **Myiagra latirostris Gould.** . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(2865) Schmutzig graubläulich mit einem Kranz mehr nach der Mitte zu stehender graugelblicher bis schwarzgrauer Flecken, wie bei den meisten Myiagraeiern. 20×15,5 mm.

5590. „ 397. **Cryptolopha cantatrix (Tick.)** . . . . . Assam.
(2869) Weiß, dickbauchig. 15×11,5 mm.

5591. „ 398. **Cryptolopha affinis (Horsf. & Moore)** . . . Assam.
(2869a) Weiß, dickbauchig. 14×12 mm.

5592. IV, —. **Arses lauterbachi Reichn.** . . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(2882)
Rötlichweißer Grund mit verwischten violettrötlichen und lebhaften rostbraunen unregelmäßigen, am stumpfen Pole gehäuften Flecken. 20×14,5 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 2.)

Fam. Campophagidae.

5593. IV, 67. **Volvocivora melanoptera (Rüpp.)** . . . . . Perak.
(2905)
Hellgrau bis graugrünlich schimmernde Grundfarbe; die verwischten und meist in die Länge gezogenen größeren und meist kleineren Flecken sind violettgrau, hell- bis dunkelgrau und auch oft schwarz. 22—24×17 mm.

Fam. Pycnonotidae.

5594. VI, 18. **Chloropsis hardwickei Jard. & Selby** . . . Assam.
(2925)
Rötlichweiß bis fleischfarben, mit sehr verwischten feinen rötlichbraunen fast über die ganze Fläche gleichmäßig verteilten Fleckchen; ganz einzelne schwarzbraune Pünktchen. Sehr gestreckt. (In der Färbung unseren Rotkehlchen rubecula ähnlich.) 22×14,5 mm.

5595. „ 20. **Chloropsis aurifrons (Temm.)** . . . . . Assam.
(2925a)
Von hardwickei nur durch etwas hellere weißlichere Grundfärbung verschieden. Die feinen Fleckchen am stumpfen Pole mehr gehäuft. 22×14,5 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 12.)

5596. „ 28. **Chloropsis chlorocephala (Walden)** . . . . Assam.
(2925b)
Weiß mit nur nadelstichgroßen mattbraunen Pünktchen, die am stumpfen Pole zu einem Kranze zusammenfließen und einzelnen schwarzbraunen bis schwarzen Pünktchen. 20×14,5 mm.

5597. „ 50. **Hemixus hildebrandti Hume** . . . . . Birma.
(2939)
Weiß bis fleischfarben mit violettbraunen sehr unregelmäßigen Schalen und fast schwarzbraunen meist größeren Oberflecken und Flatschen. 23—24×17—18 mm.

5598. „ —. **Bleda albigularis (Shp.)** . . . . . Togo.
(2959)
Fleischfarben bis dunkelbraun mit sehr kleinen und dichtstehenden meist verwischten fuchsigen Fleckchen, welche am stumpfen Pole meist einen Kranz bilden. 20,5—22×14—15,5 mm.

5599. VI, 104. **Bleda leucopleura (Cass.)** = *Xenocichla l.* = *Phyllastrephus l. Cass.* . . . . . Kongo.
(2959a)

Graurötlicher bis fleischfarbiger Grund mit einem dichten Kranz am oberen Drittel von schwarzbraunen und grauen ineinandergeflossenen Flecken. Auch die übrige Fläche weist zarte feine von der Grundfarbe sich wenig abhebende Fleckchen auf. 20,5×14.5 mm.

5600. „ —. **Eurillas congener (Reichn.)** . . . . . Togo.
(2962)

Bleigrauer Grund mit coccothraustesartigen hellgrauen und schwarzbraunen Flecken, Strichen und Schnörkeln. 26×17.5 mm.

5601. „ 139. **Pycnonotus xanthorrhous J. Anders** . . . Birma.
(2976)

Sehr bunt wie alle Pycnonotus-Arten. Grundfarbe rötlichweiß mit sehr dichtstehenden schwarzbraunen gleichmäßig verteilten Flecken. 20×15 mm.

Fam. Timeliidae.

5602. VI, 357. **Trochalopterum affine (Blyth)** . . . . . Sikkim.
(3012)

Dunkelblau mit nur sehr vereinzelten ziemlich großen matt- bis schwarzbraunen unregelmäßigen Flecken und Flatschen. 29—30×20—21 mm.

5603. „ 369. **Trochalopterum austeni Jerdon** . . . . N.-Cachar.
(3019)

Weiß. 25×19,5 mm.

5604. „ —. **Trochalopterum bakeri Hartert**. . . . . Assam.
(3021)

Tief dunkelblaugrün mit schwarzen und bläulichschwarzen Punkten, Klecksen und Schnörkeln. 27,5×19 mm.

5605. „ 395. **Argya squamiceps (Cretzschm.)** . . . . . Arabien.
(3033)

Tief dunkelblau. 24×18 mm.

5606. „ 397. **Argya acaciae (Licht.)** . . . . . Erythraea.
(3036)

Tief dunkelblau. 23×17,5 mm.

5607. „ 433. **Xiphorhamphus superciliaris (Blyth)** . . . Assam.
(3058)

Weiß. 26×19 mm.

5608. „ —. **Garrulax (Babax) waddellii Ogilvie Grant** . Thibet.
(3059)

Einfarbig dunkelblau. Sehr lang gestreckt. 35×22 mm.

5609. „ 389. **Crateropus rufescens (Blyth)**. . . . . Ceylon.
(3088)

Einfarbig tief dunkelblau. 24×20 mm.

5610. „ 548. **Turdinus macrodactylus (Strickl.)** . Malakka (Perak).
(3111)

Weißer bis hellfleischfarbiger Grund mit wenigen gleichmäßig verteilten umschatteten dunkelbraunen Flecken, Schnörkeln und Haarlinien. 23,5×16,5 mm.

5611. VI, 594. **Rimator malacoptilus Blyth** . . . . . Assam.
(3123)
Sehr bunt; weiß bis fleischfarben mit teils sehr feinen, aber auch sehr großen violettgrauen Unter- und dunkelbraunen bis rostfarbigen Oberflecken und gelegentlichen Schnörkeln. 21×16 mm.

5612. „ —. **Alcippe fratercula Rippon** . . . . Birma (Shan hills).
(3124)
So bunt und variabel wie die bekannten nipalensis.

5613. „ 178. **Alcippe pyrrhoptera (Bp.)** . . . . . Java.
(3127)
Weiß bis rötlichweiß mit violettbraunen bis fast kirschroten Schnörkeln und ammerartigen Wurmlinien, wie einige Eier von nipalensis. 19×15 mm.

5614. „ —. **Schoeniparus intermedius Rippon** . . . . . Birma.
(3132)
Hellgrauer bis graugelblicher Grund mit sehr verwischten graubräunlichen schattenhaften und einzelnen markierten nahezu schwarzen Flecken, den Eiern unserer Sylvia atricapilla nicht unähnlich. 21×16 mm.

5615. „ 611. **Schoeniparus dubius (Hume)** . . . . . Tenasserim.
(3132a)
Von vorigen wohl nicht zu unterscheiden.

5616. „ 26. **Heteroxenicus (Drymochares) cruralis (Blyth)** . . . . . Assam.
(3159)
Weiß, sehr dickbauchig. 20×16 mm.

5617. „ 603. **Oligura castaneocoronata (Burton)** . . . . Assam.
(3163)
Fleischroter Grund mit sehr dichtstehenden feinen, meist verwischten hellrostbraunen Fleckchen, welche am stumpfen Pole gehäufter stehen. 18×14 mm.

5618. „ 636. **Herpornis xantholeuca Hodgs.** . . . . . Assam.
(3179)
Bläulichweiße Grundfarbe mit kaum nadelstichgroßen helleren und dunkleren rostbraunen Fleckchen, welche am stumpfen Pole gehäufter stehen, ohne einen eigentlichen Kranz zu bilden. 18×13 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 3.)

5619. „ 606. **Minla igneitincta Hodgs.** . . . . . Assam.
(3186)
Dunkelblau mit einem Kranz von entweder tief dunkelbraunen zarten scharf begrenzten Fleckchen, oder violettbraunen Schalen- und schwarzbraunen Oberflecken, nur am stumpfen Pole. 19×14,5 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 10.)

Fam. Troglodytidae.

5620. VI, 212. **Thryophilus rufalbus (Lafr.).** . . . . . Venezuela.
(3205)
Rötlichweiße Grundfarbe mit dunkelrostbraunen Ober- und violetten feinen Schalenflecken, welche ziemlich dicht stehen und am stumpfen Ende einen Kranz bilden. 18,5×15 mm.

5621. „ 403. **Thryothorus cantator Tacz.** . . . . . Centr. Peru.
(3213)
Weiß mit matt rostbraunen feinen Punkten, welche über die ganze Fläche verteilt sind, aber am stumpfen Pole gehäuft stehen und einen dichten Kranz bilden. 19×15 mm.

5622. „ —. **Thryomanes cryptus Oberh.** . . . . . Texas.
(3219)
Weiß bis rötlichweiß mit zarten violettrötlichen und matt- und dunkelbräunlichen Pünktchen, welche ziemlich gleichmäßig verteilt sind. 16×13 mm.

5623. „ —. **Troglodytes albicanus Berl. & Tacz.** . West-Ecuador.
(3232)
Fleischfarbiger Grundton; die zarten rostbraunen dichtstehenden Flecken bilden am stumpfen Pole einen Kranz. 18×14 mm.

5624. „ 305. **Urocichla caudata (Blyth).** . . . . . Sikkim.
(3235)
Weißer bis rötlichweißer Grund mit violetten und rostbraunen meist verwischten Flecken, welche am stumpfen Pole kranzförmig vereinigt sind. Andere sind fast fleckenlos. 18×14 mm.

5625. „ —. **Urocichla reptata Bingham** Hinter-Indien (Shan-Staat).
(3235a)
Weiß mit meist zarten rostbraunen Flecken, wie die meisten Zaunkönigeier. 18×14,5 mm.

5626. „ —. **Anorthura daurica (Dyb. & Tacz.)** . . Mandschurei.
(3238)
Wie unsere troglodytes.

Fam. Cinclidae.

5627. VI, —. **Cinclus ruficollis (Pall.)** . . . . . Mongolei.
(3256)
Wie unsere aquaticus.

Fam. Turdidae.

5628. VI. 376. **Myiadestes unicolor Scl.** . . . . . Guatemala.
(3304)
Weiß mit einem schwachen Stich ins Bläuliche. Die unregelmäßigen rostroten und wenigen rötlichvioletten meist größeren Flecken bedecken die ganze Fläche, stehen nur am stumpfen Pole etwas gehäufter. 25×17 mm.

5629. V, 2. **Cochoa viridis Hodgs.** . . . . . Assam.
(3306)
Weiß bis mattgrünliche Grundfarbe. Die sehr dichte drosselartige Fleckung ist mattrostbraun mit matteren Unterflecken. Am stumpfen Pole sehen die Flecken wie zusammengeflossen aus. 30,5×20,5 mm.

5630. „ —. **Merula saturata Cab.** . . . . . Unterer Kongo.
(3351)
Von normalgefleckten merula-Eiern nicht abweichend, durchschnittlich wenig kleiner. 25—26×21 mm.

5631. „ —. **Turdus feae Salvad.** . . . . . Assam.
(3382)
Wie unsere merula oder pilaris gefärbt. 30×21 mm.

5632. „ 269. **Turdus ruficollis (Pall.)** . . . . . Mongolei.
(3384)
Lebhaft gefleckten torquatus- und alpestris-Eiern am ähnlichsten.

5633. VII, 658. **Tharrhaleus strophiatus (Hodgs.)** Himalaya (Garhwal).
(3422)
Tief dunkelblau. 21×14 mm.

5634. V, —. **Cyanecula abbotti Richmond** . . . . . Kaschmir.
(3449)
Wie unsere suecica.

5635. VII, 46. **Cossypha melanonota (Cab.)** . . . . . Kongo.
(3482a)
Mattrötlichgrau mit kaum nadelstichgroßen etwas dunkleren Flecken, die einen kaum sichtbaren Kranz am oberen Ende bilden. 23,5×16 mm.

5636. „ 70. **Cichladusa arquata Peters** Deutsch-Ost-Afrika (Mohoro).
(3483)
Weiß mit schwalben- oder meisenartigen feinen mattbräunlichen und fuchsigen Fleckchen; andere haben sittaartige größere mattbräunliche Flecken. Die Angabe von Boxberger ist hierdurch bestätigt. 24,5×17 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 7.)

5637. IV, —. **Pratincola emmae Hartl.** . . . . Deutsch-Ost-Afrika
(3497)
Von unseren rubicola nicht verschieden. (Langenburg).

5638. V, 368. **Saxicola capistrata Gould.** . . . . . Ost-Turkestan.
(3517)
Gefärbt wie amphileuca und auch ebenso groß. 20×16 mm.

5639. „ 376. **Saxicola opistholeuca Strickl.** . . . Nord-Turkestan.
(3517a)
Mattbläulichweiß mit sehr zarten fuchsigen Fleckchen am stumpfen Pole. 21×15 mm.

5640. „ 372. **Saxicola persica Seebohm** . . . . . Persien.
(3520)
Von pleschanka (morio) nicht verschieden.

Fam. Sylviidae.

5641. VII, 528. **Acrocephalus rehsei (Finsch)** = *Tatare r. (Finsch)* . . . . . Insel Nauru.
(3565)

Während die Acrocephalus syrinx-Eier weiße Grundfarbe haben, zeigen diese mattgrünliche wie diejenigen von turdoides. Die meist gleichmäßig verteilten größeren und kleineren Flecken sind tief schwarz, grau und bleigrau. 21×15 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 8.)

5642. V, 124. **Tribura major (Brooks)** . . . . . Himalaya.
3565a

Grundfarbe weiß bis rosa. Die feinen locustellaartigen hell- und dunkelbraunen Fleckchen bedecken die ganze Fläche und sind am stumpfen Pole meist zu einem dichten Kranze vereinigt. 20×15 mm.

5643. „ 224. **Orthotomus ruficeps (Less.)** . . . . . Perak.
(3576)

Außerordentlich variabel wie alle Orthotomus-Arten. Rötlichweiß oder dunkelblaugrün mit fuchsigen größeren und kleineren namentlich am stumpfen Pole vereinigten Flecken, oder weiß mit tiefrostbraunen scharf begrenzten Fleckchen. 16×11,5 mm.

5644. „ 252. **Cisticola rufa (Fraser)** . . . . . Elfenbeinküste.
(3580)

Hellblauer Grund mit rostbraunen meist rundlichen Oberflecken und verwischten wolkenartigen violettrötlichen Unterflecken. 15,5 ×12 mm.

5645. „ 276. **Cisticola strangei (Fraser)** . . . . . Togo.
(3587)

Bläulichweiß bis blau mit feinen schwarzbraunen Fleckchen, namentlich am stumpfen Pole. 17×14 mm.

5646. „ 32. **Melizophilus deserticola Tristr.** . . . . . Algier.
(3637)

Zartgrünliche Grundfarbe und kräftige graue und graubräunliche meist verwischte Flecken, welche am stumpfen Pole einen dichten Kranz bilden. 17×12,5 mm.
(Abbildung s. Tafel VI Fig. 5.)

5647. „ 45. **Acanthopneuste plumbeitarsus (Swinh.)** . . Kaschmir
(3654) Weiß, glänzend. 16×13 mm. (Ladak).

5648. „ 53. **Acanthopneuste davisoni Oates** . . . . . Tenasserim.
(3658)

Weiß, glänzend. 16,5×12 mm.

5649. VII, — **Sericornis sylvia Reichn.** . . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(3671)

Hellschokoladengrau mit einem Kranze von noch dunklerer Farbe am stumpfen Pole. Mit der Lupe betrachtet sieht man einzelne bazillenartige schwarze Stäbchen. Die Eier ähneln sehr denen von laevigaster vom Kap York. 20×14 mm.

5650. VII, —. **Camaroptera littoralis Grote**. . . Deutsch-Ost-Afrika (Mikindani).
(3681)
Mattbläulich bis bleigrau mit schwarzgrauen ziemlich markierten größeren und kleineren Flecken, welche gleichmäßig verteilt sind. 20×15 mm.

5651. V, 136pt. **Horornis brunnescens Hume** . . . . . Sikkim.
(3686)
Hellschokoladenbraun mit einem kaum sichtbaren Kranze von noch etwas dunklerer Färbung. 18×13 mm.

Fam. Vangidae.

5652. VIII, 108. **Artamia bicolor (L.)** = *Cyanolanius b. (L.)* Madagascar.
(3768)
Mattbläuliche Grundfarbe mit größeren und kleineren rostbraunen und violettgrauen meist markierten Flecken, ohne am stumpfen Pole einen Kranz zu bilden. 20—21×16 mm.

Fam. Laniidae.

5653. VIII, 242. **Lanius homeyeri Cab.** . . . . . Siebenbürgen.
(3806)
Wie excubitor.

5654. „ —. **Fiscus marwitzi (Reichn.)** . . . . Deutsch-Ost-Afrika (Langenburg).
(3824)
Gelblichgrau mit rötlichgrauen und mattvioletten Unter- und hellgraugelben bis schwarzgrauen und auch fast schwarzen Oberflecken. Unseren pomeranus nahe verwandt. 23—24 ×17,5—18 mm.

5655. „ —. **Laniarius fuelleborni Reichn.** . . Deutsch-Ost-Afrika.
(3851)
Mattblaugrüner Grund mit hell- und dunkelrostbraunen auf der ganzen Fläche gleichmäßig verteilten unregelmäßigen Flecken. 24×17 —17,5 mm.
(Abbildung s. Tafel V Fig. 9.)

5656. „ —. **Pomatorhynchus congener Reichn.** Deutsch-Ost-Afrika (Langenburg).
(3854)
Weiß bis rötlichweiß mit feinen violetten Unter- und mehr hellbraunen Oberflecken und zarten Schnörkeln und Linien, wie die Gattungsverwandten. 22,5×17 mm.

5657. „ —. **Pomatorhynchus frater Reichn.** . . Unterer Kongo.
(3854a)
Wie congener gezeichnet und auch ebenso groß.

5658. „ 128. **Antichromus minutus (Hartl.)** = *Telephonus m. Hartl.* . . . . . Togo.
(3856)
Weiß. Die violettrötlichen und hellbräunlichen meist in die Länge gezogenen Flecken stehen einzeln, aber gehäuft am oberen Drittel. 22×18 mm.

Fam. Paridae.

5659. VIII, 49pt. **Poecile dresseri (Stejneger)** . . . . . England.
(3880) Wie unsere palustris.

5660. „ —. **Poecile brevirostris (Tacz.)** . . . . Südost-Sibirien.
(3881) Wie palustris.

5661. „ —. **Cyanistes ombriosus (Meade Walde)** . . . Canaren.
(3932) Wie die Gattungsverwandten.

5662. „ 12. **Cyanistes pleskei (Cab.)** . . . Rußland (Kama-Fluß).
(3934) Wie die Gattungsverwandten. (Nach Ansicht Pleske's ist Cyanistes pleskei ohne Zweifel das Produkt der Kreuzung von Blau- und Lasurmeise.)

5663. „ 53. **Psaltria exilis Temm.** . . . . . Java.
(3948) Weiß mit zarten mattrostbraunen Fleckchen, welche am stumpfen Pole kranzartig gehäuft stehen, unseren Aegithalus caudatus ähnlich, nur ist die Fleckung gröber. 12×9 mm.

Fam. Regulidae.

5664. VIII, —. **Regulus azoricus Seebohm** . . . . . Azoren.
(3963) Wie unsere cristatus.

Fam. Sittinae.

5665. VIII. 346pt. **Sitta tephronota Shp.** . . . . . Afghanistan.
(3977) Weiß mit wenigen meist größeren mattbräunlichen Flecken. 20×15 mm.

5666. „ 357. **Dendrophila formosa Blyth** . . . . . Assam.
(3989) In der Fleckung den meisten Sitta-Arten verwandt. 19×13,5 mm.

Fam. Zosteropidae.

5667. IX, 180. **Zosterops siamensis Blyth** . . . . . Assam.
(4019) Einfarbig mattblau. 15×12 mm.

5668. „ 196. **Zosterops javanica (Horsf.)** . . . . . Java.
(4026) Einfarbig mattblau. 17×12 mm.

Fam. Nectariniidae.

5669. (4060) IX, —. **Nectarinia johnstoni Shelley** = *deckeni Lorenz*. . . . . Kilimandscharo.

Graubläuliche Grundfarbe. Am stumpfen Pole befindet sich ein Kranz von dunkelbraunen und hellgraublauen meist verschwommenen Fleckchen. 21×14 mm.

5670. (4086) „ 47. **Cinnyris bifasciatus (Shaw)** . . . . . West-Afrika.

Schmutzigweiß mit verwischten graubläulichen und wenig dunkleren motacillaartigen Flecken, welche die ganze Fläche fast gleichmäßig bedecken. 14,5×11 mm.

5671. (4095) „ —. **Chalcomitra aequatorialis Reichn.** Deutsch-Ost-Afrika (Nyassa).

Hellgrau bis grünlichgrau, mit grauen, schwarzgrauen und nahezu schwarzen unregelmäßigen Flecken, Flatschen und Wolken. 18—20×14 mm.

5672. (4102) „ 83. **Cyrtostomus andamanicus (Hume)** . Andaman-Inseln.

Weiß bis bläulichgrauer Grund mit verwischten grauen, bläulichgrauen und schwarzbräunlichen Flecken und Schnörkeln und einzelnen schwarzen Pünktchen. 15×12 mm.

5673. (4111) „ 292. **Anthothreptes orientalis Hartl.**. . . Kilimandscharo.

Hellgraue Grundfarbe mit schwarzbraunen und grauvioletten Flecken, Schnörkeln und Haarlinien. 15,5×11,5 mm.

Fam. Meliphagidae.

5674. (4119) IX, 207. **Melithreptes melanocephalus Gould** . . . Tasmanien.

Fleischfarbener Grund mit hellbraunen und wenigen violetten feinen Fleckchen, welche am stumpfen Pole einen dichten Kranz bilden. 20—21×14 mm.

5675. (4127) „ 141. **Myzomela sclateri Forbes** . . . . . Neu-Pommern.

Rötlichweiß mit einem Kranz von fuchsigroten meist ineinanderfließenden Flecken. Auf der übrigen Fläche sieht man nur wenige nadelstichgroße Stipperchen. 15—16 5×14 mm.

5676. (4138) „ 248. **Melilestes megarhynchus (Gray)** . . . Neu-Guinea.

Rötlichweißer bis dunkelfleischfarbiger Ton mit grauvioletten Unter- und hell- bis dunkelbraunen meist markierten mittelgroßen Flecken, oder mit verwischten die ganze Fläche bedeckenden rostroten Fleckchen, die sich selten zu einem Kranze verdichten. 23—26×19 mm.
(Abbildungen s. Tafel V Fig. 4 und 6.)

5677. IX, —. **Melipotes fumigatus A. B. Meyer** . . . Neu-Guinea.
(4138a)
Fleischfarbiger Grund mit matt zimmetfarbiger und dunkelbräunlicher Fleckung. Ein Ei hat locustellenartige Flecken. Meist stehen die Flecken kranzartig gehäuft am stumpfen Pole. 26—27×20 mm.

5678. „ —. **Ptilotis sharpei Rothsch. & Hart.** . . . Neu-Guinea.
(4145)
Weiß, auch mit rötlichem Schimmer. Die wenigen scharf markierten, am stumpfen Pole mehr vorhandenen Flecken sind tief dunkelbraun. 24—25×17 mm.

5679. „ 275. **Tropidorhynchus jobiensis Meyer** . . . Neu-Guinea.
(4176)
Ziegelrot bis rostbraun mit noch viel dunkleren meist verwischten Flecken. 31×25 mm.

Fam. Mniotiltidae.

5680. X, 239. **Vermivora peregrina (Wils.)** . . . Östl. Nord-Amerika.
(4189)
Weiß bis gelblichweiß mit zarten rostbraunen und wenigen untermischten violettbraunen meist begrenzten Fleckchen, welche am stumpfen Pole einen unbestimmten Kranz bilden. 16×12 mm.

5681. „ 246. **Vermivora lutescens (Ridgw.)** . . Westl. Nord-Amerika.
(4190)
Weiß mit wenigen feinen rostbraunen und violettgrauen Fleckchen, meist nur am stumpfen Pole. 19×13 mm.

5682. „ 261. **Parula nigrilora Coues** . . . . . Mexiko.
(4196)
Bläulichweiße Grundfarbe. Die meist verwischten unregelmäßigen zum Teil recht großen Flecken sind graubräunlich und violettgrau und stehen meist am stumpfen Pole kranzartig. 17×12 mm.

5683. „ 335. **Dendroeca tigrina (Gm.)** . . . . . Neu-Braunschweig.
(4202)
Weißer Grund mit lilafarbigen und fast schwarzen Pünktchen, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen. 15,5×12 mm.

5684. „ 291. **Dendroeca nigrescens (Towns.)** . . . . . Oregon.
(4205)
Weiß mit zarten mattrötlichen dunkelbraunen und auch fast schwarzen unregelmäßigen und meist unbegrenzten Fleckchen, welche am oberen Drittel gedrängter stehen, ohne einen eigentlichen Kranz zu bilden. 17×13 mm.

5685. „ 288. **Dendroeca blackburniae (Gm.)** . . . . . New-York.
(4208)
Schmutzigweiß mit verwischten tiefschwarzbraunen und grauvioletten Flecken und Schnörkeln, welche am stumpfen Pole einen Kranz bilden. 16,5×12,5 mm.

5686. X, 304. **Dendroeca graciae Baird.** . . . . . Colorado.
(4209)
Weiß bis schmutzigweiß mit weinrötlichen und graubraunen meist verwischten Flecken und einzelnen Haarlinien, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen. 16,5×13 mm.

5687. „ 320. **Dendroeca castanea (Wils)** . . . . Östl. Nord-Amerika.
(4210)
Bläulichweißer Grund mit meist markierten nahezu schwarzen und grauvioletten unbegrenzten Flecken, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen. 17×13½ mm.

5688. „ 366. **Oporornis philadelphia (Wils.)** . . Neu-Braunschweig.
(4217)
Weiß mit mattbräunlichen und violettrötlichen unregelmäßigen Flecken, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen, ohne einen Kranz zu bilden. 17×13 mm.

5689. „ —. **Geothlypis arizela Oberholzer** . . . . . Kalifornien.
(4224)
Weiß mit nur vereinzelten grauen oder mattbräunlichen Fleckchen und Schnörkeln, welche am stumpfen Pole stehen. 18×14 mm.

5690. „ 357 pt. **Geothlypis bairdi Nutting** . . . . . Honduras.
(4227)
Weiß mit wenigen meist tiefschwarzen braunen Flecken am oberen Pole. 18,5×15 mm.

5691. „ 371. **Granatellus sallaei Bp.** . . . . . Honduras.
(4229)
Weiß mit violettbraunen Unter- und hellbraunen feinen Oberflecken, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen. 18×14 mm

5692. „ —. **Wilsonia chryseola Ridgw.** . . . . . Kalifornien.
(4233)
Weiß mit zahlreichen rostbraunen und grauvioletten kleineren und größeren Flecken und Flatschen, welche am oberen Ende einen Kranz bilden. 16×12,5 mm.

Fam. Motacillidae.

5693. X, 521. **Motacilla beema Syk** . . . . . Turkestan.
(4276)
Wie unsere flava.

5694. „ 527. **Motacilla feldeggi Michah.** . . . . . Griechenland.
(4279)
Wie unsere flava.

5695. „ 539. **Anthus chloris (Licht.)** . . . . . Kapkolonie.
(4282)
Graublauer Grund mit motacillaartigen schwarzbraunen und grauen Flecken. 20×16 mm.

5696. „ —. **Anthus madeirensis Hart.** . . . Madeira (Porto Santo).
(4297)
Wie pratensis.

5697. „ 592 pt. **Anthus blakistoni Swinh.** . . . . . Turkestan.
(4298)
Hell und dunkel wie Anthus aquaticus.

Fam. Alaudidae.

5698. VIII, 537. **Otocorys bilopha (Temm.)** . . . . . Algier.
(4321) Von unseren alpestris wohl kaum verschieden.

5699. „ 585. **Calandrella tibetana Brooks** . . . Kaschmir (Ladak).
(4344) Graugelb mit zarten Pünktchen von dunkleren Nuancen wie unsere brachydactyla. 20×15 mm.

5700. „ 626pt. **Galerida pallida Brehm** . . . . . Süd-Spanien.
(4366) Wohl kaum von unserer cristata abweichend.

5701. „ —. **Lullula pallida Sarudny** . . . . . Persien.
(4375) Nicht verschieden von den Eiern unserer arborea.

Fam. Fringillidae.

5702. XII, 94pt. **Sporophila hypoleuca (Licht.)** . . . . . Brasilien.
(4423) Matt graubläulich mit meist gleichmäßig über die ganze Fläche verteilten unbegrenzten lilarötlichen bis tief schwarzbraunen Flecken, die nur am stumpfen Pole etwas gehäufter stehen. 17—19×12 mm.

5703. „ 97. **Sporophila plumbea (Pz. Wied)** . . . . . Brasilien.
(4425) Wie vorige.

5704. „ 286. **Saltator atripennis Scl.** . . . . . West-Ecuador.
(4463) Dunkelblau mit wenigen schwarzen Wurmlinien und Schnörkeln am stumpfen Pole. 27×20 mm.

5705. „ 176. **Fringilla moreleti Pucher.** . . . . . Azoren.
(4478) Von coelebs nicht verschieden.

5706. „ —. **Fringilla palmae Trist.** = *caerulescens König* . Kanaren
(4479) In der Größe und Färbung wie unser coelebs, eher noch etwas größer. (Palma).

5707. „ 275. **Montifringilla griseinucha (Brandt)** Alaska (St. George Isl.,
4521) Weiß. 29×19 mm. Prylof-Isl.).

5708. „ —. **Petronia barbara Erlanger** . . . . . Algier.
(4527) Nicht abweichend von Petronia petronia.

5709. „ —. **Passer tingitanus Loche** . . . . . Algier.
(4539) Von demesticus nicht verschieden.

5710. „ —. **Serinus madaraszi Reichn.** . . . Deutsch-Ost-Afrika
(4572) Weiß mit geringem bläulichen Schimmer. (Mikindani).
Die meisten am oberen Ende stehenden unregelmäßigen Flecken und Schnörkeln sind hell- bis dunkelgraugelb, zwischen denen einige mehr schwärzliche Stipperchen stehen. 15,5×12 mm.

5711. XII, 391pt. **Carpodacus roseatus (Hodgs.)** . . . . . Altai.
(4582) Wie erythrinus.

5712. „ 424. **Carpodacus roseipectus Shp.** = *haemorrhous Shp.* . . . . . Guatemala.
(4587) Bläulichweiß mit nur wenigen feinen schwarzen und graubraunen Fleckchen. 19×14,5 mm.

5713. „ 425. **Propasser thura Bp. & Schl.** . . . . . Sikkim.
(4592) Dunkelblau mit nur wenigen einzelnen tiefschwarzen Pünktchen und Schnörkeln am oberen Ende. 22×16 mm.

5714. „ —. **Propasser waltoni Shp.** . . . . . Süd-Thibet.
(4593a) Dunkelblaugrün mit sehr feinen tiefschwarzen Pünktchen am oberen Drittel. 19×14,5 mm.

5715. „ —. **Loxia himalayensis Blyth** . . . . . Himalaya.
(4595) Wie unsere curvirostra.

5716. „ 447. **Pyrrhula kamtschatica Tacz.** . . . . Kamtschatka.
(4599) In der Färbung von unserer pyrrhula nicht abweichend. 20×15 mm.

5717. „ —. **Pinicola kamtschatkensis Tacz.** . . . Kamtschatka.
(4602) Wie unsere enucleator.

5718. „ 529. **Emberiza cinerea Strickl.** . . . . . Smyrna.
(4629) Bleigrauer Grund mit tiefschwarzen und violettgrauen Flecken, Schnörkeln und hieroglyphenartigen Zeichen. In der Fleckung den cirlus-Eiern, in der Grundfärbung den aureola-Eiern am nächsten stehend. Die Eier meiner Sammlung, von Dr. Kröper in der Nähe von Smyrna gesammelt, messen: 20×15,5 und 23×17 mm.

5719. „ 561. **Fringillaria striolata (Licht.)** . . . Nordost-Afrika.
(4640) Weißer bis bläulichgrauer Grund. Die ziemlich gleichmäßig verteilten nur am stumpfen Pole gehäufter stehenden Flecken sind entweder gelb- bis violettgrau, oder schwarzbraun und grau. 19×14,5 mm.

5720. „ 474pt. **Passerculus alaudinus (Bp.)** . . Nordwest-Amerika.
(4657) Graubläulicher Grund mit mattrosabraunen verwischten Flecken, welche am stumpfen Pole meist einen Kranz bilden. 19×14 mm.

5721. „ 712. **Haemophila ruficeps (Cass.)** . . . . . Kalifornien.
(4672) Weiß, dickbauchig, stark glänzend. 19,5 ×16 mm.

5722. „ —. **Amphispiza deserticola Ridgw.** . . . . . Texas.
(4678) Bläulichweiß mit sehr feinen meist nadelstichgroßen rötlichbräunlichen Pünktchen. 18 ×15 mm.

5723. XII, 629. **Amphispiza belli (Cass.)** . . . . . Kalifornien.
(4678a)
Grundfarbe grünlichweiß mit sehr feinen motacillaartigen rostbraunen und violettgrauen Pünktchen, welche über die ganze Fläche gleichmäßig verteilt sind. 19×14 mm.

5724. „ —. **Junco thurberi Anthony** . . . . . Kalifornien.
(4685)
Weiß mit geringem grünlichen Schimmer. Die meist verwaschenen kleineren und größeren Flecken, welche am stumpfen Pole gehäufter stehen, sind hell- und dunkelrostbraun. 18,5 ×16,5 mm.

5725. „ 655. **Junco dorsalis Henry** . . . . . Arizona.
(4686)
Graublaue Grundfarbe mit meist nur am stumpfen Pole stehenden verwischten mattbräunlichen und lilagrauen Flecken. Dickbauchig wie alle Junco-Eier und stark glänzend. 17×15 mm.

5726. „ —. **Zonotrichia nuttalli Ridgw.** . . . . . Kalifornien.
(4698)
Bläulichgrauer Grund mit schmutzig braunrötlichen, meist sehr dichtstehenden verworrenen Flecken, und von den bekannten albicollis wohl kaum verschieden. 23×16 mm.

5727. „ —. **Melospiza cooperi Ridgw.** . . . . . Kalifornien.
(4708)
Mattbläuliche Grundfarbe mit feinen meist verwischten rostbraunen Fleckchen, wie bei den Gattungsverwandten. 19×15 mm.

5728. „ 718pt. **Passerella unalaschensis (Gm.)** . . . . . Alaska.
(4713)
Graubläulich mit sehr dichtstehenden mattrotbraunen unregelmäßigen oft in die Länge gezogenen Flecken, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen, ohne einen Kranz zu bilden. 22×16 mm.

5729. „ 623. **Passerina versicolor (Bp.)** . . . . . Nord-Amerika.
(4718)
Weiß mit bläulichem Schimmer. 20×14 mm.

5730. „ 261. **Lysurus castaneiceps (Scl.)** . . . . . Columbien.
(4763)
Rahmweiß mit geringem rötlichen Schimmer und kastanienbraunen Ober- und violettgrauen scharf begrenzten Schalenflecken, welche am oberen Ende gedrängter stehen, ohne einen Kranz zu bilden. 24×17 mm.

Fam. Tanagridae.

5731. XI, 105pt. **Calospiza guttata (Cab.)** = *chrysophrys (Scl.)* Venezuela
(4796) (Merida).
Außerordentlich variabel: Von weiß bis zu tiefgrau mit grauen, braunen und auch schwarzen Flecken, die meistens verwischt oder nur selten scharf umgrenzt sind. Von den übrigen Calospiza-Eiern wenig abweichend. 20—24 ×15—16 mm.

5732. XI, 123. **Calospiza cabanisi (Scl.)** . . . . . Guatemala.
(4800)
Den larvata-Eiern sehr ähnlich, nur wenig größer. 22,5×16,5 mm.

5733. „ 124. **Calospiza larvata (Du Bus)** . . . . . Honduras.
(4800a)
Die Grundfarbe ist gelblichweiß. Die über die ganze Fläche verteilten und am stumpfen Pole gehäuften, noch zu einem Kranze vereinigten Flecken sind schwarzbraun, fuchsigbraun und lilagrau. 21×15 mm.

5734. „ 162. **Tanagra abbas Licht.** . . . . . Guatemala.
(4813)
Weißer bis bleigrauer Untergrund mit hellgrauen und schwarzen Pünktchen und Stricheln, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen und auch wohl einen Kranz bilden. 24×16 mm.

5735. „ 242. **Chlorospingus flavipectus (Lafr.)** . . . . Columbien.
(4846)
Weiß mit rostroten und braungelben wenig markierten Flecken, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen. 20×17 mm.

Fam. Ploceidae.

5736. XIII, —. **Pyromelana sylvatica O. Neumann** . Unterer Kongo.
(4859)
Einfarbig matt- und dunkelblau, wie flammiceps. 18—19×13,5—14 mm.

5737. „ 245. **Ploceipasser mahali Smith** . . . . . Kapkolonie.
(4867)
Weiß bis rötlichweißer Grundton mit zarten meist verwischten rostbraunen und grauvioletten nahezu gleichmäßig verteilten Fleckchen. 23×15 mm.

5738. „ 257. **Quelea quelea (L.)** = *sanguinirostris Reichn.* West-Afrika.
(4872)
Fuchsigbraunrot bis gelblichbraun mit sehr verwischten und kaum als solche erkennbaren noch dunkleren kleinen Fleckchen, welche am stumpfen Pole gedrängter stehen. 19×13,5 mm (Die Eier werden verschieden beschrieben.)

5739. „ —. **Munia sharpei (Madar)** . . . . . Deutsch-Neu-Guinea.
(4907)
Weiß. 15,5×12,5 mm.

5740. „ 361. **Uroloncha fumigata (Wald.)** . . . . Andaman-Inseln.
(4917)
Weiß. 15,5×11 mm.

5741. „ 365. **Uroloncha pectoralis (Jerd.)** . . . . . Süd-Indien.
(4921)
Weiß. 17×12 mm.

5742. „ 402. **Uraeginthus angolensis (L.)** . . Deutsch-Ost-Afrika.
(4950)
Weiß. 18×13,5 mm.

5743. „ 407. **Sporopipes squamifrons (Smith)** . . . . Süd-Afrika.
(4950a)
Dunkelbläulichgrau mit umbrabraunen und schwärzlichen größeren und feineren unregelmäßigen Flecken. 16×12 mm.

5744. XIII, 511. **Textor intermedius Cab.** . . . . . Somaliland.
(4953)
Hellgrauer bis blaugrauer Grund mit hell- und dunkelgrauen bis schwärzlichen verwischten Flecken, die keine Stelle der Fläche freilassen und meist noch am stumpfen Pole gehäuft stehen. 28—29×19—20 mm.

5745. „ 424. **Sycobrotus stictifrons (Fischer & Reichn.)** Deutsch-Ost-Afrika (Mikindani).
(4960)
Das mir von Herrn Grote aus Mikindani eingesandte Ei hat weiße Grundfarbe und mattrötliche sehr unregelmäßige Flecken; ich glaube aber, daß, wie bei den Gattungsverwandten, auch bläuliche Eier vorkommen. 25×21 mm.

5746. „ 415. **Heteryphantes nigricollis (Vieill.)** Central-West-Afrika.
(4963)
Bläulichweiß mit feinen rostbräunlichen Flecken; reinweiß oder weiß mit graurötlichen oder rotbraunen größeren Flecken. 21,5×14,5 mm.

5747. „ —. **Hyphantornis femininus Ogilvie Grant.** . . Uganda.
(4970)
Weiß mit grauen und rötlichen Flecken, oder einfarbig mattblau, oder hellblau mit grauen und schwärzlichen feinen Flecken. 25×17 mm.

5748. „ 460. **Sitagra intermedia (Rüpp.)** . . . . . Sansibar.
(4980)
Weiß. 20×14 mm.

5749. „ —. **Sitagra bertrandi Shelley** . . . . . Nyassa.
(4984)
Dunkelblau mit hellgrauen und schwachbläulichen Flecken, oder weiß mit großen rostroten Flatschen. 20×14 mm.

5750. „ 431. **Sitagra olivacea (Hahn)** . . . . . Kapkolonie.
(4989)
Einfarbig dunkelblau, zuweilen mit einem Kranze am stumpfen Ende in noch dunklerem Blau. 23—25×16—17 mm.

Fam. Icteridae.

5751. XI, —. **Sturnella inexpectata Ridgw.** . . . . . Guatemala.
(5057)
Weiß mit zum Teil großen, aber meistens kleineren begrenzten mattbraunen und braunvioletten Flecken, welche meist am stumpfen Pole stehen. 29—31×23 mm.

5752. „ 369. **Icterus chrysocephalus (L.)** . . . . . Venezuela.
(5064)
Grauweiß mit sehr geringem rötlichen Schimmer. Die ammerartigen schwarzen Schnörkeln, Linien und Flecken stehen hauptsächlich am stumpfen Pole. 26,5×18 mm.

5753. „ 385. **Icterus pectoralis (Wagl.)** . . . . . Guatemala.
(5082)
Schmutzigweiß mit wurmartigen violetten, schwarzen und dunkelbraunen Linien und Schnörkeln, meist nur an der oberen oder unteren Hälfte. 26×18 mm.

Fam. Sturnidae.

5754. XIII, 47. **Spodiopsar andamanensis (Beavan)** . Andaman-Inseln.
(5115) Einfarbig dunkelblau. 26×19 mm.

5755. „ 147. **Lamprocorax panayensis (Scop.)** . . . . Philippinen.
(5152) Hellblau mit violetten, umbrabraunen und einigen schwarzen Flecken. 26×20 mm.

5756. „ 172. **Lamprocolius splendidus (Vieill.)** . . . . Goldküste.
(5157) Mattblau mit violettrötlichen Schalen- und rostbraunen meist markierten Oberflecken, die am stumpfen Pole gehäuft stehen. 29×21 mm.

Fam. Eulabetidae.

5757. III, 144. **Creadion carunculatus (Gm.)** . . . . Neu-Seeland.
(5165) Rötlichgraue Grundfarbe mit unregelmäßigen graubraunen und violettgrauen meist größeren fast gleichmäßig verteilten Flecken. 29×23 mm.

Fam. Oriolidae.

5758. III, 210. **Mimeta striata (Quoy & Gaim.)** Deutsch-Neu-Guinea.
(5177) Graugelblicher Grund mit grauvioletten, braungelben und dunkelbraunen unregelmäßigen, am stumpfen Pole meist größeren Flecken. 31×21 mm.

Fam. Dicruridae.

5759. III, 256. **Dissemurulus lophorhinus (V.)** Süd-Indien (Travancore).
(5201) Im allgemeinen den sehr bekannten Buchanga atra-Eiern ähnlich und auch wohl in denselben Variationen vorkommend. Die mir vorliegenden Eier haben weißen bis crêmefarbigen Grund und violettrötliche oft in die Länge gezogene Unterflecken und meist scharf begrenzt rundliche dunkelbraune Oberflecken. 27×20 mm.

Fam. Ptilonorhynchidae.

5760. IV, —. **Lophorhina latipennis Rothsch.** Deutsch-Neu-Guinea.
(5207) Die Grundfarbe ist braungelb; die sehr dichtstehenden rötlichvioletten und braunroten meist in die Länge gezogenen Flecken bedecken die ganze Fläche und stehen nur am stumpfen Pole etwas gehäufter. Starker Glanz. 28—30 ×21—22 mm. (Die in den Novitates Zoologicae Vol. XVII pag. 487 und Tafel X beschriebenen und abgebildeten Eier von Lophorina superba minor Ramsay gleichen den obigen.

Fam. Corvidae.

5761. III, —. **Corvus ussurianus Tacz.** . . . . . Ussuri.
(5221)
Wie die typischen corax.

5762. „ —. **Corvus sibiricus Tacz.** . . . . . Ost-Sibirien.
(5221a)
Wie corax.

5763. „ —. **Nucifraga rothschildi Hart.** . . . . . Ost-Turkestan.
(5255)
Die Eier, welche durch meine Hände gingen, hatten alle eine mehr kugelige Gestalt. Die Zeichnung ist die unserer caryocatactes.

5764. „ 82. **Dendrocitta bayleyi Tytler** . . . . . Andaman-Inseln.
(5270)
Graugelbe Grundfarbe mit über die ganze Fläche verteilten, nur am stumpfen Pole etwas gehäufter stehenden grauvioletten und dunkelgrauen meist großen Flatschen und unregelmäßigen Flecken, ganz wie bei den Eiern von Dendrocitta rufa. Durchschnittlich 30×21 mm.

5765. „ 87. **Cissa ornata (Wagl.)** . . . . . Ceylon.
(5272)
Zwei extreme Typen liegen mir vor. Hellgraugelb mit garrulusartigen sehr feinen gleichmäßig verteilten nur am stumpfen Ende sehr dichtstehenden fuchsiggrauen Flecken. Weißer Grund mit fast nur am stumpfen Pole stehenden dunkelgrauen verwischten Fleckchen. 30×22 und 32×24 mm.

5766. „ —. **Garrulus bambergi Lönnberg** . . . . . Mongolei.
(5276)
Wie glandarius.

5767. „ —. **Psilorhinus vociferus (Cabot)** . . . . . Yucatan.
(5315)
Hellgrau bis gelblichgrau mit glandarius- oder picaartigen feinen über die ganze Fläche gleichmäßig verteilten hell- und dunkelgrauen bis schwärzlichen Fleckchen. 33×25 mm.

Weitere Nachträge.

Fam. Treronidae.

5768. XXI, 20pt. **Vinago nudirostris Sws.** . . . Deutsch-Ost-Afrika.
(321)
31×25 mm.

Fam. Alcedinidae.

5769. XVII, 193. **Ispidina natalensis (Smith)** . . . . . Natal.
(1834a)
Glänzend. Sphärisch. 17×15,5 mm.

Fam. Coliidae.

5770. XVII, —. **Colius minor Reichn.** . . . . . Natal.
(2106) Weiß bis schmutzig gelblichweiß. 21×16 mm.

Fam. Picidae.

5771. XVIII, 319. **Iyngipicus nigresceus Seeb.** . . . . . Japan.
(2322) 18×13,5 mm.

Fam. Muscicapidae.

5772. IV, 272. **Chloropeta natalensis Smith** . . . . . Natal.
(2825) Weiß ins rötliche schimmernd mit einem unbestimmten Kranze von violettgrauen verwischten Unter- und markierten meist nadelstichgroßen rötlichbraunen Oberflecken. Auf der übrigen Fläche nur einzelne Stipperchen. 17,5×11 mm.

Fam. Timeliidae.

5773. VII, —. **Sphenoeacus transvalensis C. Grant** . . . Transvaal.
(3100) Schmutziggrau bis gelblichweiß mit sehr verwischten und kaum als solche erkennbaren violettgrauen Schalenflecken, die am stumpfen Pole einen Kranz bilden, wie bei vielen Eiern der Motacilla boarula. Die Eier der Sphenoeacus africanus, Nr. 3100 pag. 208 des Hauptkataloges, gleichen den vorstehenden, was dahin geändert werden muß. 23,5 × 16 mm.

Fam. Turdidae.

5774. VII, 652. **Tharrhaleus rubidus (T. & Schl.)** . . . . . Japan.
(3418) Tief blaugrün. 19×15 mm.

5775. VII, 41. **Cossypha subrufescens Bocage** . . Deutsch-Ost-Afrika.
(3482) Graurötlich bis fleischfarben mit sehr verwischten dichtstehenden rosrötlichen Flecken, die am stumpfen Pole einen deutlichen Kranz bilden. Unseren Rotkehlchen ähnlich. 22 ×17 mm.

Fam. Nectariniidae.

5776. IX, —. **Cinnyris nyassae Reichn.** . . . . . Gasaland.
(4089) Graubläulich. Die sehr feinen violettgrauen Unter- und hellgrauen Oberflecken bilden am stumpfen Pole einen dichten Kranz. 15,5 ×11,5 mm.

Fam. Fringillidae.

5777. XII, 451. **Pyrrhula rosacea Seebohm** . . . . . Japan.
(4601) Wie europaea.

Fam. Ploceidae.

5578. XIII, 246. **Ploceipasser melanorhynchus Rüpp.** Deutsch-Ost-Afrika.
(4867a) Weiß bis rötlichweißer Grundton mit zarten verwischten rostbraunen und grauvioletten nahezu gleichmäßig verteilten Flecken. 27×15 mm.

5779. „ 415. **Othyphantes reichenowi (Fischer)** . Deutsch-Ost-Afrika.
(4961) Dunkelgraublau bis mattblau mit meist verwischten am oberen Ende dichterstehenden großen mattbraunen Flecken. Wie bei den verwandten emini werden auch wohl Eier mit rötlich-weißem Grunde vorkommen. 20,5—21 ×15,5—16 mm.

Fam. Corvidae.

5780. III, —. **Nucifraga japonica Hartert** . . . . . Japan.
5255) Wie unsere caryocatactes.

Verzeichnis der Ordnungen und Familien.

	Anzahl der Arten
Ordnung I Rheiformes	
Familie Rheidae	3
Ordnung II Struthioniformes	
Familie Struthionidae	4
Ordnung III Casuariiformes	
Familie Dromaeidae	2
„ Casuariidae	10
Ordnung IV Apterygiformes	
Familie Apterygidae	3
Ordnung V Tinamiformes	
Familie Tinamidae	40
Ordnung VI Galliformes	
Familie Megapodiidae . . .	24
„ Cracidae	29
„ Tetraonidae	24
„ Phasianidae	133
„ Numididae	12
„ Meleagridae	4
„ Odontophoridae . . .	24
Ordnung VII Turniciformes	
Familie Turnicidae	16
Ordnung VIII Pteroclidiformes	
Familie Pteroclididae	11
Ordnung IX Columbiformes	
Familie Treronidae	69
„ Columbidae	42
„ Peristeridae	88
„ Gouridae	3
„ Didunculidae	1
Ordnung X Opisthocomiformes	
Familie Opisthocomidae . . .	1
Ordnung XI Ralliformes	
Familie Rallidae	102
„ Heliornithidae	—

	Anzahl der Arten
Ordnung XII Podicipedidiformes	
Familie Podicipedidae	20
Ordnung XIII Colymbiformes	
Familie Colymbidae	5
Ordnung XIV Spheniscifomes	
Familie Spheniscidae	16
Ordnung XV Procellariiformes	
Familie Procellariidae	15
„ Puffinidae	42
„ Pelecanoidae	3
„ Diomedeidae	14
Ordnung XVI Alciformes	
Familie Alcidae	25
Ordnung XVII Lariformes	
Familie Laridae	95
„ Stercorariidae	6
Ordnung XVIII Charadriiformes	
Familie Chionididae	1
„ Thinocorythidae . . .	3
„ Charadriidae	141
„ Parridae	7
„ Cursoriidae	6
„ Glareolidae	8
„ Dromadidae	1
„ Oedicnemidae	8
„ Otididae	23
Ordnung XIX Gruiformes	
Familie Gruidae	17
„ Aramidae	2
„ Rhinochetidae	1
„ Mesoenatidae	—
„ Eurypygidae	1

	Anzahl der Arten
Familie Psophiidae	1
„ Cariamidae	2
Ordnung XX Ardeiformes	
Familie Ibididae	17
„ Plataleidae	6
„ Ciconiidae	16
„ Scopidae	1
„ Balaenicipitidae	—
„ Ardeidae	66
Ordnung XXI Palamedeiformes	
Familie Palamadeidae	1
Ordnung XXII Phoenicopteriformes	
Familie Phoenicopteridae	4
Ordnung XXIII Anseriformes	
Familie Anatidae	156
Ordnung XXIV Pelecaniformes	
Familie Phalacrocoracidae	34
„ Plotidae	4
„ Sulidae	10
„ Fregatidae	2
„ Phaëthontidae	5
„ Pelecanidae	9
Ordnung XXV Cathartidiformes	
Familie Cathartidae	5
Ordnung XXVI Accipitriformes	
Familie Serpentariidae	1
„ Vulturidae	13
„ Falconidae	206
„ Pandionidae	5
Ordnung XXVII Strigiformes	
Familie Bubonidae	90
„ Strigidae	9
Ordnung XXVIII Psittaciformes	
Familie Nestoridae	—
„ Loriidae	16
„ Cyclopsittacidae	1
„ Cacatuidae	12
„ Psittacidae	113
„ Stringopidae	1
Ordnung XXIX Coraciiformes	
Familie Steatornithidae	1
„ Podargidae	12
„ Leptosomatidae	1
Familie Coraciidae	11
„ Alcedinidae	63
„ Bucerotidae	17
„ Upupidae	4
„ Irrisoridae	1
„ Meropidae	15
„ Momotidae	8
„ Todidae	3
„ Caprimulgidae	63
„ Macropterygidae	4
„ Cypselidae	34
„ Trochilidae	115
„ Coliidae	7
Ordnung XXX Trogones	
Familie Trogonidae	16
Ordnung XXXI Coccyges	
Familie Musophagidae	7
„ Cuculidae	83
Ordnung XXXII Scansores	
Familie Indicatoridae	2
„ Capitonidae	22
„ Rhamphastidae	3
Ordnung XXXIII Piciformes	
Familie Galbulidae	2
„ Bucconidae	7
„ Picidae	135
Ordnung XXXIV Eurylaemiformes	
Familie Eurylaemidae	7
Ordnung XXXV Menuriformes	
Familie Menuridae	2
Ordnung XXXVI Passeriformes	
Familie Pteroptochidae	6
„ Conopophagidae	2
„ Formicariidae	48
„ Dendrocolaptidae	72
„ Tyrannidae	149
„ Oxyrhamphidae	—
„ Pipridae	12
„ Cotingidae	16
„ Phytotomidae	3
„ Pittidae	23
„ Philepittidae	1
„ Xenicidae	1
„ Atrichornithidae	—

		Anzahl der Arten
Familie	Hirundinidae	68
„	Muscicapidae	177
„	Campophagidae	30
„	Pycnonotidae	90
„	Timeliidae	221
„	Troglodytidae	67
„	Cinclidae	10
„	Mimidae	37
„	Turdidae	261
„	Sylviidae	200
„	Vireonidae	26
„	Ampelidae	3
„	Artamidae	10
„	Vangidae	3
„	Prionopidae	24
„	Aerocharidae	—
„	Laniidae	95
„	Paridae	86
„	Chamaeidae	1
„	Regulidae	10
„	Sittinae	24
„	Certhiidae	13
„	Zosteropidae	32
„	Dicaeidae	25

		Anzahl der Arten
Familie	Nectariniidae	64
„	Promeropidae	1
„	Meliphagidae	72
„	Mniotiltidae	83
„	Drepanididae	1
„	Motacillidae	64
„	Alaudidae	77
„	Catamblyrhynchidae	—
„	Fringillidae	412
„	Coerebidae	19
„	Procniatidae	1
„	Tanagridae	69
„	Ploceidae	178
„	Icteridae	98
„	Sturnidae	34
„	Eulabetidae	32
„	Paramythiidae	—
„	Buphagidae	—
„	Oriolidae	16
„	Dicruridae	22
„	Paradiseidae	6
„	Ptilonorhynchidae	10
„	Corvidae	114
„	Streperidae	6

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

A.

abbas: Tanagra 31.
abboti: Cyanecula 21.
acaciae: Argya 18.
Acanthopneuste 22.
Acrocephalus 22.
acuticaudus: Cypselus 11.
adolphi: Phaëthornis 11.
aequatorialis: Chalcomitra 25.
affinis: Barbatula 12.
„ : Cryptolopha 16.
„ : Trochalopterum 18.
Agyrtria 11.
alaudinus: Passerculus 29.
alberti: Crax 3.
albertisi: Goura 5.
albicans: Troglodytes 20.
albigularis: Bleda 17.
Alcippe 19.
amaurocephalus: Euscarthmus 14.
Amazona 9.
amicta: Nyctiornis 10.
Ammoperdix 4.
Amphispiza 29, 30.
andamanensis: Centropus 12.
„ : Dendrocopus 13.
andamanensis: Spodiopsar 33.
andamanicus: Cyrtostomus 25.
angolensis: Uraeginthus 31.
Anorthura 20.
Antichromus 23.
Anthipes 15.
Anthothreptes 25.
Anthus 27.
Archibuteo 8.
Arboricola 4.
Argya 18.
arizela: Geothlypis 27.
arquata: Cichladusa 21.
Arses 17.
Artamia 23.
Asarcornis 7.
astigma: Muscicapa 15.
atrata: Ceratogymna 10.
atratus: Dendrocopus 13.
atripennis: Fluvicola 14.
„ : Saltator 28.
aurantiacus: Casuarius 3.
aurifrons: Chloropsis 17.
austeni: Ptilolaema 10.
„ : Trochalopterum 18.
australis: Vinago 5.
Automolus 14.
azoricus: Regulus 24.

B.

bairdi: Geothlypis 27.
bakeri: Trochalopterum 18.
bambergi: Garrulus 34.
barbara: Petronia 28.
Barbatula 12.
bartletti: Agyrtria 11.
batemani: Arboricola 4.
Batrachostomus 9.
bayleyi: Dendrocitta 34.
beema: Motacilla 27.
belli: Amphispiza 30.
berlepschi: Thamnophilus 13.
bernsteini: Centropus 12.
bertrandi: Sitagra 32.
bicolor: Artamia 23.
biddulphi: Syrnium 8.
bifasciatus: Cinnyris 25.
bilineata: Barbatula 12.
bilopha: Otocorys 28.
bistriatus: Oedicnemus 6.
bivitatta: Petroeca 15.
blackburniae: Dendroeca 26.
blakistoni: Anthus 27.
Bleda 17.
boehmi: Pternistes 4.
Brachyrhamphus 6.
brachyurus: Micropternus 13.
Bradyornis 15.
brevirostris: Poecile 24.
Brotogerys 9.
brunneiventris: Megapodius 3.
brunnescens: Horornis 23.
Bubo 8.
Buteo 7.

C.

cabanisi: Calospiza 31.
Cacomantis 31.
(caerulescens): Fringilla 28
Calandrella 28.
Calospiza 30, 31.
Camaroptera 23.
Campophilus 13.
Canchroma 7.
canicollis: Trachelotis 7.
cantator: Thryothorus 20
cantatrix: Cryptolopha 16.
capistrata: Saxicola 21.
Caprimulgus 10.
Carpodacus 29.

carunculatus: Creadion 35.
castanea: Dendroeca 27.
castaneiceps: Lysurus 30.
castaneocoronata: Oligura 19.
Casuarius 3.
cathpharius: Dendrocopus 13.
caudacuta: Chaetura 11.
caudata: Urocichla 20.
Centropus 12.
Ceratogymna 10.
Ceyx 10.
Chaetura 11.
Chalcomitra 25.
chloris: Authus 27.
chlorocephala: Chloropsis 17.
Chloropeta 35.
Chloropsis 17.
chlororhynchus: Centropus 12.
Chlorospingus 31.
cholmleyi: Ammoperdix 4.
chryseola: Wilsonia 27.
chrysocephalus: Icterus 32.
Chrysolophus 4.
(chrysophrys): Calospiza 30.
Cichladusa 21.
Cinclus 20.
cinerea: Emberiza 29.
Cinnyris 25, 35.
Cissa: 34.
Cisticola 22.
Cochoa 21.
Colius 11, 34.
columbianus: Philydor 14.
confinis: Oreortyx 4.
congener: Eurillas 18.
„ : Pomatorhynchus 23.
connivens: Ninox 8.
conspicillata: Pseudogerygone 16.
Conurus 9.
cooperi: Melospiza 30.
coquerelli: Coua 12.
coronatus: Spizaëtus 8.
Corvus 34.
Corydon 13.
Cossypha 21, 35.
coturniculus: Creciscus 5.
Coua 12.
Crateropus 18.
Crax 3.
Creadion 33.
Creciscus 5.
cruralis: Heteroxenicus 19.
Cryptolopha 16.
cryptus: Thryomanes 20.
Cuculus 12.
Cyanecula 21.
Cyanistes 24.
(Cyanolanius) 23.
Cyanops 12.
Cyornis 15.
Cypseloides 11.
Cypselus 11.
Cyrtostomus 25.

D.

daurica: Anorthura 20.
davisoni: Acanthopneuste 22.
(deckeni): Nectarinia 25.
decoratus: Pterocles 5.
Dendrocitta 34.
Dendrocopus 13.
Dendroeca 26, 27.
Dendrophila 24.
deserticola: Amphispiza 29.
„ : Melizophilus 22.
discolor: Leptosoma 10.
Dissemurulus 33.
dorsalis: Junco 30.
dresseri: Poecile 24.
(Drymochares) 19.
dubius: Schoeniparus 19.
Dupetor 7.

E.

Elanus 8.
Emberiza 29.
emiliae: Phaëthornis 11.
emmae: Pratincola 21.
Empidonax 14.
enerratus: Caprimulgus 10.
Eos 9.
epirhinus: Lophoceros 10.
erckeli: Francolinus 4.
Eurillas 18.
Euscarthmus 14.
exilis: Psaltria 24.

F.

Falco 8.
feae: Turdus 21.
feldeggi: Motacilla 27.
femininus: Hyphantornis 32.
Fiscus 23.
flavescens: Psittacula 9.
flavipectus: Chlorospingus 31.
flavipes: Ketupa 8.
flosculus: Loriculus 9.
Fluvicola 14.
formosa: Dendrophila 24.
Francolinus 4.
frater: Pomatorhynchus 23.
fratercula: Alcippe 19.
Fringilla 28.
Fringillaria 29.
frontatus: Conurus 9.
fuellborni: Laniarius 23.
fumigata: Uroloncha 31
fumigatus: Cypselus 11.
„ : Melipotes 26.
fuscata: Eos 9.
fuscicollis: Poeocephalus 9.

G.

Galerida 28.
Garrodia 5.
Garrulax 18.
Garrulus 34.
Geothlypis 27.
gindiana: Lophotis 6.
Goura 5.
graciae: Dendroeca 27.
gracilis: Tachornis 11.
Grallaria 13.
Granatellus 27.
grayi: Crax 3.
griseicauda: Rupornis 8.
griseinucha: Montifringilla 28.
guatemalensis: Grallaria 13.

guayanensis: Zenaida 5.
guianensis: Odontophorus 4.
gularis: Cuculus 12.
„ : Myrmotherula 13.
guttata: Calospiza 30.
Guttera 4.

H.

haematodes: Trichoglossus 9.
Haemophila 29.
(haemorrhous): Carpodacus 29.
hardwickii: Chloropsis 17.
Hemixus 17.
Herpornis 19.
Heteroxenicus 19.
Heteryphantes 32.
hildebrandti: Francolinus 4.
„ : Hemixus 17.
himalayensis: Loxia 29.
hodgsoni: Poliomyias 15.
hodgsoniae: Perdix 4.
homeyeri: Lanius 23.
Horornis 23.
hudsoni: Siptornis 14.
Huhua 8.
humboldti: Pternistes 4.
Hydrornis 14.
Hypocharmosyna 9.
Hyphantornis 32.
hypoleuca: Micruria 6.
„ : Oestrelata 6.
„ : Sporophila 28.

I.

Ibidorhynchus 6.
icterotis: Platycercus 9.
Icterus 32.
igneitincta: Minla 19.
inexpectata: Sturnella 32.
intermedia: Arboricola 4.
„ : Sitagra 32.
intermedius: Schoeniparus 19.
intermedius: Textor 32.
Ispidina 34.
Igngipicus 35.

J.

japonica: Nucifraga 36.
jardinici: Dendrocopus 13.
javanica: Zosterops 24.
jobiensis: Tropidochynchus 26.
johannis: Thoracotreron 5.
johnstoni: Nectarinia 25.
jubatus: Rhinochetus 7.
Junco 30.

K.

kamtschatica: Pyrrhula 29.
kamtschaticus: Tetrao 3.
kamtschatkensis: Pinicola 29.
kiautschensis: Bubo 8.
kennicotti: Scops 8.
Ketupa 8.

L.

Lamprocolius 33.
Lamprocorax 33.
Laniarius 23.
Lanius 23.
latipennis: Lophorhina 33.
lauterbachi: Arses 17.
larvata; Calospiza 31.
latirostris: Myiagra 16.
Lecythoplastes 15.
Leptosoma 10.
leucopleura: Bleda 18.
leucoptera: Asarcornis 7.
leucothorax: Rhipidura 16.
leucurus: Elanus 8.
Limosa 6.
littoralis: Camaroptera 23.
longirostris: Phaëthornis 11.
Lophoceros 10.
Lophorhina 33.
lophorhinus: Dissemurulus 33.
Lophornis 11.
Lophotis 6.
Loriculus 9.
Loxia 29.
Lullula 28.
Lurocalis 10.
lutescens: Vermivora 26.
Lysurus 30.

M.

macondorum: Guttera 4.
macrodactylus: Turdinus 18.
madaraszi: Serinus 28.
madeirensis: Anthus 27.
mahali: Ploceipasser 31.
major: Tribura 22.
malacoptilus: Rimator 19.
marmoratus: Brachyrhamphus 6.
marwitzi: Fiscus 23.
massena: Trichoglossus 9.
„ : Trogon 11.
matschiei: Poeocephalus 9.
Megapodius 3.
megarhynchus: Melilestes 25.
Melanerpes 12.
melanocephalus: Melithreptes 25.
melanogenys: Poecilodryas 16.
melanonota: Cossypha 21.
melanopogon: Melanerpes 12.
melanoptera: Volvocivora 17.
melanochynchus: Ploceipasser 35.
Melilestes 25.
Melipotes 26.
Melithreptes 25.
Melizophilus 22.
Melospiza 30.
ménétriesi: Buteo 7.
„ : Myrmotherula 13.
mercenaria: Amazona 9.
Merula 21.
Micropternus 13.
microrhynchum: Rhamphomicrum 11.
Micruria 6.
Mimeta 33.
Minla 19.
minor: Colius 34.
minutus: Antochromus 23.
modesta: Bradyornis 15.
monachus: Centropus 12.
moniliger: Batrachostomus 9.
Montifringilla 28.

moreleti: Fringilla 28.
Motacilla 27.
Munia 31.
murinus: Thamnophilus 13.
Muscicapula 15.
Myiadectes 20.
Myiagra 16.
myochrous: Tachornis 11.
Myrmotherula 13.
Myzomela 25.

N.

natalensis: Chloropeta 35.
„ : Ispidina 34.
nativitatis: Puffinus 5.
Nectarinia 25.
nereis: Garrodius 5.
nesophilus: Dupetor 7.
nigrescens: Deudroeca 26.
„ : Iyngipicus 35.
nigricollis: Heteryphantes 32.
nigrilora: Parula 26.
Ninox 8.
nipalensis: Huhua 8.
nitens: Psalidoprocne 11.
Nothocrax 3.
novae-zealandiae: Limosa 6.
Nucifragra 34, 36.
nudirostris: Vinago 34.
nuttalli: Zonotrichia 30.
nyassae: Cinnyris 35.
Nyctala 8.
Nyctiornis 10.

O.

oatesi: Hydrornis 14.
obscurus: Chrysolophus 4.
ocularis: Conurus 9.
Odontophorus 4.
Oedicnemus 6.
Oestrelata 6.
Oligura 19.
olivascens: Sitagra 32.
ombriosus: Cyanistes 24.
opistholeuca: Saxicola 21.
Oporornis 27.
Oreortyx 4.
orientalis: Anthotreptes 25.
ornata: Cissa 34.
ornatus: Lophornis 11.
Ortalis 3.
Orthotomus 22.
Othyphantes 36.
Otocoryx 28.

P.

pacificus: Bubo 8.
pallida: Galerida 28.
„ : Lullula 28.
pallidipes: Cyornis 15.
pallidiventris: Ortalis 3.
pallidus: Colius 11.
palmae: Fringilla 28.
panayensis: Lamprocorax 33.
Parabuteo 7.
Parula 26.
Passer 28.
Passerculus 29.
Passerella 30.
Passerina 30.
pectoralis: Icterus 32.
„ : Uroloncha 31.
Perdix 4.
peregrina: Vermivora 26.
peregrinator: Falco 8.
persica: Saxicola 21.
Petroeca 15.
Petronia 28.
Picolaptes 14.
Pinicola 29.
phaeopygia: Oestrelata 6.
Phaëthornis 11.
philadelphia: Oporornis 27.
Philydor 14.
Phoenicophais 12.
phoenicura: Rhipidara 16
Platycercus 9.
pleskei: Cyanistes 24.
plicatus: Rhytidoceros 10.
Ploceipasser 31, 35.
plumbea: Sporophila 28.
plumbeitarsus: Acanthopneuste 22.
Poecile 24.
Poecilodryas 16.
Poeocephalus 9.
poliogenys: Anthipes 15.
Poliomyias 15.
Pomatorhynchus 23.
Pratincola 21.
preussi: Lecythoplastes 15.
Propasser 29.
Psalidoprocne 15.
Psaltria 24.
Psephotes 9.
Pseudogerygone 16.
Psilorhinus 34.
Psittacula 9.
Pternistes 4.
Pteroclis 5.
Ptilolaemus 10.
Ptilotis 26.
Puffinus 5.
Pycnonotus 18.
Pyromelana 31.
pyrrhocephalus: Phoenicophais 12.
pyrrhoptera: Alcippe 19.
pyrrhopterus: Brotogerys 9.
Pyrrhula 29, 35.

Q.

Quelea 31.
quelea: Quelea 31.

R.

ramuensis: Pseudogerygone 16.
Regulus 24.
rehsei: Acrocephalus 22.
reichenowi: Othyphantes 36.
reptata: Urocichla 20.
Rimator 19.
Rhamphomicrum 11.
Rhinochetus 7.
Rhipidura 16.
Rhytidoceros 10.
richardsoni: Nyctala 8.
robustus: Campophilus 13.
rosacea: Pyrrhula 35.
roseatus: Carpodacus 29.
roseipectus: Carpodacus 29.
rothschildi: Nucifraga 34.
rubescens: Cyanops 12.

rubiginosus: Automolus 14.
rufescens: Crateropus 18.
„ : Thryophilus 20.
ruficeps: Haemophila 29.
„ : Orthotomus 22.
ruficollis: Cinclus 20.
(„): Rhytidoceros 10.
„ : Turdus 21.
rufa: Cisticola 22.
Rupornis 8.

S.

sacerdotis: Ceyx 10.
sagittata: Scops 8.
sallaei: Granatellus 27.
Saltator 28.
salvini: Empidonax 14.
(sanguinirostris): Quelea 31.
santacruzi: Melanerpes 12.
saturata: Merula 21.
Saxicola 21.
Schoeniparus 19.
sclateri: Myzomela 25.
Scops 8.
semitorquatus: Lurocalis 10.
sennetti: Tachytriorchis 7.
Sericornis 22.
Serinus 38.
severus: Falco 8.
sharpei: Munia 31.
„ : Ptilotis 26.
siamensis: Zosterops 24.
sibiricus: Corvus 34.
simus: Cacomantis 12.
Siptornis 14.
Sitagra 32.
Sitta 24.
soulayeti: Picolaptes 14.
Spizaetus 8.
Sphenoeacus 35.
splendidus: Lamprocolius 33.
Spodiopsar 33.
Sporophila 28.
Sporopipes 31.
squamatus: Francolinus 4.
squamiceps: Argya 18.
squamifrons: Sporopipes 31.
stictifrons: Sycobrotus 32.
strangei: Cisticola 22.
striata: Mimeta 33.
striolata: Fringillaria 29.
strophiatus: Archibuteo 8.
„ : Tharrhaleus 21.
struthersi: Ibidorhynchus 6.
Sturnella 32.
suahelica: Terpsiphone 16.
subplacens: Hypocharmosyna 9.
subrufesceus: Cossypha 35.
sumatranus: Corydon 13
superciliaris: Xiphorhamphus 18.
superciliosus: Phaëthornis 11.
Sycobrotus 32.
sylvatica: Pyromelana 31.
sylvia: Sericornis 22.
Synallaxis 14.
Syrnium 8.

T.

Tachornis 11.
Tachytriorchis 7.
Tanagra 31.
(Tatare) 22
tephronota: Sitta 29.
Terpsiphone 16.
Tetrao 3.
Textor 32.
Thamnophilus 13.
Tharrhaleus 21, 35.
Thoracotreron 5.
Thryomanes 20.
Thryophilus 20.
Thryothorus 20.
tibetana: Calandrella 28.
tigrina: Dendroeca 26.
tingitanus: Passer 28.
thura: Propasser 29.
thurberi: Junco 30.
Todopsis 16.
torquatus: Synallaxis 14.
Trachelotis 7.
transvalensis: Sphenoeacus 35.
Tribura 22.
Trichoglossus 9,
Trochalopterum 18.
Trogon 11.
Troglodytes 20.
Tropidorhynchus 26.
Turdinus 18.
Turdus 21.

U.

unalaschensis: Passerella 30
unicinctus: Parabuteo 7.
unicolor: Myiadectes 20.
Uraeginthus 31.
Urocichla 20.
Uroloncha 31.
(uropygialis) Limosa 6.
urumutum: Crax 3.
ussurianus: Corvus 34

V.

Vermivora 26.
versicolor: Passerina 30.
Vinago 5, 34.
viridis: Cochoa 21.
vociferus: Psilorhinus 34.
Volvocivora 17.

W.

waddellii: Garrulax 18
wallacei: Todopsis 16.
waltoni: Propasser 29.
Wilsonia 27.

X.

xantholeuca: Herpornis 19.
xanthorrhous: Psephotes 9.
„ : Pycnonotus 18.
Xiphorhamphus 18.

Z.

zeledoni: Canchroma 7.
Zenaidura 5.
zimmermanni: Buteo 7.
Zonotrichia 30.
Zosterops 24.

Tafel V

1. Todopsis wallacei *Gray* . . . . . Seite 16, Nr. 5585.
2. Arses lauterbachi *Reichn.* . . . . . „ 17, „ 5592.
3. Herpornis xantholeuca *Hodgs.* . . . . . „ 19, „ 5618.
4. Melilestes megarhynchus *Gray* . . . . . „ 25, „ 5676.
5. Artamides caeruleigularis *(Gray)* . . . . „ 372, „ 5408.
   (s. Hauptkatalog Nr 5408)
6. Melilestes megarhynchus *Gray* . . . . . „ 25, „ 5676.
7. Cichladusa arquata *Peters* . . . . . „ 21, „ 5636.
8. Acrocephalus rehsei *(Finsch)* . . . . . „ 22, „ 5641.
9. Laniarius fuelleborni *Reichn.* . . . . . „ 23, „ 5655.
10. Minla igneitincta *Hodgs.* . . . . . „ 19, „ 5619.
11. Tityra brasiliensis *(Sws.)* . . . . . „ 173, „ 2638.
    (s. Hauptkatalog Nr. 2633)
12. Chloropsis aurifrons *(Temm.)* . . . . . „ 17, „ 5595.

Tafel V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

. Georg Krause ad nat. pinx.

Lith. Anst. v. A. Gillsch, Jena

Tafel VI

1. Micruria hypoleuca *(Xantus)* . . . . . Seite 6, Nr. 5472.
2. Micruria hypoleuca *(Xantus)* . . . . . „ 6, „ 5472.
3. Lecythoplastes preussi *Reichn.* . . . . . „ 15, „ 5574.
4. Rhinochetus jubatus *Verr. & Des Murs* . . „ 7, „ 5478.
5. Melizophilus deserticola *Tristr.* . . . . . „ 22, „ 5646.
6. Creciscus coturniculus *(Ridgw.)* . . . . . „ 5, „ 5466.
7. Batara cinerea *(Vieill.)* . . . . . „ 154, „ 2369.
   (s. Hauptkatalog Nr. 2369)
8. Corydon sumatranus *(Raffl.)* . . . . . „ 18, „ 5558.

Tafel VI.

1

2

3

4

5



6



7

8

Georg Krause ad nat. pinx

Korrekturen.

Nr. 33. Tief dunkelblau, walzenförmig. 67×47 mm.
„ 34. Wie vorige. 74×48 mm.
„ 449. 28×20 mm.
„ 537. Wie Ocydromus australis, nur sind die Flecken meist kleiner. Glänzend, und sich den Aramides nähernd. 47—48×32—33,5 mm.
„ 540. Einfarbig gelblichweiß. 30×27 mm. Malakka.
„ 653. Süd-Amerika.
„ 661. 69×45,5 mm. Malta.
„ 1715. 25×22 mm.
„ 1901. Statt aequinoctialis — aequatorialis Gould.
„ 3100. Schmutziggrau bis gelblichweiß mit sehr verwischten und kaum als solche erkennbaren violettgrauen Schalenflecken, welche am stumpfen Pole einen Kranz bilden. 23,5×16 mm.
„ 3219. Südwestliches Nord-Amerika.
„ 3356. Die inzwischen eingegangenen Eier von Semimerala nigrescens messen 27×19 mm.
„ 3482. Cossypha heuglini Hartl. Wie helle Milchschokolade oder fleischfarben mit etwas dunkelerem Ton am stumpfen Pole. 22×17 mm. (Grote). Nach Schuster sind die Eier schokoladenbraun, gleichen also mehr denen von bicolor.
„ 3482 Rauchschwalbenartige Fleckung und nicht blau.
„ 4791. Weiß mit zarten schwarzbraunen, meisenartigen Flecken. 15×12 mm.
„ 4793. Vermutlich nicht blau, sondern wie die Gattungsverwandten gefleckt.
„ 4869. Einfarbig weiß, ziemlich dickbauchig. 18×14 mm.
„ 5331. Statt hildebrandti — johnstoni Shelley.

Kurzes übersichtliches Verzeichnis von Nehrkorn's Eiersammlung.

Fam. Rheidae.

Rhea americana (L.), Brasilien, Argentinien.
„ macrorhyncha Scl. . . Nord-Brasilien.
„ darwini Gould . . . . . Süd-Bolivien.

Fam. Struthionidae.

Struthio camelus L. . . . Nordost-Afrika.
„ molybdophanes Reichn. . . . . Somaliland.
„ australis Gurney. . . Süd-Afrika.
„ massaicus Neum. . . . Massailand.

Fam. Dromaeidae.

Dromaeus novae-hollandiae Lath. . . . . Ost-Australien.
„ irroratus Hartl. . . . West-Australien.

Fam. Casuariidae.

Casuarius bicarunculatus Scl., Aru-Inseln.
„ casuarius (L.). . . . . Ceram.
„ australis Wall. . . . Queensland.
„ beccarii Scl. . . . . Aru-Inseln.
„ uniappendiculatus Blyth. . . . . Salawati.
„ aurantiacus Rothsch., Deutsch-Neu-Guinea.
„ occipitalis Salvad. . Insel Jobi.
„ papuanus Schl. . Nordwest-Neu-Guinea.
„ hecki Rothsch., Deutsch-Neu-Guinea.
„ bennetti Gould, Neu-Pommern.

Fam. Dinornithidae.

Emeus crassus (Owen) . Neu-Seeland (Artefact).

Fam. Aepyornithidae.

Aepyornis maximus Geoffr., Madagascar (Artefact).

Fam. Apterygidae.

Apteryx australis Shaw . . . Neu-Seeland.
„ mantelli Bartl. . . . Neu-Seeland.
„ oweni Gould . . . . Neu-Seeland.

Fam. Tinamidae.

Tinamus tao Temm. . . . . Bolivien.
„ robustus Scl. . . . . Guatemala.
„ solitarius (V.) . . . . Rio Grande.
„ major (Gm.) . . . . . Rio Negro.
„ subcristatus (Cab.) . . . Surinam.
„ latifrons Salvad. . . . . Ecuador.
„ ruficeps S. & S. . . . . Amazonia.
„ castaneiceps, Salvad . . Chiriqui.
„ guttatus Pelz. . . . . Peru.
Nothocercus frantzii (Lawr.), Costa Rica.
„ intercedens Salvad., ... Columbien.
Crypturus cinereus (Gm.), Oberer Amazonas.
„ obsoletus (Temm.) . . Brasilien.
„ cerviniventris S. & S., Trinidad.
„ pileatus (Bodd.) . . Chiriqui, Brasilien.
„ tataupa (Temm.), Bolivien, Süd-Brasilien.
„ parvirostris Wagl., Matto Grosso.
„ undulatus (Temm.). . Paraguay.
„ scolopax (Bp.). . . Matto Grosso.
„ adspersus (Temm.) . . S. Paulo.
„ balstoni Bartl. . . . . Peru.
„ strigulosus (Temm.) . Brasilien.
„ erythropus (Pelz.) . . Amazonia.

Crypturus variegatus (Gm.) . . . Brasilien.
„ noctivagus (Pz.W.) . . Brasilien.
„ cinnamomeus (Less.), Yucatan.
„ boucardi (Scl.) . . . . Honduras.
„ transfasciatus S. & S., Ecuador.
Rhynchotus rufescens (Temm.), Brasilien.
„ maculicollis Gray. . Bolivien.
Nothoprocta cinerascens (Burm.) . . . . Argentinien.
„ perdicaria (Kittl.) . . . Chile.
„ pentlandi (Gray) . Bolivien.
Nothoprocta curvirostris S. & S. . . Peru.
„ ornata (Gray) . . . Bolivien.
Nothura maculosa (Temm.) . . . Brasilien.
„ boraquira (Spix) . . . Argentina.
„ nigriguttata Salvad. . Argentina.
Calopezus elegans (D'Orb. & G.) . . . . . Patagonien.
Tinamotis pentlandi Vig. . . . . Bolivien.

Fam. Megapodiidae.

Megapodius nicobariensis Blyth, Nicobaren.
„ cumingi Dillwyn. . Palawan.
„ sanghirensis Schl. . . . . Talaut-Inseln.
„ forsteni Gray. . . . Amboina.
„ affinis Meyer . . . Insel Jobi.
„ brunneiventris Meyer . . . . . Neu-Guinea.
„ eremita Hartl., Neu-Pommern.
„ macgillivrayi Gray . Britisch-Neu-Guinea.
„ duperreyi Less. & G., Australien, Neu-Guinea.
„ freycineti Q. & G. . . Ternate, Batjan.
„ layardi Tristr., Neu-Hebriden.
„ laperousei Temm., Mariannen.
„ senex Hartl. . . Palau-Inseln.
„ pritchardi Gray, Ninafou-Insel.
Eulipoa wallacei (Gray) . . . . . Amboina.
Lipoa ocellata Gould. . . . . Australien.
Talegallus cuvieri Less. . . . Neu-Guinea.
„ fuscirostris Salvad., Aru-Inseln.
„ jobiensis Meyer . . Insel Jobi.
„ longicaudus Meyer, Neu-Guinea.
Catheturus lathami (Lath.) . . Australien.
„ purpureicollis Le Souëf . . . . . Kap York.
Aepypodius arfakianus (Salvad.) . . . . Neu-Guinea.
Megacephalum maleo Hartl. . . . Celebes.

Fam. Cracidae.

Crax alector L. . . . . Guayana.
„ fasciolata Spix . . . . . Brasilien.
„ globicera L. . . . Central-Amerika.
„ grayi Ogilvie Grant. A. d. Zool. Gart.
„ carunculata Temm. . . . . Brasilien.
„ globulosa Spix . . . . . Peru.
„ daubentoni Gray . . . . . Venezuela.
„ alberti Fraser . . . . . Columbien.
„ hecki Reichn. . . . A. d. Zool. Gart.
Nothocrax urumutum (Spix) . . Guayana.
Mitua mitu (L.) . . . . Oberer Amazonas.
„ tomentosa (Spix). . . . Rio Negro.
Pauxis pauxi (L.) . . . . . Süd-Amerika.
Penelope superciliaris Illig. . . . Brasilien.
Penelope jacupeba Spix . . . Columbien.
„ marail Gm. . . . . Guayana.
„ obscura Illig. . . . . Brasilien.
„ cristata (L.) . . . . Columbien.
„ jacucaca Spix . . . . Brasilien.
Ortalis motmot (L.) . . . . . Guayana.
„ canicollis (Wagl.) . . . Argentina.
„ guttata (Spix) . . . . . Peru.
„ vetula (Wagl.) . . . . . Honduras.
„ pallidiventris (Ridgw.) . Yucatan.
„ maccalli Baird . . . . . Texas.
Pipile cumanensis (Jacq.) . . . . . Peru.
„ jacutinga (Spix), Südost-Brasilien.
Aburria aburri (Less.) . . . . Columbien.
Chamaepetes goudoti (Less.) . . Peru, Columbien.

Fam. Tetraonidae.

Lagopus scoticus (Lath.) . . . Schottland.
„ lagopus (L.) . . . . . Lappland.
„ mutus (Montin.) . . . . Schweiz.
„ rupestris (Gm.) . . . . . Island.
„ reinhardti Brehm. . . . Grönland.
„ leucurus Sws. & Rich. . Oregon.
Lyrurus tetrix (L.) . . . Deutschland, Norwegen.
Lyrurus mlokosiewiczi (Tacz.), Kaukasus.
Tetrao urogallus L. . . . Harz, Schweden.
„ kamtschaticus Kittl., Kamtschatka.
„ uralensis Menzbier. . . . Orenburg.

Canachites canadensis (L.), Nord-Amerika.
Dendragapus obscurus (Say) . . Colorado.
„ fuliginosus Ridgw. . . . . Kalifornien.
„ richardsoni (Dougl.) Montana.
Tympanuchus cupido (L.), Nord-Amerika.
„ americanus (Reichenb.), Nord-Amerika.
Centrocercus urophasianus (Bp.), Westl. Nord-Amerika.
Pedioecetes phasianellus (L.) . . . Brit. Nord-Amerika.
„ columbianus (Ord) . Westl. Nord-Amerika.
Bonasa umbellus (L.), Östl. Nord-Amerika.
„ umbelloides Dougl., Felsengebirge.
„ sabinei Dougl. . . . . Kalifornien.
Tetrastes bonasia (L.) . . . . Nord-Europa.

Fam. Phasianidae.

Tetraogallus tibetanus Gould . . Thibet.
„ altaicus (Gebler) . . . Altai.
„ himalayensis Gray, Kuldscha.
„ caspius (Gm.) . . Kleinasien.
„ caucasicus (Pall.), Kaukasus.
Caccabis saxatilis (Wolf & M.), Schweiz.
„ chukar Gray . Griechenland, Kaukasus.
„ rufa (L.) . . . . . Frankreich.
„ hispanica Seoane . . . Spanien.
„ petrosa (Gm.), Italien, Marokko.
„ spatzi Reichn. . . . . Tunis.
Ammoperdix bonhami (Fraser), Ostindien.
„ heyi (Temm) . . . Palästina.
„ cholmleyi Og. Grant . . . . . Nubien.
Francolinus francolinus (L.) . . . . . Südost-Europa.
„ chinensis (Osbeck), Mauritius.
„ pictus (Jard. & Selby) . . . . . Ostindien.
„ lathami Hartl., West-Afrika.
„ pondicerianus (Gm.), Ostindien.
„ coqui (Smith) . . Süd-Afrika.
„ sephaena (Smith), Transvaal.
„ granti Hartl. . . Ost-Afrika.
„ kirki Hartl. . . . Somaliland.
„ africanus (Steph.), Süd-Afrika
„ castaneicollis Salvad. . . . . Abessinien.
Francolinus gofanus Neum. . Abessinien.
„ levaillanti (Temm.) . . . . . Süd-Afrika.
„ gariepensis Smith . . . . Südost-Afrika.
„ gularis Temm. . . . . Nepal.
„ bicalcaratus (L.), West-Afrika.
„ clappertoni Childr., Kordofan
„ sharpii Og. Grant. . . . . Abessinien.
„ capensis (Gm.) . . Kapkolonie.
„ hildebrandti Cab. . . Nyassa.
„ johnstoni Shelley, Mikindani.
„ natalensis Smith, Transvaal.
„ squamatus Cass. . . . Kongo.
„ schuetti Cab. . . . . Uganda.
„ erckeli Rüpp. . . Erythraea.
Pternistes nudicollis (Bodd.) . Süd-Afrika.
„ humboldti (Peters), Mikindani.
„ cranchi (Leach) . . . . Angola.
„ boehmi Reichn. . . . . Nyassa.
„ leucoscepus (Gray), Abessinien.
„ infuscatus Cab. . . Massailand.
Perdix perdix (L.) . . . . . Deutschland.
„ canescens Buturlin . . Kleinasien.
„ robusta Hom. & Tancré, Sibirien.
„ daurica (Pall.) . . . . . Daurien.
„ hodgsoniae (Hodgs.) . . . Thibet.
„ sifanica Prjev. . . . . Thibet.
Margaroperdix madagascariensis (Scop.), Madagascar.
Perdicula asiatica (Lath.) . . . Ostindien.
„ argoondah (Sykes) . Ostindien.
Microperdix erythrorhyncha (Sykes) . . . . . Südindien.
Arboricola torqueola (Valenc.) . . Assam.
„ batemani Oates . . . . Birma.
„ atrigularis Blyth . . . Assam.
„ intermedia Blyth, Nord-Cachar.
„ rufigularis Blyth . . . Sikkim.
„ javanica (Gm.) . . . . . Java.
Tropicoperdix charltoni (Eyton), Malakka.
Rollulus roulroul (Scop.) . . . . Malakka.
Coturnix coturnix (L.) . . . . Deutschland.
„ africana (T. & Schl.), Kapland.
„ japonica (T. & Schl.), Daurien.
„ coromandelica (Gm.), Ostindien.
„ delegorguei Deleg. . . . . Südost-Afrika.

Coturnix pectoralis Gould . . Australien.
Synoecus australis (Temm.) . . Australien.
„ diemensis Gould . . Tasmanien.
„ plumbeus Salvad. . Deutsch-Neu-Guinea.
Excalfactoria chinensis (L.), Ceylon, Pegu.
„ lineata (Scop.) . . Mindanao.
„ lepida Hartl., Neu-Pommern.
„ adansoni (Verr.), W.-Afrika.
Bambusicola fytchei Anders . . . Assam.
„ thoracica (Temm.) . . China.
„ sonorivox Gould . . Formosa.
Galliperdix spadicea (Gm.) . . . Ostindien.
„ lunulata (Valenc.) . Ostindien.
„ bicalcarata (Penn.) . . Ceylon.
Tragopan satyra (L.) . . . . . Himalaya.
„ melanocephalus (Gray) . . . . . Himalaya.
„ temmincki (Gray) . . . . China.
„ blythi (Jerd.) . . . . . Assam.
„ caboti (Gould) . . . . . China.
Lophophorus impeyanus Lath., Himalaya.
Lophura rufa (Raffl.) . . . . Hinterindien.
„ ignita (Shaw & N.) . . . . . A. d. Zool. Gart.
„ nobilis Scl. . . . . Borneo.
Diardigallus diardi Bp. . . . . Siam.
Crossoptilum tibetanum (Hodgs.), Thibet.
„ manchuricum Swinh. . . . . Mandschurei.
„ auritum (Pall.) . . Mongolei.
Gennaeus albicristatus (Vig.) . . Himalaya.
„ leucomelanus (Lath.) . . Nepal.
„ melanonotus (Blyth) . . Sikkim.
„ horsfieldi (Gray) . . . . Assam.
„ cuvieri (Temm.) . . . . Aracan.
„ lineatus (Vig.) . . . Tenasserim.
„ nycthemerus (L.) . . . . China.
„ swinhoei (Gould) . . . Formosa.
Pucrasia macrolopha (Less.) . . Himalaya.
Catreus wallichi (Hardw.) . . . Himalaya.
Phasianus colchicus (L.) . . Deutschland.
„ talischensis Lorenz . . . . . Transkaspien.
„ persicus Severtz., Nord-Persien.
„ principalis Scl., N.-Afghanistan.
„ shawi Elliot . . Ost-Turkestan.
„ chrysomelas Severtz. . . . . Afghanistan.
Phasianus mongolicus Brandt . . . Altai.
„ semitorquatus Severtz . . . . . Mongolei.
„ torquatus (Gm.) . . . . . China.
„ versicolor V. . . . . Japan.
„ soemmeringii Temm. . . Japan.
„ scintillans Gould . . . . Japan.
Syrmaticus reevesi Gray . . . . . China.
Calophasis ellioti (Swinh.) . . . . . China.
Chrysolophus pictus (L.) . . . . . China.
„ obscurus (Schl.) . . . China.
„ amherstiae (Leadb.), Thibet.
Gallus gallus (L.) = *ferrugineus (Lath.)* . . . . . Pegu.
„ domesticus, giganteus, lanatus, morio, A. d. Gefangenschaft.
„ lafayettei Less. . . . . Ceylon.
„ sonnerati Temm. . . . . Ostindien.
„ varius (Shaw & Nodd.) . . . Java.
Polyplectrum chinquis (Müll.), Himalaya.
„ germaini Elliot, Cochinchina.
Argusianus argus (L.) . . . . . Malakka.
Pavo cristatus L. . . . . Ostindien.
„ nigripennis Scl., Malayischer Archipel.
„ muticus L. . . . . Java.

Fam. Numididae.

Phasidus niger (Cass.) . . . . West-Afrika.
Numida meleagris L. . . . . West-Afrika.
„ coronata Gray . . . . Transvaal.
„ papillosa Reichn. . . Damaraland.
„ reichenowi O. Grant, Massailand.
„ mitrata Pall. . . . . Madagascar.
„ ptilorhyncha Licht. . Erythraea.
Guttera cristata Wagl. . . . West-Afrika.
„ granti Elliot, Deutsch-Ost-Afrika.
„ makondorum Grote . Mikindani.
„ pucherani (Hartl.) . . Ost-Afrika
Acryllium vulturinum (Hartl.) . Sansibar.

Fam. Meleagridae.

Meleagris gallopavo L., A. d. Gefangensch.
„ fera Vieill. . . . Nord-Amerika
„ osceola Scott. . . . . Florida.
Agriocharis ocellata (Cuv.) . . . Yucatan.

Fam. Odontophoridae.

Callipepla squamata (Vig.) . . . . . Texas.
„ castanogaster Brewst., Mexiko.

Oreortyx pictus (Dougl.) . . Kalifornien.
„ confinis Anthony . Kalifornien.
Lophortyx californicus (Shaw & N.) . . Kalifornien.
„ vallicola Ridgw. . Kalifornien.
„ gambeli Nutt. . . Kalifornien.
„ douglasi (Vig.) . . . . Mexiko.
Eupsychortyx cristatus (L.) . . . Mexiko.
„ leucopogon (Less.) . . . . . Columbien.
„ sonnini (Temm.), Venezuela.
„ nigrigularis (Gould) . . . . Guatemala.
Colinus virginianus (L), . . Nord-Amerika.
„ floridanus Coues . . . . . Florida.
„ texanus Lawr. . . . . Texas.
„ cubanensis Gould. . . . . Cuba.
„ coyolcos (Müll.) . . . . Yucatan.
Cyrtonyx ocellatus (Gould) . . Guatemala.
Odontophorus guianensis (Gm.), Guayana.
„ marmoratus (Gould) . . . . Columbien.
„ capueira (Spix), Rio Grande.
„ erythrops Gould . Ecuador.
„ stellatus (Gould) . . Peru.
„ guttatus (Gould) Honduras.

Fam. Turnicidae.

Turnix pugnax (Temm), China, Sumatra, Ostindien.
„ sylvatica (Desf.) . . . . Spanien.
„ lepurana (Smith) . Südost-Afrika.
„ dussumieri (Temm.) . . Formosa.
„ hottentotta (Temm.) . Süd-Afrika.
„ blanfordi (Blyth) . . . . . Amoy.
„ tanki Blyth . . . . . Bengalen.
„ maculosa (Temm.) . . . Insel Duke of York.
„ saturata Forbes . . Neu-Pommern.
„ nigricollis (Gm.) . . Madagascar.
„ varia (Lath.) . . . . . Australien.
„ castanonota (Gould), N.-Australien.
„ pyrrhothorax (Gould), Australien.
„ leucogaster North, C.-Australien.
„ velox (Gould) . . . . . Australien.
Pedionomus torquatus Gould, Australien.

Fam. Pteroclididae.

Syrrhaptes paradoxus (Pall.) . . . . Asien.
Pteroclidurus alchatus (L.) . . Kleinasien.
„ pyrenaicus (Seebohm) . . Süd-Europa.
„ namaquus (Gm.), Süd-Afrika.
„ exustus (Temm), Ostindien.
„ senegallus (L.) . . . Nubien.
Pteroclis arenarius (Pall.). . . . Spanien.
„ decoratus Cab. . . . Ost-Afrika.
Pteroclis gutturalis Smith . . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ bicinctus Temm. . . Süd-Afrika.
„ fasciatus (Scop.). . . . Ostindien.

Fam. Treronidae.

Sphenocercus apicauda Blyth . . Sikkim.
„ oxyurus (Temm.) . . Java.
„ sphenurus (Vig.), Himalaya.
„ formosae (Swinh.), Formosa.
„ permagnus (Stejn.) . . Liu-Kiu-Inseln.
„ medioximus Bangs. . . Liu-Kiu-Inseln.
Vinago waalia (Gm.) . . . . . Erythraea.
„ australis (L.) . . . . Madagascar.
„ nudirostris Sws. . D.-Ost-Afrika.
„ calva (Temm. & Knip), Goldküste.
„ delalandei (Bp.). . Sansibarküste.
Crocopus phoenicopterus (Lath.), Bengalen.
„ viridifrons (Blyth) . . . . Pegu.
„ chlorogaster (Strickl.), Ostindien.
Butreron capelli (Temm.). . . . Sumatra.
Treron nipalensis (Hodgs.) . . . . Assam.
Osmotreron griseicauda (Gray) . . . Java.
„ wallacei Salvad. . . . Celebes.
„ phayrei Blyth . . . . Assam.
„ malabarica (Jerd.), Ostindien.
„ pompadora (Gm.) . . Ceylon.
„ fulvicollis (Wagl.) . . Borneo.
„ bicincta (Blyth) . . . Assam.
„ vernans (L.) . Insel Salanga.
„ olax (Temm.). . . . . Borneo.
Phabotreron brevirostris Tweedd. . . . . Mindanao.
Ptilopus pelewensis Hartl. & Finsch. . . . . Palau-Inseln.
„ perousei Peale . . . . Viti-Inseln.
„ ponapensis Finsch . . Insel Ruk.
„ ewingi Gould . . . . Kap York.
„ fasciatus Peale . Samoa-Inseln.

Lampotreron superba (Temm. & Knip) . . . Neu-Pommern.
Eutreron pulchella (Temm.), Neu-Guinea.
Ptilopodiscus huonensis . . . Neu-Guinea.
„ trigeminus (Salvad.) . . . Neu-Guinea.
Cyanotreron monacha (T. & Reinw.) . . . . . Ternate.
Chlorotreron iozona (Gray) . Neu-Guinea.
Oedirhinus insolitus (Schl.), Neu-Pommern.
Sylphitreron wallacei (Gray), Aru-Inseln.
„ zonura (Salvad.), Aru-Inseln.
Thoracotreron rivolii (Prév. & K.) . . . Neu-Pommern.
„ bella (Scl.) . Neu-Guinea.
„ johannis Scl., Neu-Pommern.
Spilotreron melanocephala (Forst.) . . . . . Java.
„ melanospila (Salvad.) . . . . . Minahassa.
Chrysoenas luteovirens (H. & J.) . . . . . Viti-Inseln.
„ victor Gould . . . Viti-Inseln.
„ viridis Layard . . Viti-Inseln.
Drepanoptila holosericea (T. & K.) . . . Neu-Caledonien.
Alectroenas madagascariensis (L.) . . . . . Madagascar.
Megaloprepia magnifica (T.) . Australien.
„ assimilis (Gould), Kap York.
„ poliura Salvad., Neu-Guinea.
„ puella (Less.) . . . Waigiu.
Globicera myristicivora (Scop.) . . Waigiu.
„ rubricera (Gray) . . . Insel Duke of York.
Carpophaga paulina (Temm.), Minahassa.
„ aenea (L.) . . . . . Assam.
„ van-wycki Cass. . . . . Neu-Pommern.
„ pistrinaria Bp., Salomon-Inseln.
„ latrans Peale . . . Viti-Inseln.
„ zoae (Less.) . . . Insel Jobi.
Zonophaps rufiventris Salvad., Neu-Guinea.
Ducula insignis Hodgs. . . . . Assam.
„ griseicapilla Wald. . . . . Assam.
Zonoenas pinon (Q. & G.) . . . Aru-Inseln.
Myristicivora bicolor (Scop.) . . Andaman-Inseln.
„ spilorrhoa (Gray), Kap York.
„ melanura (Gray) . . Batjan.

Fam. Columbidae.

Columba leuconota Vig. . . . . Kaschmir.
„ rupestris Bp. . . . . Altai.
„ pallida Rothsch. & H. . . . . Ost-Sibirien.
„ livia Bonn. . . . . Deutschland.
„ gymnocyclus Bp. . . . . Senegal.
„ schimperi Bp. . . . . Palästina.
„ intermedia Strickl. . . Ostindien.
„ oenas L. . . . . Deutschland.
„ eversmanni Bp. . . Afghanistan.
„ guinea L. . . . . Nigeria.
„ phaeonota Bp. . . . . Süd-Afrika.
„ gymnophthalma T. & K., Curaçao.
„ picazuro Temm. . . . . Brasilien.
„ maculosa Temm. . . Argentina.
„ arquatrix T. & K. . . Kapkolonie.
„ leucocephala L. . . . . St. Croix.
„ squamosa Bonn. . . Puerto Rico.
„ speciosa Gm. . . . . Brasilien.
„ flavirostris Wagl. . . Guadelupe.
„ rufina T. & K., Rio Grande do Sul.
„ fasciata Say . . . . . Mexiko.
„ albilinea Bp. . . . . Columbien.
„ araucana Less. . . . . Chile.
„ bollei Godman . . . . . Teneriffa.
„ trocaz Heineken. . . . Madeira.
„ palumbus L. . . . . Deutschland.
„ casiotis (Bp.) . . . Transkaspien.
„ pulchricollis Blyth . . . Assam.
„ punicea (Blyth) . . . . . Pegu.
„ ianthina Temm. . . . . Japan.
„ vitiensis Q. & G. . . Viti-Inseln.
„ leucomela Temm. . . Australien.
„ plumbea V. . . . . Brasilien.
Macropygia tusalia (Blyth) . . . Ostindien.
„ leptogrammica (T.) . . Java.
„ tenuirostris Bp. . . . . Parang-Inseln.
„ emiliana Bp. . . . . Java.
„ albicapilla Bp. . . Minahassa.
„ doreya Bp. . . . . Waigiu.
„ carteretia Bp., Neu-Pommern.
„ ruficeps (Temm.). . . . Java.
Ectopistes migratorius (L.), Nord-Amerika.

Fam. Peristeridae.

Zenaidura carolinensis (L.), Nord-Amerika.
„ yucatanensis Lawr., Yucatan.

Zenaida aurita (T. & K.), Insel Grenada.
„ meridionalis (Lath.), Puerto Rico.
„ auriculata (Des Murs). . . Chile.
„ ruficauda Bp. . . . . Venezuela.
„ vinaceo-rufa Ridgw. . . . . Insel Grenada.
Melopelia leucoptera (L.). . . . . Mexiko.
„ meloda (Tsch.) . . . . . Peru.
Turtur turtur (L.). . . . . Deutschland.
„ isabellinus Bp. . . . . Aegypten.
„ ferrago (Eversm.) . . . . . Sibirien.
„ orientalis (Lath.) . . . . Ostindien.
Homopelia picturata (T.) . . Madagascar.
Streptopelia risoria (L.) . . . . . Ostindien.
„ semitorquata (Rüpp.). . . . . Süd-Afrika.
„ bitorquata (Temm.) . . Java.
„ capicola (Finsch & H.). . . . . Kapkolonie.
„ tropica (Reichn.) . Mikindani.
„ vinacea (Gm.) . . . . . Accra.
„ douraca (Hodgs.) . . Smyrna.
Onopopelia humilis (Temm.) . . Ostindien.
„ tranquebarica (Herm.), Sikkim.
Spilopelia chinensis (Scop.) . . . . . China.
„ tigrina (T. & K.). . . . . Pegu.
„ suratensis (Gm.) . . . Ostindien.
Stigmatopelia senegalensis (L.), Senegal.
„ cambayensis (Gm.) . . . . . Ostindien.
Geopelia humeralis (Temm.). . Australien.
„ tranquilla Gould . . Australien.
„ striata (L.) . . . . . Malakka.
„ cuneata (Lath) . . . Australien.
Scardafella squamosa (T. & K.), Venezuela.
„ inca (Less.) . . . . Kalifornien.
Gymnopelia erythrothorax (Meyen) . . . . . Bolivien.
Columbula picui (Temm.) . . . . . Chile.
Chamaepelia passerina (L.) . . . St. Croix.
„ terrestris Chapm., Yucatan.
„ pallescens Baird., Honduras.
„ minuta (L.) . . . . Surinam.
„ cruziana (Prév. & H.), Peru.
„ talpacoti (T. & K.), Paraguay.
„ rufipennis (Bp.) . Venezuela.
Uropelia campestris (Spix) . . . Bolivien.
Peristera cinerea (T. & K.). . Columbien.
„ mondetoura Bp. . . . Honduras.
Metriopelia melanoptera Mol. . . . Chile.
„ aymara K. & Prév., Bolivien.
Oena capensis (L.). . . . . Ost Afrika.
Chalcopelia afra (L.) . . . . . Ost-Afrika.
Chalcophaps chrysochlora Gould . . . Neu-Caledonien.
„ indica (L.) . . . . . Bengalen.
„ stephani Reichb. . . . Neu-Pommern.
Calopelia puella (Schl.) . . . . Goldküste.
Phaps chalcoptera (Lath.) . . . Australien.
„ elegans (Temm & Knip), Australien.
Geophaps scripta (Temm.) . . Queensland.
„ smithi (Jard. & Selby) . . . Nord-Australien.
Lophophaps plumifera (Gould), Nordwest-Australien.
„ ferruginea (Gould). . . West-Australien.
Ocyphaps lophotes (Temm) . Australien.
Haplopelia larvata (T. & K.), Transvaal.
Leptoptila fulviventris Lawr., Yucatan.
„ verreauxi Bp. . . . . Peru.
„ plumbeiceps S. & S., Guatemala.
„ rufaxilla (Rich. & Bern.). . . . . Amazonia.
„ reichenbachi Pelz., Rio Grande.
„ chlorauchenia Gigl. & Salvad. . . Argentina.
„ ochroptera Pelz. . . . Brasilien.
„ gaumeri (Lawr.) . . Yucatan.
„ wellsi (Lawr.) . Insel Grenada.
„ pallida (Berl. & Tacz.) . . . West-Columbien.
„ cerviniventris S. & J. . . . . Honduras.
Geotrygon violacea (T. & K.) . . Central-Amerika.
„ montana (L.) . . Süd-Amerika.
„ chrysia Bp. . . . . Cuba.
„ versicolor (Lafr.) . . Jamaika.
„ frenata (Tsch.) . . . . . Peru.
„ linearis (Prév. & K.), Venezuela.
„ venezuelensis Salvad. . . . . Venezuela.
„ albifacies (Scl.) . . Guatemala.
Phlogoenas luzonica (Scop.), Philippinen.
„ crinigera (Jacq. & Puch) . . . . . Mindanao.
„ stairi (Gray) . . . Viti-Inseln.

Phlogoenas samoënsis Finsch. . . . . Samoa-Inseln.
Leucosarcia picata (Lath.) . . Australien.
Otidiphaps cervicalis Ramsay . . . . . Neu-Guinea.
Caloenas nicobarica (L.). . . . . Batjan.

Fam. Gouridae.

Goura coronata (L.) . . . . . Waigiu.
„ albertisi Salvad. . . . . Südost-Neu-Guinea
„ victoria (Fraser) . . . Neu-Guinea.

Fam. Didunculidae.

Didunculus strigirostris (Jard.) . . . . Samoa-Inseln.

Fam. Opisthocomidae.

Opisthocomus hoazin Müll. . . Amazonia.

Fam. Rallidae.

Rallus elegans Aud.. . . . Nord-Amerika.
„ crepitans Gm., Östl. Nord-Amerika.
„ scotti Sennett . . . . . Florida.
„ caribaeus Ridgw. . . Puerto Rico.
„ saturatus Ridgw. . . . Mississippi.
„ obsoletus Ridgw. . . Kalifornien.
„ virginianus L. . . . Nord-Amerika.
„ antarcticus King . . . . . Chile.
„ aquaticus L. . . . . Deutschland.
„ indicus Blyth . . . . . Japan.
„ caerulescens Gm. . . . . Kapland.
„ madagascariensis Verr. . . . . Madagascar.
Limnopardalus maculatus (Bodd.), S. Paulo.
„ rytirhynchus V., Argentina.
„ sanguinolentus Sws., Chile.
„ nigricans Vieill., Brasilien.
Hypotaenidia striata L., Pegu, Formosa.
„ obscurior Hume. . . Andaman-Inseln.
„ philippinensis (L.) . . . . . Südsee-Inseln.
Eulabeornis castaneiventer Gould . . . . . Aru-Inseln.
„ poecilopterus (Hartl.). . . . . Viti-Inseln.
Tricholimnas lafresnayanus (V. & D.M.), Neu-Caledonien.
Gymnocrex plumbeiventris (Gr.) . . . . . Neu-Guinea.
Aramides mangle (Spix), Südost-Brasilien.
„ axillaris Lawr. . . . . Yucatan.
„ chiricote (V.) . . . . Argentina.
„ cayanea (Gm.) . . . . Guayana.
„ albiventris Lawr. . . . Chiriqui.
„ ypacaha (V.) . . . . . Brasilien.
„ saracura (Spix) . . . . Brasilien.
Ocydromus australis (Sparrm.) . . . . Neu-Seeland.
„ earli Gray . . . . Neu-Seeland.
„ brachypterus (Lafr.). . . . . Neu-Seeland.
Himantornis haematopus Hartl. . . . . Goldküste.
Dryolimnas cuvieri (Puch.) . Madagascar.
Rallina fasciata (Raffl.) . . . . . Malakka.
„ superciliaris (Eyton), Süd-Indien.
„ minahassa (Wall.) . . . Minahassa.
„ tricolor (Gray) . . Neu-Pommern.
Crex crex (L.) . . . . . Deutschland.
Oenolimnas isabellina (Bp.) . Minahassa.
Amaurolimnas concolor (Gosse), Guatemala.
Anurolimnas hauxwelli (S. & S.), Amazonia.
Zapornia parva (Scop.) . . . Deutschland.
Porzana porzana (L.) . . . . Deutschland.
„ carolina (L.) . . . Nord-Amerika.
„ fluminea (L.) . . . . . Australien.
„ albicollis (V.) . . . . . Surinam.
„ pusilla Pall. . . . . Spanien.
„ auricularis Reichn. . . . Daurien.
„ palustris Gould . . . Australien.
„ plumbea Gray . . . . Viti-Inseln.
„ bicolor Wald. . . . . Himalaya.
Sarothrura insularis Shp. . . Madagascar.
Ortygops exquisita (Swinh.). . . . . Oberer Amur.
„ notata (Gould) . . . Petagonien.
Poliolimnas cinereus (V.) . . . . . Celebes.
Crecisous jamaicensis (Gm.), Nord-Amerika.
„ coturniculus (Ridgw.). . . . . Kalifornien.
„ melanophaeus (Gray), Brasilien.
„ albigularis (Lawr.) . . Veragua.
„ leucopyrrhus (V.) . . Argentina.
„ cayennensis (Bodd.). . Guayana.
Limnobaenus fuscus (L.) . Java, Formosa.
„ phaeopygus (Stejn) . . Liu-Kiu-Inseln.
„ paykulli (Ljungh.), Borneo.

Limnobaenus marginalis (Hartl.) . . . . Damaraland.
Limnocorax niger (Gm.) . Südost-Afrika.
Amaurornis moluccana (Wall.) . . . . Neu-Pommern.
„ akool (Sykes) . . . Ostindien.
„ phoenicura (Forst.), Ostindien.
Rougetius rougeti (Guér) . . . Abessinien.
Neocrex erythrops (Scl.) . . . Venezuela.
Tribonyx mortieri Du Bus . . Australien.
Microtribonyx ventralis (Gould) . . . . Australien.
Gallinula tenebrosa Gould . . Australien.
„ frontata Wall. . . . . Borneo.
„ chloropus (L.). . . Deutschland.
„ galeata (Bp.) . . . . . Brasilien.
„ angulata Sundev. . Damaraland.
Porphyriops melanops (V.) . . . . . Chile.
Gallicrex cinerea (Lath.) . . . . . China.
Porphyriola martinica (L.) . Westindien.
Porphyrio caeruleus (Vandelli) . . Spanien.
„ porphyrio (L.) . . Madagascar.
„ poliocephalus (Lath.), Ostindien.
„ calvus V. . . . . Borneo.
„ bellus Gould . . . . Australien.
„ ellioti Salvad. . Neu-Pommern.
„ smaragdinus Temm. . . Celebes.
„ samoënsis Peale, Samoa-Inseln.
„ melanonotus Temm., Australien.
„ pelewensis Hartl. & F. . . . Palau-Inseln.
Fulica atra (L.) . . . . . Deutschland.
„ cristata Gm. . . . . Süd-Europa.
„ australis Gould . . . . Australien.
„ ardesiaca Tsch . . . . . Peru.
„ armillata V. . . . . Chile.
„ rufifrons Phil. & Landb. . . Chile.
„ americana Gm. . . . Nord-Amerika.
„ leucoptera V. . . . . Chile.
„ alai Peale . . . . Sandwich-Inseln.

Fam. Heliornithidae.

Fam. Podicipedidae.

Podicipes fluviatilis (Tunst.), Deutschland.
„ philippinensis (Bonn.), Ostindien.
„ capensis (Salvad.) . . . Ostindien.
„ tricolor Gray . . . . Halmahera.
„ pelzelni Hartl. . . . Madagascar.
Podicipes novae hollandiae Steph. . . . . Australien.
„ dominicus (L.), Peru, Kalifornien.
„ poliocephalus J. & S., Australien.
„ americanus Garnot., Argentina.
„ rollandi Gould, Falklands-Inseln.
„ calipareus (Less.) . . . . . Chile.
Dytes auritus (L.) . . . . . Island.
Proctopus nigricollis (Brehm) . . . . . Süd-Rußland.
Proctopus californicus (Heerm.) . . . . . Kalifornien.
Lophaethyia cristata (L.) . . Deutschland.
„ griseigena (Bodd.) . . . . Deutschland.
„ holboelli (Reinh.) Nördl. Nord-Amerika.
Aechmophorus major Bodd. . . . . Chile.
„ occidentalis (Lawr.) . . . Kalifornien.
Podilymbus podicipes (L.), Nord-Amerika.

Fam. Colymbidae.

Colymbus septentrionalis (L.) . . . . . Nord-Europa.
„ arcticus (L.) . . . Nord-Europa.
„ pacificus Lawr. . . Kalifornien.
„ adamsi Gray . . . . . Grönland.
„ glacialis L. . . . . Grönland.

Fam. Spheniscidae.

Aptenodytes forsteri Gray . . Australien.
„ patagonica (Forst.) . Macquarie-Inseln.
Pygoscelis papua (Forst.), Falklands-Inseln.
„ adeliae (H. & J.), Victorialand.
„ autarctica (Forst.) . . . . Süd-Georgien.
Catarrhactes chrysocome (Forst.) . . . Crozets-Inseln.
„ pachyrhynchus (Gr.) . . . . . Neu-Seeland.
„ sclateri (Buller), Bounti-Isl.
„ chrysolophus (Brandt) . . . Süd-Georgien.
„ schlegeli (Finsch) . Macquerie-Inseln.
Megadyptes antipodum (H. & J.) . . . . . Neu-Seeland.
Eudyptula minor (Forst.), Süd-Australien.
„ undina Gould . . . . Victoria.

Spheniscus demersus (L.) . . . Süd-Afrika.
„ humboldti Meyen . . . . Peru.
„ magellanicus (Forst.) . . Chile.

Fam. Procellariidae.

Procellaria pelagica L. . Nord-Atlantischer Ozean.
Halocyptena microsoma Coues, Kalifornien.
Oceanodroma leucorrhoa (V.), Nord-Atlantisch. Ozean.
„ castro Harc. . . Porto Santo-Insel.
„ macrodactyla Bryant . . . . Kalifornien.
„ socorrensis Towns. . . . . Colorado-Isl
Oceanodroma melania (Bp.). Kalifornien.
„ homochroa (Coues) . . . . Farallon-Isl.
„ furcata (Gm.) . . . . Alaska.
Oceanites oceanica (Kuhl), Süd-Amerika.
Garrodia nereis (Gould) . . . Neu-Seeland.
Pelagodroma marina (Lath.), Neu-Seeland.
Fregetta melanogaster (Gould) . . . . . Neu-Seeland.
„ grallaria (V.) . . Süd-Australien.
„ albigularis (Finsch), Viti-Inseln.

Fam. Puffinidae.

Puffinus leucomelas Temm., Bonin-Insln.
„ cuneatus Salv. . . . Bonin-Inseln.
„ chlororhynchus Less., Süd-Pacific.
„ gravis (O'Reilly) . . . . . Malta.
„ kuhli (Boie) . .) . . . Cycladen.
„ flavirostris (Gould) . . . Azoren.
„ puffinus (L.) . . . Nord-Atlantic.
„ yelcouan (Acerbi) . Griechenland.
„ opisthomelas Coues, Kalifornien.
„ gavia (Forst.) . . . Neu-Seeland.
„ obscurus (Gm.) . . Palau-Inseln.
„ auduboni Finsch, Bahama-Inseln.
„ subalaris Ridgw. . . . . Galapagos-Inseln.
„ assimilis Gould . . . Australien.
„ carneipes Gould . . . Australien.
„ griseus (Gm.) . . . Neu-Seeland.
„ tenuirostris (Temm.), Australien.
„ nativitalis Streets., Laysan-Insel.
Majaqueus aequinoctialis (L.) . . . . . Neu-Seeland.
Majaqueus parkinsoni (Gray), Neu-Seeland.
Oestrelata macroptera (Smith). . . . . Neu-Seeland.
„ aterrima (Bp.) . . . Maskarenen-Inseln.
„ lessoni (Garn.). . . Kerguelen-Inseln.
„ phaeopygia (Salv.) . . . . Sandwich-Inseln.
„ brevipes (Peale) . . Viti-Inseln.
„ hypoleuca Salv., Laysan-Insel.
„ nigripennis Rothsch. . . . Kermadec-Inseln.
„ cervicalis Salv. . . . . Kermadec-Inseln.
„ neglecta (Schl.) . . . Kermadec-Inseln.
„ gularis (Peale) . . Neu-Seeland.
„ cooki (Gray) . . . Neu-Seeland.
Pagodroma nivea (Gm.) . . Duke of York-Insel.
Bulweria bulweri (Jard. & Selby) . . . . . Kanaren.
Ossifraga gigantea (Gm.) . Süd-Georgien.
Fulmarus glacialis (L.) . . Nord-Atlantic.
„ glupischa Stejn. . Kamtschatka.
Halobaena caerula (Gm.) . . . Viti-Inseln.
Daption capensis (L.) . . . . . Feuerland.
Prion vittatus (Gm.) . Kerguelen-Inseln.
„ banksi Gould . . . . . Neu-Seeland.
„ desolatus (Gm.) . . . . Neu-Seeland.
„ ariel Gould . . . . . Neu-Seeland.

Fam. Pelecanoididae.

Pelecanoides urinatrix (Gm.) . Australien.
„ exsul Salv., Kerguelen-Inseln.
„ garnoti (Less.) . . . . Chile.

Fam. Diomedeidae.

Diomedea exulans L. . . Auklands-Inseln.
„ regia Buller, Auklands-Inseln.
„ chionoptera Salv. . . . . Kerguelen-Inseln.
„ albatrus Pall. . . . . Japan.
„ irrorata Salv., Galapagos-Inseln.
„ nigripes Aud. . . Laysan-Insel.
„ immutabilis Rothsch. . . . . Laysan-Insel.
„ melanophrys Temm. . . . . Falklands-Inseln.
„ bulleri Rothsch., Snares-Inseln.

Thalassogeron cautus (Gould), Tasmanien.
„ salvini Rothsch. . . Bounty-Inseln.
„ culminatus (Gould), Central-Amerika.
„ chlororhynchus (Gm.) . . Falklands-Inseln.
Phoebetria fuliginosa (Gm.) . . . . Falklands-Inseln.

Fam. Alcidae.

Plautus impennis (L.) . . . . . Artefakt.
Alca torda L. . . . . Nord-Europa.
Alle alle L. . . . . Nord-Europa.
Uria troile (L.) . . . . . Nord-Europa.
„ californica Bryant . . . Kalifornien.
„ lacrymans Valenc. . . . Nord-Europa.
„ lomvia (Pall.) . . . . . Nord-Europa.
„ arra (Pall.) . . . . . Grönland.
Cepphus grylle (L.) . . . . . Nord-Europa.
„ mandti Licht. . . . Spitzbergen.
Pseuduria columba (Pall.) . . . . Vancouver-Insel.
„ carbo (Pall.) . . . . . Japan.
Brachyrhamphus marmoratus (Gm.) . . . . . Alaska.
Micruria hypoleuca (Xantus) . . . Mexiko.
Synthliborhamphus antiquus (Gm.), Alaska.
„ wumizusume (Temm.) . . . . Japan.
Ptychorhamphus aleuticus (Pall.), Alaska.
Simorhynchus cristatellus (Pall.), Alaska.
„ pusillus (Pall) . . . Alaska.
Phaleris psittaculus (Pall.) . . . . Alaska.
Ceratorhyncha monocerata (Pall.) . . . Nord-Amerika.
Lunda cirrhata (Pall.) . . Vancouver-Insel.
Fratercula arctica (L.) . . Faröer-Inseln.
„ glacialis Leach . . . Grönland.
„ corniculata (Naum.) . . . . Kamtschatka.

Fam. Laridae.

Hydrochelidon leucoptera (M. & Sch.), Süd-Europa.
„ hybrida (Pall.), Central-u.S.-Europa.
„ nigra (L.) . . Deutschland.
„ surinamensis (Gm.) . . . Nord-Amerika.
Phaëthusa magnirostris (Licht.), Amazonia.
Gelochelidon anglica (Mont.) . . . Europa.
Hydroprogne caspia (Pall.) . . . . Europa.
Seena seena (Sykes) . . . . . Ostindien.
Sterna melanogaster Temm., . . Ostindien.
„ forsteri Nutt. . . . Nord-Amerika.
„ albistriata (Gray) . . Neu-Seeland.
„ virgata Cab. . . Kerguelen-Inseln.
„ hirundinacea Less. . . . . Falklands-Inseln.
„ fluviatilis Naum. . . . Deutschland.
„ macrura Naum. . . . Nord-Europa.
„ longipennis Nordm. . . . . Amur.
„ albigena Licht. . . . Rotes Meer.
„ dougalli Mont. . . . . Kosmopol.
„ gracilis Gould . . Neu-Caledonien.
„ cantiaca Gm. . . . . Nordsee.
„ maxima Bodd. . . . Nord-Amerika.
„ media Horsf. . . Golf von Persien.
„ bergii Licht., Ostindien, Australien.
„ frontalis Gray . . . . Neu-Seeland.
„ aleutica Baird . . . . . Alaska.
„ lunata Peale . . . . Savage-Inseln.
„ anaestheta Scop. . . . . Australische Inseln.
„ fuliginosa Gm. . . . . Mauritius, West-Indien.
„ crissalis Baird . . Liu-Kiu-Inseln.
„ nereis (Gould) . . . . . Australien.
„ sinensis Gm. . . . . Japan.
„ minuta L. . . . . Europa.
„ saundersi Hume . . . . . Ostindien.
„ antillarum (Less.), Nord-Amerika.
„ superciliaris V. . . . . Amazonia.
„ lorata Phil. & Landb. . . . . Peru.
Sterna melanauchen Temm., Palau-Inseln.
„ trudeaui Aud. . . . . Argentina
Naenia inca (Less.) . . . . . Chile.
Procelsterna caerulea (Bennett), Mac Kean-Inseln.
„ cinerea (Gould) . . . Norfolk-Inseln.
Anous stolidus (L.), Australische Inseln.
„ ridgwayi Anthony . . . . Clipperton-Inseln.
„ galapagoënsis Shp. . . . . Galapagos-Inseln.
Micranous tenuirostris (T.) . . Mauritius.
„ leucocapillus (Gould) . . . . . Insel Kusai.

Gygis alba Sparrm. . . . . Polynesien.
Rhynchops nigra L. . . . . Nord-Amerika.
„ melanura Sws. . . Amazonia.
„ flavirostris V., Nordost-Afrika.
„ albicollis Sws. . . . . Ostindien.
Xema sabinii (Sabine) . . . Nord-Amerika.
Creagrus furcatus (Néboux) . . Galapagos-Inseln.
Larus minutus Pall. . . . . Europa.
„ ichthyaëtus Pall. . . Untere Wolga.
„ melanocephalus Natt. . . . Smyrna.
„ philadelphia (Ord) . . . . Arct. Nord-Amerika.
„ franklini Sws. & Rich. . . . . Nord-Amerika.
„ atricilla L. . . . . Nord-Amerika.
„ cirrhocephalus (V.), Angra Pequena.
„ maculipennis Licht. . . Argentina.
„ glaucodes Meyen. . . . . Chile.
„ ridibundus L. . . . . Deutschland.
„ brunneicephalus Jerd. . Himalaya.
„ hemprichi (Bruch) . . Rotes Meer.
„ heermanni Cass. . . . Kalifornien.
„ crassirostris V. . . . . Amur.
„ gelastes Thienem. . . Süd-Europa.
„ bulleri Hutton . . . . Neu-Seeland.
„ novae hollandiae Steph., Australien.
„ cospulinus Gray . . . Neu-Seeland.
„ marinus L. . . . . Nord-Europa.
„ dominicanus Licht. . . Neu-Seeland, Kerguelen.
„ fuscus L. . . . . Nord-Europa.
„ affinis Reinh. . . . . Jenisei.
„ occidentalis Aud. . . . . Kalifornien.
„ schistisagus Stejn. . . . . Japan.
„ argentatus Gm. . . . Deutschland.
„ smithsonianus Coues, Nord-Amerika.
„ cachinnans Pall. . . . Süd-Europa.
„ vegae Stejn. . . . . Kamtschatka.
„ audouini Payr. . . . . Sardinien.
„ delawarensis Ord . . Hudson-Bai.
„ californicus Lawr., Vancouver-Insel.
„ canus L. . . . . Nord-Europa.
„ brachyrhynchus Rich. . . . . Nord-Amerika.
„ glaucescens Naum. . . . . Alaska.
„ kumlieni Brewst., Cumberland-Insel.
„ glaucus Faber . . . . Nord-Europa.
„ leucopterus Faber . . Nord-Europa.
Gabianus pacificus (Lath.) . . Tasmanien.
Leucophaeus scoresbyi (Traill), Süd-Chile.
Pagophila eburnea (Phipps) . . . Grönland.
Rissa rissa (L.) . . . . . Nord-Europa.
„ brevirostris (Bruch) . . . . . Alaska.

Fam. Stercorariidae.

Megalestris catarrhactes (L.) . . . . . Faröer-Inseln.
„ antarctica (Less.) . . . . Süd-Georgien.
„ maccormicki Saund. . . . . Victorialand.
Stercorarius pomatorhinus (T.), Grönland.
„ crepidatus (Banks) . . Island.
„ parasiticus (L.) . . Lappland.

Fam. Chionididae.

Chionarchus minor (Hartl.) . Kerguelen-Inseln.

Fam. Thinocorythidae.

Attagis gayi Less. . . . . Chile.
Thinocorys orbignianus G. & Less. . . . . Chile.
„ rumicivorus Esch. . . . . Süd-Bolivien.

Fam. Charadriidae.

Arenaria interpres (L.) . . . Nord-Europa.
Haematopus ostralegus L. . . . . Nord-Deutschland.
„ osculans Swinh. . . . . Oberer Amur.
„ longirostris V. . . Australien.
„ leucopus Garn. . . . . Falklands-Inseln.
„ palliatus Temm. . . . . Nord-Amerika.
„ unicolor Wagl . . . Süd-Australien.
„ moquini Bp. . . . . Kapland.
„ niger Pall. . . . . Alaska.
„ ater (Less.), Falklands-Inseln.
Oreophilus ruficollis (Wagl.) . . Bolivien.
Defilippia leucoptera (Reichn.), Massailand.
Sarciophorus tectus (Bodd.) . . . Senegal.
Lobipluvia malabarica (Bodd.), Ostindien.
Ptiloscelis resplendens (Tsch.) . Bolivien.
Lobivanellus lobatus (V.) . . Australien.

Lobivanellus senegalus (L.), Oberer Niger.
„ lateralis (Smith), Ost-Afrika.
Xiphidiopterus albiceps (Gould) . . West-Afrika.
Sarcogrammus indicus (Bodd.), Ostindien.
„ atrinuchalis (Jerd.), Pegu.
Zonifer tricolor (V.) . . . . . Australien.
Hoplopterus spinosus (L.) . . Aegypten.
„ ventralis (Wagl.), Ostindien.
„ speciosus (Wagl.), Süd-Afrika.
Belonopterus cayennensis (Gm.), Brasilien.
„ chilensis (Mol.), Patagonien.
Vanellus vanellus (L.) . . . Deutschland.
Euhyas leucura (Licht.) . . . Aegypten.
Chaetusia gregaria (Pall.) . . . . Wolga.
Stephanibyx coronatus (Bodd.), Süd-Afrika.
„ melanopterus (Cretz.) . . . . . Ost-Afrika.
„ inornatus (Sws.), Ost-Asien.
Squatarola helvetica (L.) . . Nord-Europa.
Charadrius pluvialis (L.) . . Nord-Europa.
„ dominicus (Müll) . . . . . Nord-Amerika.
Ochthodromus obscurus (Gm.) . . . . Neu-Seeland.
„ bicinctus (J. & S.) . . Neu-Seeland.
„ wilsoni (Ord) . . . Nord-Amerika.
„ asiaticus (Pall.) . . Kirgisensteppe.
Eudromias morinellus (L.) . . . Lappland.
Zonibyx modesta (Licht.), Falklands-Inseln.
Podasocys montanus (Towns.) . . . . Nord-Amerika.
Oxyechus vociferus (L.) . Nord-Amerika.
„ tricollaris (V.) . . . Süd-Afrika.
„ forbesi (Shelley) . . . Senegal.
Aegialeus semipalmatus (Bp.) . . . . . Nord-Amerika.
Aegialitis hiaticola (L.) . . Nord-Europa.
„ placida (Gray) . . . . . Japan.
„ dubia (Scop.), Nord-Deutschland.
„ peroni (Bp.) . . . . . Java.
„ alexandrina (L.) . . . . . Nord-Deutschland.
„ marginata (V.) . Süd-Afrika.
„ pallida (Strickl.) . Madagascar.
„ ruficapilla (Temm.), Australien.
„ collaris (V.) . . . . . Brasilien.
Aegialitis nivosa, Cass. . . . Kalifornien.
„ meloda (Ord) . Nord-Amerika.
„ occidentalis, Cab. . . Bolivien.
„ falklandica (Lath.) . . . Falklands-Inseln.
„ pecuaria (Temm.), Süd-Afrika.
„ melanops (V.) . . . Australien.
„ cucullata (V.) . . . Australien.
Thinornis novae-zealandiae (Gm.) . . . . . Chatham-Inseln.
Himantopus himantopus (L.), Süd-Europa.
„ melanurus (V.) . Argentina.
„ leucocephalus Gould . . . . . Australien.
„ picatus Ellman. Neu-Seeland.
„ mexicanus (Müll.) . . . . Nord-Amerika.
„ melas H. & J., Neu-Seeland.
Recurvirostra avocetta L. . Deutschland.
„ americana Gm. . . . . Nord-Amerika.
Ibidorhynchus strutheri Sig. . . Himalaya.
Numenius arquata (L.) . . . Deutschland.
„ cyonopus V. . . . . Japan.
„ longirostris Wils. . . . . Nord-Amerika.
„ phaeopus (L.) . . . . Lappland.
„ variegatus (Scop.), Kamtschatka.
„ hudsonicus Lath. . . Labrador.
„ borealis Lath. . Nord-Amerika.
Limosa lapponica (L.) . . . . . Lappland.
„ novae zealandiae Gray . . . . . Nordost-Sibirien.
„ hudsonica (Lath.) . Hudson-Bai.
„ limosa (L.) . . . . . Deutschland.
„ fedoa (L.) . . . . Nord-Amerika.
Macrorhamphus griseus (Gm.) . . Nord-Amerika.
Symphemia semipalmata (Gm.) . . . . . Nord-Amerika.
Totanus fuscus (L.) . . . . . Lappland.
„ calidris (L.) . . . . Deutschland.
„ stagnatilis Bechst. . . . Ungarn.
„ melanoleucus (Gm.) . . . Arct., Nord-Amerika.
„ flavipes (Gm.) . . Nord-Amerika.
Helodromus ochropus (L.) . Deutschland.
„ solitarius (Wils.) . . . . Nord-Amerika.
Tringoides hypoleucus (L.) . Deutschland.

Tringoides macularius (L.), Nord-Amerika.
Terekia cinerea (Güldenst.), Nord-Rußland.
Glottis nebularius (Gunner) . . Lappland.
Rhyacophilus glareola (Gm.) . . Lappland.
Pavoncella pugnax (L.) . . . Deutschland.
Bartramia longicauda (Bechst.) . . . . Nord-Amerika.
Ereunetes pusillus (L.) . . . . . Alaska.
Tryngites subruficollis (V.), Nord-Amerika.
Calidris arenaria (L.) . . . . . Lappland.
Limonites minuta (Leisl.) Norwegen, Amur.
„ minutilla (V.) . Nord-Amerika.
„ temmincki (Leisl.) . . Lappland.
Heteropygia bairdi (Coues), Nord-Amerika.
„ fuscicollis (V.) . . . . Herschell-Insel.
Arquatella maritima (Gm.) . . . Lappland.
„ couesi Ridgw. . . Kamtschatka.
Ancylochilus subarquatus (Güld.), Sibirien.
Tringa canutus (L.) . . . . . Lappland.
Pelidna alpina (L.) . . . . . Deutschland.
„ pacifica Coues. . . . Kamtschatka.
Limicola platyrhyncha (T.) . . . Lappland.
Gallinago stenura (Kuhl) . . . . . Sibirien.
„ megala Swinh. . . . . Amur.
„ major (Gm.). . . . . Dänemark.
„ nigripennis Bp. . . . Süd-Afrika.
„ gallinago (L.) . . . Deutschland.
„ delicata (Ord) . . Nord-Amerika.
„ frenata (Ill.) . . . Süd-Brasilien.
„ macrodactyla Bp., Madagascar.
„ paraguayae (V.) . . . . . Falklands-Inseln.
„ australis (Lath.) . . . . . Japan.
„ solitaria Hodgs. . . . . Sibirien.
„ nemoricola Hodgs. . . Ostindien.
„ gigantea (Temm.), Süd-Brasilien.
„ undulata (Bodd.) . . Venezuela.
„ stricklandi (Gray), Patagonien.
„ pusilla Buller, Chatham-Inseln.
Limnocryptes gallinula (L.) . . Lappland.
Scolopax rusticola L. . . . . Deutschland.
Philohela minor (Gm.). . . Nord-Amerika.
Rostratula capensis (L.). . . Süd-Afrika, Ostindien.
„ australis (Gould). . Australien.
„ semicollaris (V.). . . . . Chile.
Crymophilus fulicarius (L.) . . . Grönland.
Phalaropus hyperboreus (L.) . . Lappland.
Steganopus tricolor (V.), Nord-Amerika.

Fam. Parridae.

Hydrophasianus chirurgus (Scop.) . . . . . Ostindien.
Metopidius indicus (Lath.) . . . Ostindien.
Phyllopezus africanus (Gm.). . Ost-Afrika.
Hydralector gallinaceus (T.), Australien.
Jacana jacana (L.) . . . . . Süd-Amerika.
„ nigra (Gm.) . . . . . Venezuela.
Asarcia variabilis (L.) . . . . . Mexiko.

Fam. Cursoriidae.

Pluvianus aegyptius (L.) . . . . Aegypten.
Cursorius gallicus (Gm.) . . . Nord-Afrika.
„ rufus Gould. . . . . Süd-Afrika.
„ coromandelicus (Gm.), Ostindien.
„ temmincki Sws. . . . . Senegal.
Rhinoptilus bicinctus (T.) . . . Süd-Afrika.

Fam. Glareolidae.

Stiltia isabellina (V.), Central-Australien.
Glareola pratincola (L.) . . . Süd-Europa.
„ melanoptera Nordm. . . . . Südost-Europa.
„ orientalis Leach . . . . Ostindien.
Galactochrysea ocularis (Verr.) . . . . Madagascar.
„ marchei (Oust.) . . Liberia.
„ cinerea (Fraser) . . . West-Afrika.
„ lactea (Temm.), Ostindien.

Fam. Dromadidae.

Dromas ardeola (Payk) . . . . Ost-Afrika.

Fam. Oedicnemidae.

Oedicnemus oedicnemus (L.), Deutschland.
„ saharae Reichn., . . Marokko.
„ senegalensis Sws. . . . . West-Afrika.
„ vermiculatus Cab., Massailand.
„ bistriatus (Wagl.) . . . Central-Amerika.
„ capensis Licht. . . Süd-Afrika.
Burhinus grallarius (Lath.) . . Australien.
Esacus recurvirostris (Cuo.) . . . Ostindien.

Fam. Otididae.

Otis tarda L. . . . . Deutschland.
„ dybowskii Tacz. . . . . Altai.
Tetrax tetrax (L.) . . . . . Wolga.
Lophotis ruficrista (Smith) . . Süd-Afrika.
„ gindiana (Oust.) . . . Somaliland.
Compsotis afra (Forst.) . . . . Süd-Afrika.
„ leucoptera (Reichenb.) . . . . Süd-Afrika.
Heterotetrax vigorsi (Smith), Süd-Afrika.
Neotis caffra (Licht.) . . . . . Süd-Afrika.
Lissotis melanogaster (Rüpp.) . . , . . . Central-Afrika.
„ hartlaubi (Heugl.) . . Massailand.
Trachelotis caerulescens (V.), Süd-Afrika.
„ canicollis (Reichn.), Somaliland.
„ senegalensis (V.), Senegambien.
Sypheotis indica (Gm.) . . . . . Ostindien.
Houbaropsis bengalensis (Gm.), Ostindien.
Houbara macqueeni (Gr. & Hardw.) . . . . . Ostindien.
„ undulata (Jacq.) . . Nord-Afrika.
„ fuerteventurae R. & H., Canaren.
Eupodotis arabs (L.) . . . Nordost-Afrika.
„ kori (Burch.) . . . . Ost-Afrika.
„ edwardsi (Gr. & H.), Ostindien.
„ australis (Gray) . . Australien.

Fam. Gruidae.

Grus grus (L.) . . . . . Deutschland.
„ lilfordi Shp . . . . . Ost-Sibirien.
„ mexicana (Müll) . . Nord-Amerika,
„ canadensis (L.) . . . Nord-Amerika.
„ nigricollis Przew. . . . . Tibet.
„ japonensis (Müll.) . . . . . China.
Limnogeranus americanus (L.) . . . . Nord-Amerika.
Antigone antigone (L.) . . . . . Ostindien.
„ sharpei Blanf. . . . . Pegu.
„ australasiana (Gould), Australien.
Pseudogeranus leucauchen (T.) . . . Amur.
Bugeranus carunculatus (Gm.), Süd-Afrika.
Tetrapteryx paradisea (Licht.), Süd-Afrika.
Anthropoides virgo L.) . . . . . Wolga.
Balearica pavonina (L.) . . . West-Afrika.
„ regulorum (Benn.), Süd-Afrika.
„ gibbericeps Reichn. . . Deutsch-Ost-Afrika.

Fam. Aramidae.

Aramus scolopaceus (Gm.) . . . Brasilien.
„ giganteus (Bp.) . . . . . Florida.

Fam. Rhinochetidae.

Rhinochetus jubatus Verr. & Des M. . . Neu-Caledonien.

Fam. Mesoenatidae.

Fam. Eurypygidae.

Eurypyga helias (Pall.) . . . . . Guayana.

Fam. Psophiidae.

Psophia crepitans L. . . . . Amazonia.

Fam. Cariamidae.

Cariama cristata L. . . . . Brasilien.
Chunga burmeisteri (Hartl.) . Argentina.

Fam. Ibididae.

Ibis aethiopica (Lath.) . . . . . Aegypten.
„ melanocephala (Lath.) . . . Ostindien.
„ molucca Cuv. . . . . Australien.
Carphibis spinicollis (Jam.) . . Australien.
Inocotis papillosa (Temm.) . . . . Assam.
Graptocephalus davisoni (Hume) . . Pegu.
Nipponia nippon (Temm.) . . . . . China.
Comatibis comata Ehrenb. . Nord-Afrika.
Hagedashia hagedash (Lath.), Ost-Afrika.
Theristicus melanopus (Gm.), Patagonien.
Harpiprion cayennensis (Gm.) . . . Peru.
Cercibis oxycerca (Spix) . . . . Amazonia.
Plegadis falcinellus (L.), Kaukasus, Wolga.
„ guarauna (L.) . . . . . Chile.
„ ridgwayi (Allen) . . . . . Peru.
Eudocimus albus (L.) . . . Nord-Amerika.
„ ruber (L.) . . . . . Venezuela.

Fam. Plataleidae.

Platalea leucerodia L. . . . . Wolga.
„ regia Gould . . . . . Queensland.
„ alba Scop. . . . . Ost-Afrika.
„ minor T. & Schl. . . . . Japan.
Platibis flavipes (Gould) . . . Australien.
Ajaja ajaja (L.) . . . . . Florida.

Fam. Ciconiidae.

Tantalus loculator L. . . . Nord-Amerika.
Pseudotantalus leucocephalus (Gm.) . . . . . Ostindien

Pseudotantalus ibis (L.) . . . . . Afrika.
Abdimia abdimi (Licht.) . . . Abessinien.
Dissöura episcopus (Bodd.) . . Ostindien.
Euxenura maguari (Gm.) . . . Argentina.
Ciconia ciconia (L.) . . . . . Deutschland.
„ boyciana Swinh. . . . . Amur.
„ nigra (L.) . . . . . Deutschland.
Anastomus oscitans (Bodd.) . . . Ostindien.
„ lamelligerus (Temm.), Uganda.
Xenorhynchus asiaticus (Lath.), Ostindien.
Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw) . . . Ost-Afrika.
Leptotilus dubius (Gm.) . . . . Ostindien.
„ javanicus (Horsf.) . . . . Java.
„ crumeniferus (Less.) . Afrika.

Fam. Scopidae.

Scopus umbretta Gm. . . Madagascar, Süd-Afrika.

Fam. Balaenicipitidae.

Fam. Ardeidae.

Pyrrherodias purpurea (L.), Süd-Rußland.
„ manillensis (Meyen), Siam.
Ardea goliath Cretzschm. . . . Süd-Afrika.
„ sumatrana Raffl. . . . . Australien.
„ melanocephala Vig. & Ch. . . . . Süd-Afrika.
„ cocoi L. . . . . Rio Grande.
„ cinerea L. . . . . Deutschland.
„ herodias L. . . . . Nord-Amerika.
„ wardi Ridgw. . . . . Florida.
„ occidentalis Aud. . . . . Florida.
Mesophoyx intermedia Wagl., Ostindien.
Herodias alba (L.), Süd-Rußland, Ostindien.
„ egretta (Wils.), Nord- und Süd-Amerika.
„ timoriensis Less. . . . . Japan.
Florida caerulea (L.), Brasilien, Puerto Rico.
Dichromanassa rufa (Bodd.), Nord-Amerika.
Notophoyx novae hollandiae (Lath.) . . . . . Australien.
„ pacifica (Lath.) . . Australien.
Lepterodius gularis (Bosc) . Madagascar.
„ asha (Sykes) . . . Süd-Indien.
Garzetta garzetta (L.) . . . . . Ungarn.
„ nigripes (Temm.) . . . . Celebes.
Leucophoyx candidissima (Gm.) . . . . . Nord-Amerika.
Hydranassa tricolor (Müll.) . . . Surinam.
„ ruficollis (Gosse) . . . . Nord-Amerika.
Nyctanassa violacea (L.) . Nord-Amerika.
Agamia agami (Gm.) . Britisch Guayana.
Demiegretta sacra (Gm.) . . . Viti-Inseln.
Nycticorax nycticorax (L.) . . . . Ungarn, Surinam.
„ tayazu guira (V.) . . Brasilien.
„ cyanocephalus (Mol.) . . Chile.
„ caledonicus (Gm.), Australien.
Canchroma cochlearia L. . . . . Surinam.
„ zeledoni Ridgw. . . Honduras.
Gorsachius melanolophus (Raffl.) . . . . . Süd-Indien.
Syrigma cyanocephalum (V.) . . Uruguay.
Butorides atricapilla (Afz.), West-Afrika.
„ striata L. . . . . Süd-Amerika.
„ javanica (Horsf.) . . . Ostindien.
„ amurensis (Schrenck) . . Amur.
„ stagnatilis (Gould), Halmahera.
„ virescens (L.) . Nord-Amerika.
„ frazeri Brewst., Süd-Kalifornien.
Tigrisoma lineatum (Bodd.), Nord-Brasilien.
„ marmoratum (V.) . . Argentina.
Ardeola ralloides (Scop.) . . . . . Ungarn.
„ grayi (Sykes) . . . Pegu, Ceylon.
„ bacchus (Bp.) . . . . . Ostindien.
„ speciosa (horsf.) . . . . . Borneo.
Bubulcus lucidus (Rafin.) . . . Aegypten.
„ coromandus (Bodd.) . Ostindien.
Ardetta minuta (L.) . . . . Deutschland.
„ sinensis (Gm.) . . . . . China.
„ exilis (Gm.) . . . Nord-Amerika.
„ erythromelas (V.) . . . Brasilien.
„ involucris (V.) . . . . . Süd-Chile.
„ cinnamomea (Gm.), Pegu, Ceylon.
Nannocnus eurythmus (Swinh.) . . Amur.
Ardeirallus sturmi (Wagl.), West-Afrika.
Dupetor flavicollis (Lath.) . . . . . China.
„ gouldi (Bp.) . . . . . Australien.
„ nesophilus (Shp.), Neu-Pommern.
Botaurus stellaris (L.) . . . . . Wolga.
„ poeciloptilus (Wagl.), Victoria.
„ lentiginosus (Mont.) . . . . . Nord-Amerika
„ pinnatus (Wagl.) . . Amazonia.

Fam. Palamedeidae.

Chauna cristata (Sws.), Rio Grande do Sul.

Fam. Phoenicopteridae.

Phoenicopterus ruber Bonn, Nord-Amerika.
„ roseus Pall., Süd-Rußland.
„ chilensis, Mol. . . . Chile.
„ audinus Philippi . . Chile.

Fam. Anatidae.

Cygnus cygnus (L.) . . . Island, Sibirien.
„ bewicki Yarr. . . . . Sibirien.
„ columbianus (Ord), Nord-Amerika.
„ buccinator Richards. . . . . Nord-Amerika.
„ olor Gm. . . . . Wolga.
„ olor var. domesticus . . A. d. Gef.
„ melanocoryphus (Mol.) . . . Chile.
Chenopsis atrata (Lath.) . . . Australien.
Anseranas semipalmata (Lath.), Australien
Plectropterus gambensis (L.), West-Afrika.
Cairina moschata (L.) . . . . Süd-Amerika.
Sarcidiornis melanonota (L.) . . . Afrika.
Asarcornis leucoptera (Blyth). . . Assam.
Nettopus auritus (Bodd.) . . Madagaskar.
„ pulchellus Gould . . . . . Nord-Australien.
„ coromandelianus (Gm.), Ostindien.
Lampronessa sponsa (L.), Nord-Amerika.
Aex galericulata (L.) . . . . . China.
Cereopsis novae hollandiae Lath. . . . . Australien.
Coscoroba coscoroba (Mol). . . . Rio Grande do Sul.
Chen hyperboreus (Pall.) . . . . . Kanada.
„ nivalis (Forst.) . . . . . Kanada.
Exanthemops rossi (Cass.) Arkt., Nord-Amerika.
Anser anser (L.) . . . . . Deutschland.
„ domesticus Briss. . . . Deutschland.
„ rubrirostris Hodgs. . . . Turkestan.
„ albifrons (Scop.) . . . Nord-Europa.
„ gambeli Hartl. . . . Nord-Amerika.
„ erythropus (L.) . . . . . Lappland.
„ fabalis (Lath.) . . . . . Island.
„ serrirostris Swinh. . . . . Sibirien.
„ middendorffi Severtz. . . . . Amur.
„ brachyrhynchus (Baill.) Spitzbergen.
Eulabia indica (Lath.) . . . . . Ostindien.
Cygnopsis cygnoides (L.) . . . . . Sibirien.
Philacte canagica (Sevast.) . . . . Alaska.
Branta canadensis (L.) . . . . . Labrador.
„ hutschinsi (Rich.) . . . . Alaska.
„ leucopsis (Bechst.) . Spitzbergen.
„ bernicla (L.) . . . . Spitzbergen.
„ nigricans (Lawr.) . . . . . Kanada.
„ ruficollis (Pall.) . . . Jenissei-Tal.
Nesochen sandvicensis (Vig.) . . . . . Sandwich-Inseln.
Chloëphaga melanoptera (Eyt.), Bolivien.
„ hybrida (Mol.) . . . . Falklands-Inseln.
„ magallanica (Gm.), Patagonien.
„ inornata (King) . Argentina.
„ rubidiceps Scl. . . . . Falklands-Inseln.
„ poliocephala Scl. . . . . Chile.
Chenonetta jubata (Lath.) . . Australien.
Dendrocygna viduata (L.) . . . . . Cuba.
„ fulva (Gm.) . . . Argentina.
„ arcuata (Horsf.) . . Ostindien.
„ javanica (Horsf.), Ostindien.
„ autumnalis (L.) . . . Mexiko.
„ arborea (L.) . . Puerto Rico.
„ eytoni (Gould) . Australien.
Alopochen aegyptiacus (L.) . . . Afrika.
„ jubatus (Spix) . . . Amazonia.
Tadorna tadorna (L.) . . . . Deutschland.
„ radjah (Garn.) . . . . Australien.
Casarca casarca (L.) . . . . . Wolga.
„ cana (Gm.) . . . . . Süd-Afrika.
„ variegata (Gm.) . . Neu-Seeland.
„ tadornoides (J. & S.), Australien.
Anas boscas L. . . . . Deutschland.
„ domestica Briss. . A. d. Gefangensch.
„ melleri Scl. . . . . Madagascar.
„ obscura Gm. . . . . Nord-Amerika.
„ fulvigula Ridgw. . . . . Florida.
„ maculosa Sennett. . . . . Texas.
„ diazi Ridgw. . . . . Mexiko.
„ superciliosa Gm . . . . . Südsee.
„ undulata Dubois . . . . Süd-Afrika.
„ specularis King . . . . . Chile.
„ cristata Gm. . . . Falklands-Inseln.
Polionetta zonorhyncha Swinh. . . . Japan.
„ poecilorhyncha (Forst.) . . . . . Ostindien

Eunetta falcata (Georgi) . . . . . Sibirien.
Chaulelasmus streperus (L.), Deutschland.
Mareca penelope (L.) . . . . . Lappland.
„ americana (Gm.). . Nord-Amerika.
„ sibilatrix Poeppig . . . . . Falklands-Inseln.
Nettium formosum (Georgi). . . . . Amur.
„ crecca (L.) . . . . . Deutschland.
„ carolinense (Gm.), Nord-Amerika.
„ castaneum (Eyton). . Australien.
„ gibberifrons (Müll.) . . . Victoria.
„ bernieri (Hartl.) . . Madagascar.
„ capense (Gm.) . . . . . Capland.
„ flavirostre (V.) . . . . . Chile.
„ oxypterum (Meyen) . . . . Peru.
„ georgicum (Gm.), Süd-Georgien.
„ brasiliense (Gm.) . . . Brasilien.
Dafila acuta (L.) . . . . . Lappland.
„ spinicauda (V.) . . . . Süd-Amerika.
„ eatoni (Shp.) . . Kerguelen-Inseln.
Poecilonetta bahamensis (L.), Süd-Amerika.
„ erythrorhyncha (Gm.) . . . . . Süd-Afrika.
Nesonetta aucklandica Gray . . . . Aucklands-Inseln.
Querquedula versicolor (V.). . Argentina.
„ puna (Licht.), Peru, Brasilien.
„ querquedula (L.) . . . . . Deutschland.
„ discors (L.), Nord-Amerika.
„ cyanoptera (V.) . . . . Chile.
Spatula clypeata (L.) . . . . Deutschland.
„ rhynchotis (Lath.) . . Australien.
„ capensis (Smith) . . . . Kapland.
Malacorhynchus membranaceus (Lath.), Neu-Süd-Wales.
Marmaronetta angustirostris (Ménétr.) . . . . Caspisee.
Netta rufina (Pall.) . . . . . Süd-Rußland.
Metopiana peposaca (V.) . . . . . Chile.
Aythya ferina (L.) . . . . . Deutschland.
„ americana (Bp.). . Nord-Amerika.
„ baeri (Radde) . . . . . Sibirien.
„ nyroca (Guld.) . . . Deutschland.
„ australis (Eyton) . . . Australien.
„ erythrophthalma (Pz. W.), Natal.
Aristonetta valisneria (Wils.) . . . . Nord-Amerika.
Fuligula marila (L.) . . . . . Island.
Fuligula affinis Eyton . . Nord-Amerika.
„ fuligula (L.) . . . . . Lappland.
„ collaris (Donov.), Nord-Dakota.
Tachyeres cinereus (Gm.), Falklands-Inseln.
Clangula clangula (L.). . . . . Lappland.
„ islandica (Gm.) . . . . . Island.
Heralda glacialis (L.) . . . . . Lappland.
Histrionicus histrionicus (L.). . . . Island.
Oedemia nigra (L.) . . . . . Lappland.
„ americana Sws. & Rich. . . . . Nord-Amerika.
„ fusca (L.) . . . . . Schweden.
„ deglandi Bp. . . . Nord-Amerika.
„ perspicillata (L.), Nord-Amerika.
Heniconetta stelleri (Pall.) . . . . . Kola.
Arctonetta fischeri (Brandt) . . . Alaska.
Somateria dresseri Shp. . . . . Labrador.
„ mollissima (L.). . Deutschland.
„ borealis Brehm . . . . Grönland.
„ v-nigrum (Gray), Nord-Amerika.
Erionetta spectabilis (L.) . . . . Grönland.
Thalassornis leuconotus (Smith) . . . . . Transvaal.
Nomonyx dominicus (L.), Jamaica, Peru.
Erismatura leucocephala (Scop.) . Wolga.
„ jamaicencis (Gm.), Puerto Rico.
„ maccoa (Smith.). . Abessinien.
„ ferruginea Eyton . . . . Peru.
„ vittata Philippi . . . . . Chile.
Biziura lobata (Temm.) . . . Australien.
Hymenolaemus malacorhynchus (Gm.). . . . Neu-Seeland.
Mergus albellus (L.) . . . . . Sibirien.
Lophodytes cucullatus (L.), Nord-Amerika.
Merganser merganser (L.) . Deutschland.
„ americanus (Cass.) . . . . . Nord-Amerika.
„ serrator (L.). . . Deutschland.

Fam. Phalacrocoracidae.

Phalacrocorax carbo (L.) . . Deutschland. Pegu, Australien.
„ filamentosus (T. & Schl.), Insel Ascold.
„ lucidus (Licht.), Süd-Afrika.
„ capensis (Sparrm.) . . . . Süd-Afrika.
„ gaimardi (Garnot). . Chile.
„ punctatus (Sparrm.) . . Neu-Seeland.

Phalacrocorax featherstoni (Buller) . Chatham-Inseln.
„ pelagicus Pall. . . . Vancouver-Insel.
„ robustus Ridgw. . . Alaska.
„ resplendens Ridgw. . . . . Kalifornien.
„ penicillatus (Brandt), Vancouver-Insel.
„ graculus (L.). . . . . Nordseeküsten.
„ desmaresti Payr., Sardinien.
„ chalconotus Gray . . . . . Neu-Seeland.
„ auritus (Less.) . . Florida.
„ cincinnatus (Brandt), Sitka.
„ neglectus (Wahlb.) . Angra Pequena.
„ fuscicollis Steph , Ostindien.
„ vigua (V.) . . . . Brasilien.
„ mexicanus (Brandt), Mexiko.
„ carunculatus (Gm.). . . . . Neu-Seeland.
„ onslowi Forbes . . Chatham-Inseln.
„ magellanicus (Gm.), Chile.
„ atriceps (King) . . Magellanstraße.
„ albiventer (Less.) . . . . . Patagonien.
„ verrucosus (Cab.) . Kerguelen-Inseln.
„ varius (Gm.) . Neu-Seeland.
„ gouldi (Salvad.), Australien.
„ melanoleucus (V.). . . . . Palau-Inseln.
„ brevirostris Gould . . . . Neu-Seeland.
„ javanicus (Horsf.), Ostindien.
„ pygmaeus (Gm.) . . Wallachei, Algier.
„ africanus (Gm.), Madagascar.
Nannopterum harrisi Rothsch , Galapagos-Inseln.

Fam. Plotidae.

Plotus rufus Daud. . . . . Süd-Afrika.
„ melanogaster (Gm.) . . . Ostindien.
„ novaehollandiae Gould . . . . . Süd-Australien.
„ anhinga (L.) . . . . Nord-Amerika.

Fam. Sulidae.

Sula bassana (L.) . . . . . Schottland.
„ serrator Gray . . . . . Neu-Seeland.
„ capensis (Licht.) . . . . . Süd-Afrika.
„ cyanops (Sundv.) . . . . . Ostindien.
„ piscatrix (L) . . . . . Südsee-Inseln.
„ websteri Rothsch., Galapagos-Inseln.
„ variegata (Tsch.), Galapagos-Inseln.
„ nebouxi Milne-Edw. . . . Galapagos-Inseln.
„ sula (L.) . . . . . Brasilien.
„ brewsteri Goss. . . . . Isabella-Insel.

Fam. Fregatidae.

Fregata aquila (L.) . . Südsee, Brasilien.
„ ariel (Gould), Japan, Pacific-Ozean.

Fam. Phaëthontidae.

Phaëthon rubricauda Bodd., Südsee-Inseln.
„ lepturus Daud. . Südsee-Inseln.
„ americanus Og. Grant. . . . . Puerto Rico.
„ aethereus L. . . Südsee-Inseln.
„ indicus Hume, Golf von Persien.

Fam. Pelecanidae.

Pelecanus onocrotalus Gm., Süd-Rußland.
„ roseus Gm. . . . . Dobrudscha.
„ crispus Bruch, Wolga, Wallachei.
„ philippensis Gm. . . . . Pegu.
„ fuscus Gm. . . . Nord-Amerika.
„ californicus Ridgw., Kalifornien.
„ thagus Mol. . . . . Chile.
„ erythrorhynchus Gm. . . . . Nord-Amerika.
„ conspicillatus Temm. . . . . Tasmanien.

Fam. Cathartidae.

Sarcorhamphus gryphus (L.) . . . . . Süd-Amerika.
Gypagus papa (L.). . . . . Süd-Amerika.
Catharistes urubu (V.), Venezuela, Süd-Brasilien.
Cathartes aura (L.), Kalifornien, Texas.
„ falklandicus (Shp.). . . . . Falklands-Inseln.

Fam. Serpentariidae.

Serpentarius serpentarius (Miller) . . . . . Süd-Afrika.

Fam. Vulturidae.

Vultur monachus (L.) . . . . . Spanien.
Gyps fulvus (Gm.) . . . . . Südost-Europa.
„ himalayensis Hume, Nord-Mongolei.
„ kolbi (Daud.) . . . . . Süd-Afrika.
„ rueppelli (Brehm) . . . . Süd-Afrika.
„ indicus (Scop.) . . . . . Ostindien.
„ pallescens Hume . . . . . Ostindien.
Pseudogyps bengalensis (Gm.), Ostindien.
Otogyps auricularis (Daud) . . . . Oranje-Freistaat.
„ calvus (Scop.) . . . . . Ostindien.
Neophron percnopterus (L.) . Kleinasien.
„ ginginianus (Lath.), Ostindien.
Necrosyrtes monachus (Temm). . . Nordost-Afrika

Fam. Falconidae.

Polyborus tharus (Mol.) . . . . . Paraguay.
„ cheriway (Jacq.) . . . . . Texas.
Ibycter albigularis (Gould) . . . . . Süd-Patagonien.
„ australis Gm. . . Falklands-Inseln.
Milvago chimachima (Vieill.) . . . . . Nord-Brasilien.
„ chimango (Vieill.), Süd-Brasilien, Peru, Chile.
Circus cyaneus (L.) . . . . . Deutschland.
„ hudsonius (L.) . . . Nord-Amerika.
„ cinereus Vieill. . . . . Argentina.
„ spilonotus Kaup. . . . . Amur.
„ maurus (Temm.) . . . . Süd-Afrika.
„ melanoleucus (Forst.) . . . Sibirien.
„ maculosus (Vieill.) . . . Patagonien.
„ assimilis Jard. & Selby, Australien.
„ pygargus (L.) . . . . Deutschland.
„ macrurus (Gm.) . . . . . Wolga.
„ aeruginosus (L.) . . . Deutschland.
„ ranivorus (Daud.) . . . Süd-Afrika.
„ gouldi Bp. . . . . Neu-Seeland.
Parabuteo unicinctus (Temm.) . . . Chile.
„ harrisi (Aud.) . . . . . Mexiko.
Melierax canorus (Rislach) . . . . . Natal.
„ polyzonus (Ruepp.) . . Senegal.
„ mechowi Cab. . . . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ gabar (Daud.) . . . Süd-Afrika.
Astur palumbarius (L.) . . . Deutschland.
„ candidissimus Dyb. . . Oberer Amur.
Astur atricapillus (Wils.) . Nord-Amerika.
„ tachiro (Daud.) . . . . . Mikindani.
„ etorques Salvad., Trobriand-Inseln.
„ trivirgatus (Temm.) . . Mindanao.
„ badius (Gm.) . . . . . Ostindien.
„ poliopsis (Hume) . . . . . Siam.
„ brevipes Severtz. . . . Griechenland.
„ soloënsis (Lath.) . . . . . China.
„ franciscae (Smith) . . Madagascar.
„ cinereus Vieill. . . . . Queensland.
„ haplochrous (Scl.), Neu-Caledonien.
„ rufitorques Peale . . . . Viti-Inseln.
„ approximans Vig. . Süd-Australien.
„ cruentus Gould . . West-Australien.
Accipiter nisus (L.) . . . . . Deutschland.
„ pallens Stejn. . . . . Japan.
„ punicus Erlanger . . . . . Tunis.
„ granti Shp. . . . . Madeira.
„ fuscus (Gm.) . . Nord-Amerika.
„ cooperi . . . . . Nord-Amerika.
„ cirrhocephalus (V.), Queensland.
„ erythrocnemis Gray, Argentina.
„ rufiventris Smith . . Süd-Afrika.
„ hartlaubi (Verr.) . . . . Gabun.
„ virgatus (Temm.) . . . Ostindien.
„ gularis (Temm. & Schl.), China.
„ pileatus (Temm.) . . Argentina.
Heterospizias meridionalis (Lath.) . . . . . Argentina.
Tachytriorchis albicaudatus (V.) . . . . . Süd-Amerika.
„ abbreviatus (Cab.), Mexiko.
„ sennetti Allen. . . Mexiko
Geranoaëtus melanoleucus (V.) . . . . Uruguay, Chile.
Buteo erythronotus (King), Chile, Bolivien.
„ jakal (Daud.) . . . . . Süd-Afrika.
„ ferox Gm. . . . . Sarepta.
„ desertorum (Daud.), Südost-Europa.
„ cirtensis (Lev.) . . . . . Marokko.
„ ménétriesi Bogd. . . . . Kaukasus.
„ buteo (L.) . . . . . Deutschland.
„ zimmermannae Ehmcke, Dobrudscha.
„ plumipes (Hodgs.) . . . . Baikalsee.
„ leucocephalus Hodgs. . . . Sibirien.
„ brachypterus, Hartl. . Madagascar.
„ swainsoni Bp. . . . Nord-Amerika.
„ borealis (Gm.) . . . Nord-Amerika.

Buteo krideri Hoopes . . . . . Minnesota.
„ calurus Cass. . . . . Kalifornien.
„ harlani (Aud.) . . . . . Texas.
„ lineatus (Gm.), Östl. Nord-Amerika.
„ elegans Cass., Westl. Nord-Amerika.
„ alleni Ridgw. . . . . Florida.
„ latissimus (Wils.) . . . . Östl. Nord-Amerika.
Buteola brachyura (Vieill.), Süd-Brasilien.
Asturina plagiata Schl. . . . . Arizona.
Rupornis gracilis Ridgw. . . . . Yucatan.
„ pucherani (J. & R. Verr.) . . . Rio Grande.
„ griseicauda Ridgw. . . . Mexiko.
„ nattereri (Scl. & Salv.) . . . . Südost-Brasilien.
„ leucorrhoa (Q. & G.), Venezuela.
Urubitinga urubitinga (Gm.), Rio Grande.
„ anthracina (Nitzsch), Yucatan.
Harpyhaliaëtus coronatus (V.). . . . Süd-Brasilien.
Gypaëtus barbatus (L.) . . . . . Pyrenäen.
Uroaëtus audax (Lath.) . . . . Australien.
Aquila verreauxi Less. . . . . Süd-Afrika.
„ chrysaëtus (L.) . . . Griechenland.
„ daphanea Hodgs. . . . . Mongolei.
„ heliaca Savign. . . Südost-Europa.
„ adalberti Brehm . . . . . Spanien.
„ bifasciata Gray . . . . . Sarepta.
„ orientalis Cab. . . . . Sarepta.
„ glitschi Severtz. . Nördl. Mongolei.
„ rapax (Temm) . . . . . Algier.
„ vindhiana Frankl. . . . . Ostindien.
„ fulvescens Gray . . . . . Himalaya.
„ wahlbergi Sundev. . . Transvaal.
„ pomerana Brehm. . . Deutschland.
„ hastata (Less.) . . . . . Ostindien.
„ maculata (Gm.) . . . . . Sarepta.
Archibuteo lagopus (Gm.) . . Nord-Europa.
„ sancti-johannis (Gm.) . . . . . Nord-Amerika.
„ strophiatus Hodgs. . Mongolei.
„ ferrugineus (Licht.) . Arizona.
Eutolmaëtus fasciatus (V.) . Griechenland.
„ pennatus (Gm.), Süd-Rußland.
„ morphnoides (Gould) . . . . . Queensland.
Ictinaëtus malayensis (Temm.), Ostindien.
Spizaëtus coronatus (L.) . . West-Afrika.
Spizaëtus kelaarti Legge . . . Süd-Indien.
„ cirrhatus (Gm.) . . . . Bengalen.
„ limnaëtus (Horsf.), Himalaya.
Circaëtus gallicus (Gm.) . . . . . Smyrna.
„ hypoleucus (Pall.), Nord-Persien.
Spilornis cheela (Lath.) . . . . Ostindien.
„ rutherfordi Swinh. . . Himalaya.
„ bacha (Daud.) . . . . . Java.
Butastur teesa (Frankl.) . . . Ostindien.
„ liventer (Temm) . . . . . Pegu.
„ indicus (Gm.) . . . . . Japan.
Helotarsus ecaudatus (Daud.), Süd-Afrika.
Haliaëtus albicilla (L.) . . . Deutschland.
„ leucocephalus (L.) . . . . . Nord-Amerika.
„ leucogaster (Gm.) . . . Assam.
„ leucoryphus (Pall.), Ostindien.
„ vocifer (Daud.) . . . Süd-Afrika.
Thalassaëtus pelagicus (Pall.) . . . . Kamtschatka.
Gypohierax angolensis (Gm.), West-Afrika.
Haliastur indus (Bodd.) . . . . Ostindien.
„ intermedius Gurney . . . Java
„ girrenera (V.) . . Queensland.
„ sphenurus (V.) . . Queensland.
Elanoides furcatus (L.) . . . . Nicaragua.
Milvus milvus (L.) . . . . . Deutschland.
„ aegyptius (Gm.) . . . . Aegypten.
„ korschun (Gm.) . . . Deutschland.
„ affinis Gould . . . . . Pegu.
„ govinda Sykes. . . . . Ostindien.
„ melanotis T. & Schl. . . . Sibirien.
Lophoictinia isura (Gould) . . Queensland.
Rosthramus sociabilis (V.) . . . Guayana.
Elanus caeruleus (Desf.) . . Ostindien, Süd-Afrika.
„ hypoleucus Gould . . . . . Java.
„ leucurus (V.) . . . . . Costa Rica.
„ axillaris (Lath.) . . . . Australien.
Pernis apivorus (L.) . . . . . Deutschland.
„ ptilonorhynchus (T.) . . Ostindien.
Baza madagascariensis (Smith). . . . . Madagascar.
„ jerdoni (Blyth) . . . . . Java.
„ subcristata (Gould) . . . Queensland.
Harpagus diodon (Temm.) . . Argentina.
Ictinia plumbea (Gm.) . . . . Rio Grande.
„ mississippiensis (Wils.) . . . . . Nord-Amerika.

Microhierax erythrogenys (Vig.). . . . . Mindanao.
Harpa novae zealandiae (Gm.) . . . . . Neu-Seeland.
Falco peregrinus Tunst., Deutschland, Nord-Amerika.
„ pealei Ridgw. . . . . Grönland.
„ peregrinator Sundev., Nord-Cachar.
„ melanogenys Gould . . . Australien.
„ cassini Shp. . . . . Patagonien.
„ barbarus L. . . . . Algier.
„ babylonicus Gurney, Central-Asien.
„ feldeggi Schl. . . Wolga, Aegypten.
„ tanypterus Schl. . . . . Nubien.
„ jugger Gray . . . . . Ostindien.
„ hypoleucus Gould . . Queensland.
„ subbuteo L. . . . . Deutschland.
„ severus Horsf. . . . . Nord-Cachar.
„ lunulatus Lath. . . . . Queensland.
„ fusco-caerulescens V. . . . . Mexiko.
„ albigularis Daud. . . . . Argentina.
„ chicquera Daud. . . . . Ostindien.
„ ruficollis Sws. . . . . Süd-Afrika.
„ eleonorae Géné . . . . . Cycladen.
„ concolor Temm. . . . . Algier.
„ merillus (Gerini) . . . . Schweden.
„ columbarius L. . . . Nord-Amerika.
„ richardsoni Ridgw. . . . . Nordwest-Kanada.
Hierofalco candicans (Gm.) . . . Grönland.
„ islandus (Gm.) . . . . . Island.
„ gyrfalco (L.) . . . . Lappland.
„ cherrug (Gray), Süd-Rußland.
„ mexicanus (Schl.) . . . Mexiko.
Hieracidea berigora (Vig. & Horsf.) . . . . . Australien.
„ orientalis (Schl.) . Australien.
Cerchneis tinnunculus (L.) . . . . Deutschland, China.
„ canariensis König . . Canaren.
„ rupicola (Daud.) . . Süd-Afrika.
„ cenchroides (Vig. & H.) . . . . . Australien.
„ rupicoloides (Smith), Süd-Afrika.
„ alopex (Heugl.) . . Abessinien.
„ newtoni (Gurney), Madagascar.
„ naumanni (Fleisch.) . . . . . Griechenland.
„ sparveria (L.) . Nord-Amerika.
Cerchneis deserticola (Mearns) . . . . . Kalifornien.
„ dominicensis (Gm.), Puerto Rico.
„ cinnamomina (Sws.) . . . . . Süd-Brasilien.
„ sparverioides (Vig.) . . . Cuba.
Erythropus vespertinus (L.), Süd-Rußland
„ amurensis (Radde) . . . Amur.

Fam. Pandionidae.

Pandion haliaëtus (L.), Deutschland, Birma.
„ carolinensis Gm., Nord-Amerika.
„ leucocephalus Gould . Australien.
Polioaëtus ichthyaëtus Horsf., Ostindien.
„ humilis Müll. & Schl. . . . , . . . Kaschmir.

Fam. Bubonidae.

Asio otus (L.) . . . . . Deutschland.
„ wilsonianus (Less.) . Nord-Amerika.
„ accipitrinus (Pall.). . . Deutschland.
„ nisuella Daud. . . . . Marokko.
Ketupa ceylonensis (Gm.) . . Ostindien.
„ flavipes (Hodgs.) . . . . . Assam.
„ ketupa (Horsf.) . . . . . Java.
Bubo bubo (L.) . . . . . Deutschland.
„ sibiricus Licht. . . . . Wolga.
„ turcomanus (Eversm.) . . . . Altai.
„ virginianus (Gm.) . . Nord-Amerika.
„ pacificus Cass. . . . . Kalifornien.
„ arcticus Sws. . . . . Kanada.
„ ascalaphus Savign. . . . . Syrien.
„ kiautschensis Reichn. . . Kiautschou.
„ bengalensis (Frankl.) . . . Bengalen.
„ capensis Smith. . . . . Süd-Afrika.
„ magellanicus Gm. . . . . Patagonien.
„ maculosus (Vieill.) . . . Süd-Afrika.
„ cinerascens Guér. . . . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ lacteus (Temm.) . . : . Süd-Afrika.
„ coromandus (Lath.) . . . . Ostindien.
Huhua nipalensis Hodgs . . . . . Assam.
„ orientalis (Horsf.) . . . . . Java.
„ poënsis Fraser . . . . Fernando Po.
Nyctea nyctea (L.) . . . . . Lappland.
Scops scops (L.) . . . . . Süd-Europa.
„ pennata Hodgs. . . . . Süd-Indien.
„ elegans Cass. . . . Liu-Kiu-Inseln.
„ brucei (Hume) . . . . Transkaspien.
„ spilocephala (Blyth) . . . Himalaya.

Scops rutila Pucher. . . . . Madagascar.
„ semitorques (T. & Schl.) . . Japan.
„ plumipes (Hume). . . . . Sikkim.
„ bakkamaena (Forst.) . . Süd-Indien.
„ lettia Hodgs. . . . . Himalaya.
„ glabripes (Swinh.) . . . . Formosa.
„ sagittata (Cass.) . . . . . Perak.
„ lempiji Horsf. . . . . Malakka.
„ barbara Scl. & Salv. . . Guatemala.
„ brasiliana (Gm.) . . . . Venezuela.
„ asio (L.) . . . . . Nord-Amerika.
„ trichopsis Wagl. . . . . Mexiko.
„ maccalli Cass. . . . . Texas.
„ aikeni (Brewst.) . . . . . Kansas.
„ bendirei (Brewst.) . . Kalifornien.
„ kennicotti Elliot . . . . . Oregon.
Psiloscops flammeola (Kaup) . . . Mexiko.
Ninox lugubris (Tickell) . . . . Ostindien.
„ scutulata Raffl. . . . . Sikkim.
„ japonica (Temm. & Schl.) . . Amur.
„ boobook (Lath.) . Süd-Australien.
„ connivens (Lath.), Nord-Australien.
„ odiosa Scl. . . . . Neu-Pommern.
Syrnium aluco (L.) . . . . . Deutschland.
„ biddulphi Scully . . Afghanistan.
„ uralense (Pall.) . . Ostpreußen.
„ fuscescens (T. & S.) . . . Japan.
„ nebulosum (Forst.). . . . . Nord-Amerika.
„ alleni (Ridgw.) . . . . . Texas.
„ ocellatum (Less.) . . . Ostindien.
„ suahelicum Reichen. . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ indrani (Sykes) . . . . . Ceylon.
Scotiaptex cinerea (Gm.), Nord-Amerika.
„ lapponica (Retz) . . Lappland.
Nyctala tengmalmi (Gm.) . . . . Lappland.
„ richardsoni Bp. . . . . Labrador.
„ acadica (Gm.) . . Nord-Amerika.
Surnia ulula (L.) . . . . . Lappland.
„ caparoch (Müll.) . . . . . Labrador.
Athene noctua (Scop.) . . . Deutschland.
„ glaux (Savign.) . . . . . Cypern.
„ brama (Temm.) . . . . . Ostindien.
Speotyto cunicularia (Mol.) . . Brasilien.
„ hypogaea (Bp.) . . Kalifornien.
„ floridana Ridgw. . Süd-Florida.
Gymnasio nudipes (Daud.) . Puerto Rico.
Glaucidium nanum (King) . . Argentina.
„ passerinum (L.) . . Spanien.
„ siju (d'Orb.) . . . . . Cuba.
„ gnoma Wagl . . . . Oregon.
„ pumilum (Temm.) . . Südost-Brasilien.
„ ferox (Vieill.) . . . Südost-Brasilien.
„ brodiei (Barton) . . . Assam.
„ castanonotum (Blyth), Ceylon.
„ radiatum (Tick.) . . Ostindien.
„ cuculoides (Gould) . . Cachar.
„ whitelyi (Swinh.) . . . China.
Micropallas whitneyi (Cooper) . . Arizona.
Photodilus badius (Horsf.) . . . . Assam.

Fam Strigidae.

Strix flammea L., Deutschland, Ost-Afrika.
„ javanica (Gm.) . . . . . Pegu.
„ perlata (Licht.) . . . . . Brasilien.
„ pratincola Bp. . . . . Nord-Amerika.
„ furcata (Temm.) . . . . . Cuba.
„ delicatula Gould . . . . Australien.
„ rosenbergi Schl. . . . . Celebes.
„ novae-hollandiae Steph., Australien.
„ candida Tick. . . . . Assam.

Fam. Nestoridae.

Fam. Loriidae.

Eos cyanogenys Bp. . . . Geelwink-Bai.
„ reticulata (Müll.) . Tenimber-Inseln.
„ variegata (Gm.) . . . . . Halmahera.
„ fuscata Blyth . . . . . Insel Jobi.
Lorius domicella . . . . . Ceram.
„ garrulus (L.) . . . . . Ceram.
Trichoglossus forsteni Bp., Insel Sumbava.
„ massena Bp. . . Südost-Neu-Guinea.
„ haematodes (L.) . . Timor.
„ mitchelli Gray . . Lombok.
„ novae-hollandiae (Gm.) . . . . . Queensland.
„ rubritorques Vig. . . Nord-Queensland.
Psitteuteles chlorolepidotus (Kuhl) . . . . . Australien.
Glossopsittacus concinnus (Shaw) . Neu-Süd-Wales.

Glossopsittacus pusillus (Shaw) . . . . Australien.
Hypocharmosyna subplacens (Scl.) . . Neu-Pommern.

Fam. Cyclopsittacidae.

Cyclopsittacus maccoyi Gould, Kap York

Fam. Cacatuidae.

Calyptorhynchus baudini Vig., S.-W.-Australien.
„ xanthonotus Gould. . . . Tasmanien.
Cacatua galerita (Lath.) . . . Australien.
„ triton (Temm.) . . Neu-Guinea.
„ sulphurea (Gm.) . . . . . Celebes.
„ leadbeateri (Vig.) . . . . . Nord-Australien.
„ moluccensis (Gm.) . . . . .Ceram
„ gymnopis Scl. . . . . Australien.
„ goffini (Finsch), Tenimber-Insel.
„ roseicapilla Vieill. . . Australien.
Licmetis nasica (Temm.) . . . Australien.
Calopsittacus novae-hollandiae (Gm.) . . . . . Australien.

Fam. Psittacidae.

Nasiterna pygmaea (Q.&G.), Neu-Guinea.
„ pusio Scl., Insel Duke of York.
Ara ararauna (L.) . . . . . Guayana.
„ macao (L.) . . . . . Brasilien.
„ chloroptera Gray . . . . . .Amazonia.
„ militaris (L.) . . . . . .Süd-Amerika.
„ severa (L.) . . . . . Brasilien.
„ maracana (Vieill.) . . . . . Brasilien.
Conurus acuticaudus (V.) . . . . Paraguay.
„ solstitialis (L.) . . . . . Guayana.
„ nanday (V.) . . . . . .Paraguay.
„ frontatus Cab. . . West-Ecuador.
„ leucophthalmus (Müll.) . . . . . .Süd-Brasilien.
„ aztec (Souancé) . . . . Yucatan.
„ aeruginosus (L.) . . . Venezuela.
„ ocularis S. & S. . . . . Panama.
„ pertinax (L.) . . . . St. Thomas.
„ aureus (Gm.) . . . . . Surinam.
„ canicularis (L.) . . . . . Mexiko.
Conuropsis carolinensis (L.), Nord-Amerika.
Henicognathus leptorhynchus (King) Chile.
Pyrrhura vittata (Shaw) . . Rio Grando.
Myopsittacus monachus (Bodd.), Uruguay.
Bolborhynchus aurifrons (Less.) . . Peru.
„ lineolatus (Cass) . . . .Süd-Amerika.
Psittacula coelestis (Less.) . . . . . Peru.
„ conspicillata Lafr., Columbien.
„ modesta Cab. . . . . Peru.
„ passerina (L.) . . . . Brasilien.
„ flavescens Salvad. . . Bolivien.
„ guianensis (Sws.), Venezuela.
Brotogerys tirica (Gm.) . . . . . Brasilien.
„ chiriri (V.) . . . . . Südost-Brasilien.
„ virescens (Gm.) . . . Brasilien.
„ pyrrhopterus (Lath.), Ecuador.
„ devillei (Gray) . . . . . Peru.
„ gustavi Berl. . . . . Peru.
Amazona mercenaria (Tsch.) . . . . . West-Ecuador.
„ amazonica (L.) . . . Amazonia.
„ aestiva (L.) . . . . . Brasilien.
„ ochrocephala (Gm.), Venezuela.
„ oratrix Ridgw. . . . . .Mexiko.
„ finschi Scl. . . . . .Mexiko.
„ xanthops (Spix) . . . . Brasilien.
„ vittata (Bodd.) . . Puerto Rico.
„ leucocephala (L.) . . . . . Cuba.
Pionus menstruus (L.) . . . . . .Amazonia.
„ maximiliani (Kuhl) . . . Paraguay.
Pionopsittacus pileatus (Salv.), Rio Grande.
Poeocephalus fuscicollis (Kuhl) . . Togo.
„ matschiei Neum., Deutsch-Ost-Afrika.
„ meyeri (Ruepp.) . . Uganda.
Psittacus erythacus L. . . . West-Afrika.
Coracopsis vaza (Shaw) . . . .Madagascar.
„ nigra (L.) . . . . .Madagascar.
Eclectus pectoralis (Müll.), Neu-Hannover.
„ roratus (Müll.) . . . Molukken.
„ cardinalis (Bodd.) . . Molukken.
„ cornelia Bp. . . . . Sumba-Insel.
Palaeornis eupatria (L.) . . . . . Ceylon.
„ nepalensis Hodgs., Ostindien.
„ indoburmanicus Hume, Pegu.
„ torquata (Bodd.) . . Ostindien.
„ cyanocephala (L.) . . Ostindien.
„ rosa (Bodd.) . . . . . Himalaya.
„ schisticeps Hodgs. . . Assam.

Palaeornis finschi Hume . . . . . Assam.
„ peristerodes Finsch . Ostindien.
„ calthorpae Layard. . . Ceylon.
„ fasciata (Müll.) . . . . Sikkim.
„ alexandri (L.) . . . . . Java.
Polytelis barrabandi (Sws.) . . . . . Süd-Australien.
„ melanura (Vig.) . . . Australien.
Ptistes erythropterus (Gm.) . . Australien.
Aprosmictus cyanopygius (V.), Australien.
„ hypophonius (Müll.) . . . . . Halmahera.
Pyrrhulopsis splendens (Peale) . . . . . Viti-Inseln.
„ tabuensis (Gm.), Viti-Inseln.
„ personata (Gray), Viti-Inseln.
Agapornis cana (Gm.) . . . . . Madagascar.
„ nigrigenis W. L. Scl. . . N.-W.-Rhodesia.
„ pullaria (L.) . . . West-Afrika.
„ roseicollis V. . . . . Süd-Afrika.
Loriculus vernalis (Sparrm.) . . Ostindien.
„ flosculus Wall. . . . . Flores.
„ galgulus (L.) . . . . Malakka.
„ stigmatus (M. & Schl.) . . . . . Celebes.
„ amabilis (Wall.) . . . . Batjan.
Platycercus elegans (Gm.) . . Australien.
„ flaviventris (T.) . Australien.
„ pallidiceps Vig. . Australien.
„ eximius (Shaw) . Australien.
„ icterotis (Kuhl) . Südwest-Australien.
Porphyrocephalus spurius (Kuhl), W.-Australien.
Barnardius barnardi (Vig. & H.), Australien.
„ zonarius (Shaw) . Australien.
Psephotes xanthorrhous Bp. . . . . Süd-Australien.
„ pulcherrimus (Gould) . . . . . Australien.
„ chrysopterygius (Gould) . . . . Nord-Australien.
„ multicolor (Kuhl) . Australien.
„ haematonotus (Gould) . . . . . Australien.
Neophema bourkei (Mitch.) . . Australien.
„ petrophila (Gould), Australien.
„ pulchella (Shaw) . Australien.
„ elegans (Gould) . . Australien.
Neophema venusta (Temm.) . Australien.
Cyanorhamphus novae-zealandiae (Sparrm.) . Neu-Seeland.
„ auriceps (Kuhl) . . . Neu-Seeland.
Nymphicus cornutus (Gm.) . . . . Neu-Caledonien.
Nanodes discolor (Shaw) . . . Australien.
Melopsittacus undulatus (Shaw) . . . . . Australien.
Pezoporus terrestris (Shaw) . Australien.
Geopsittacus occidentalis Gould . . . Süd-Australien.

Fam. Stringopidae.

Stringops habroptilus Gray, Neu-Seeland.

Fam. Steatornithidae.

Steatornis caripensis Humboldt, Trinidad.

Fam. Podargidae.

Podargus papuensis Quoy & Gaimard . . Nord-Australien.
„ strigoides (Lath.) . . Australien.
„ phalaenoides Gould, Queensland.
„ ocellatus Q. & G., Neu-Guinea.
Batrachostomus septimus Tweedd. . . . . Mindanao.
„ stellatus (Gould), Borneo.
„ javensis (Horsf.), Borneo.
„ hodgsoni (Gray) . . . . . Himalaya.
„ affinis Blyth. . . Borneo.
„ moniliger Blyth . . . . Süd-Indien.
Aegotheles bennetti Salvad. & d'Alb., Deutsch-Neu-Guinea.
„ novae-hollandiae (Lath.) . . . . . Australien.

Fam. Leptosomatidae.

Leptosoma discolor (Herm.), Madagascar.

Fam. Coraciidae.

Coracopitta pittoides (Lafr.), Madagascar.
Coracias indicus L. . . . . Ostindien.
„ affinis McClell. . . . Himalaya.
„ garrulus L. . . . . Deutschland.
„ caudatus L. . . . . Ost-Afrika.
„ naevius Daud. . . . Süd-Nigeria.
Eurystomus glaucurus (Müll.), Madagascar.
„ afer (Lath.) . . . . Pangani.

Eurystomus orientalis (L.) . . . . . Java.
„ australis Sws . Queensland.
„ calonyx Shp. . . . . China.

Fam. Alcedinidae.

Pelargopsis gigantea Wald. . . Mindanao.
„ gurial (Pears.) . . Ostindien.
Ceryle rudis (L.) . . Aegypten, Sansibar.
„ varia Strickl. . . . . Assam.
„ guttata Vig., Nord-Cachar, Japan.
„ mixima (Pall.) . . . . . Liberia.
„ torquata (L.) . . . . . Peru.
„ alcyon (L.) . . . . . Nord-Amerika.
„ amazona (Lath.) . . . . . Brasilien.
„ americana (Gm.) . . . . . Brasilien.
„ cabanisi (Tschudi) . . . . . Peru.
„ septentrionalis Shp. . . . . Texas.
„ superciliosa (L.) . . . Süd-Amerika.
Alcedo ispida L. . . . Deutschland, Asien.
„ ispidioides Less. . . Neu-Pommern.
„ semitorquata Sws. . . Kapkolonie.
„ euryzona Temm. . . . . Malakka.
„ grandis Blyth . . . . . Assam.
„ meninting Horsf. . . . . Pegu.
„ beavani Walden . . . . . Assam.
„ beryllina Vieill. . . . . Java.
Corythornis cristata (L.) . . Madagascar.
Alcyone azurea (Lath.) . . . . Australien.
„ pulchra Gould . Nord-Australien.
„ lessoni Cass. . . . . Neu-Guinea.
Ceyx tridactyla (Pall.) . . . . . Assam.
„ lepida Temm. . . . . Insel Morotai.
„ sacerdotis Ramsay . . Neu-Pommern.
Ispidina natalensis (Smith) . . . . . Natal.
Syma torotoro Less. . . . . Neu-Guinea.
Carcineutes pulchellus (Horsf.), Malakka.
Dacelo gigas (Bodd.) . . . . . Australien.
„ leachii Vig. & Horsf., Queensland.
„ cervina Gould . . Nord-Australien.
Sauromarptis gaudichaudi (Q. & G.) . . . . Aru-Inseln.
„ kubaryi Meyer, Neu-Guinea.
Halcyon coromandus (Lath.) . . . Assam.
„ smyrnensis (L.) . . . Ostindien.
„ cyaniventris (V.) . . . . . Java.
„ pileatus (Bodd.), China, Assam.
„ semicaeruleus (Forst.) . . . . . Nyassa-See.
„ albiventris (Scop.) . Kapkolonie.
Halcyon orientalis Peters . . . Daressalam.
„ chelicutensis (Stanley) . . . . . Daressalam.
„ senegalensis (L.) . Süd-Nigeria.
„ saurophagus Gould . . . . . Neu-Pommern.
„ macleayi Jard. & Selby . . . . . Queensland.
„ pyrrhopygius Gould. . . . Central-Australien.
„ sacer (Gm.) . . . . . Viti-Inseln.
„ tristrami Layard, Neu-Pommern.
„ sanctus Vig. & Horsf., Australien.
„ vagans (Less.) . . Norfolk-Inseln.
„ chloris (Bodd.) . . . . . Java.
„ solomonis, Ramsay, Neu-Pommern.
Todirhamphus recurvirostris Lafr. . . . . Samoa-Inseln.
Monachalcyon princeps Reichb. . Celebes.
Tanysiptera danaë Shp. . Deutsch-Neu-Guinea.
„ nigriceps Scl. . . . Insel Duke of York.
„ sylvia Gould . . . Kap York.
„ doris Wall. . Insel Morotai.
„ galatea Gray . . Neu-Guinea.
„ dea (L.) . . . . . Amboina.

Fam. Bucerotidae.

Bucorax abyssinicus Bodd. . . Abessinien.
Dichoceros bicornis (L.) . . . . . Pegu.
Hydrocorax mindanensis (Tweedd.) . . . . . Mindanao.
Anthracoceros convexus (Temm.) . Java.
„ albirostris Shaw & N. . . . . Pegu.
Aceros nepalensis (Hodgs.) . . . . Assam.
Rhytidoceros undulatus (Shaw) . . . . . Tenasserim.
„ subruficollis (Blyth) . Pegu.
„ plicatus (Forst.), Neu-Guinea.
Ceratogymna atrata (Temm.) . . Kamerun.
Ptilolaemus austeni (Jard.) . . . . Assam.
„ tickelli (Blyth), Tenasserim.
Ocyreros birostris (Scop.) . . . . Ostindien.
„ griseus (Lath.) . . . . Ostindien.
Lophoceros melanoleucus (Licht.) . . . Süd-Ost-Afrika.
„ epirhinus (Sundev.), Transvaal.
„ erythrorhynchus (Temm.) . . . . . Transvaal.

Fam. Upupidae.

Upupa epops L. . . . . Deutschland.
„ indica Reichb. . . . . Ostindien.
„ marginata Bp. . . . . Madagascar.
„ africana Bechst. . . . . Natal.

Fam. Irrisoridae.

Irrisor viridis (Licht.) . . . . Kapkolonie.

Fam. Meropidae.

Dicrocercus hirundinaceus (Licht.) . . . . . Damaraland.
Melittophagus cyanostictus Cab. . . . . Daressalam.
„ pusillus (Müll.) . . Liberia.
„ swinhoii (Hume), Ostindien.
Merops bicolor Bodd. . . . . Philippinen.
„ sumatranus Raffl. . . . Malakka.
„ apiaster L. . . Süd-Deutschland.
„ persicus Pall. . . . . Syrien.
„ superciliosus L. . . . Madagascar.
„ philippinus L., Pegu, Philippinen.
„ ornatus Lath. . . . . Australien.
„ viridis L. . Ostindien, Ost-Afrika.
„ nubicus Gm. . . . . Ost-Afrika.
Nyctiornis athertoni J. & S. . . Ostindien.
„ amicta (Temm.) . . . Malakka.

Fam. Momotidae.

Prionornis platyrhynchus (Leadb.) . . . . . Costa Rica.
Eumomota superciliaris (Sandb.), Yucatan.
Momotus momota (L.) . . . . . Brasilien.
„ aequatorialis (Gould) . . Peru.
„ lessoni Less. . . . . Yucatan.
„ caeruleiceps (Gould) . . Mexiko.
„ mexicanus Sws. . . . . Mexiko.
„ castaneiceps Gould, Guatamala.

Fam. Todidae.

Todus viridis L. . . . . Jamaica.
„ multicolor Gould. . . . . Cuba.
„ hypochondriacus Bryant . . . . . Puerto Rico.

Fam. Caprimulgidae.

Nyctibius jamaicensis Gm. . . . Paraguay.
„ aethereus (Pz. W.) . Brasilien.
Chordeiles virginianus (Gm.) . . . . . Nord-Amerika.
Chordeiles henryi Cass. . . . . Mexiko.
„ sennetti Coues . . . . Kanada.
„ chapmani Coues . . . . Florida.
„ minor Cab. . . . . Cuba.
„ acutipennis Bodd. . Amazonia.
„ texensis Lawr., Yucatan, Texas.
„ rupestris (Spix) . . Amazonia.
Nannochordeiles pusillus Gould, Amazonia.
Podager nacunda (Vieill.) . Süd-Brasilien.
Lurocalis semitorquatus (Gm.) . . . . . Süd-Brasilien.
Eurostopus albigularis (Vig. & H.) . . . . Queensland.
„ argus Hartert . . Queensland.
„ nigripennis Ramsay . . . Salomon-Inseln.
Lyncornis temmincki Gould . . Malakka.
Macropsalis creagra (Bp.) . . . Argentina.
Hydropsalis torquata (Gm.) . . Brasilien.
„ furcifer (V.) . Süd-Brasilien.
„ climacocercus (Tsch.) . Peru.
Scotornis climacurus (V.) . . . . . Senegal.
Macrodipteryx longipennis (Shaw) . . . Sierra Leone.
Cosmetornis vexillarius (Gould), Pangani.
Heleothreptus anomalus (Gould) . . Süd-Brasilien.
Nyctidromus albicollis (Gm.) Central- und Süd-Amerika.
„ merilli Sennett. . . . Mexiko.
„ derbyanus Gould, Rio Grande.
Phalaenoptilus nuttalli (Aud.) . . . Nord-Amerika.
Stenopsis longirostris (Bp.) . . . . . Chile.
„ ruficervix Scl. . . . Columbien.
Caprimulgus ocellatus Tsch. . . . . Peru.
„ parvulus Gould, Argentinien.
„ nigrescens Cab. . . Amazonia.
„ vociferus Wils. . . . . Nord-Amerika.
„ macromystax (Wagl.) . . . . . Mexiko.
„ salvini Hartert . . Yucatan.
„ rufus Bodd. . . Rio Grande.
„ sericeocaudatus Cass. . . . . Venezuela.
„ carolinensis (Gm.) . . . . Nord-Amerika.
„ fossei Hartl., Südost-Afrika.
„ enerratus Gray, Madagascar.

Caprimulgus mahrattensis Sykes . . . . . Ostindien.
„ aegyptius Licht. . . . Tunis.
„ asiaticus Lath. . . Bengalen.
„ affinis Horsf. . . . Sumatra.
„ griseatus Wald . . . Luzon.
„ monticola Frankl., Bengalen.
„ manillensis Wald., Palawan.
„ macrurus Horsf., Neu-Guinea.
„ ambiguus Hart. . . Malakka.
„ albonotatus Tick., Ostindien.
„ nipalensis, Hart. . . Sikkim.
„ atripennis Jerd . . . Ceylon.
„ madagascariensis Sganz. . . . . Madagascar.
„ europaeus L. . Deutschland.
„ unwini Hume, Transcaspien.
„ plumipes Prjev. . . Mongolei.
„ ruficollis Temm. . . . Spanien.
„ rufigena Smith . . Transvaal.
„ pectoralis Cuv., Süd-Afrika.
„ indicus Lath. . . . . Cachar.
„ jotaka T. & Schl. . . . Amur.

Fam. Macropterygidae.

Macropteryx coronata (Tickell), Ostindien.
„ longipennis (Rafin.), Malakka.
„ mystacea (Less.). . . . Neu-Pommern.
„ comata (Temm.) . . . Java.

Fam. Cypselidae.

Collocalia fuciphaga (Thunb.) . . . . N.-W.-Borneo.
„ unicolor (Jerd.). . . . Ostindien.
„ francica (Gm.) . . . . Mauritius, Samoa.
„ uropygialis Gray . . . . . Neu-Caledonien.
„ linchi Horsf. & M., Java, Sumatra.
„ marginata Salvad. . . Mindanao.
„ esculenta (L.) . . Amboina, Neu-Guinea.
Chaetura candacuta (Lath.). . . . . Amur.
„ zonaris (Shaw) . . . Columbien.
„ pelagica (L.) . . Nord-Amerika.
„ vauxi (Towns), Nord-Amerika.
Cypseloides niger (Gm.). . . . . Dominica.
„ fumigatus (Straub.) . . Südost-Brasilien.
Tachornis parvus (Licht.). . . Ost-Afrika.
„ myochrous Reichn, Deutsch-Ost-Afrika.
„ gracilis (Shp.) . . . . . Togo.
„ balasiensis (Gray) . . Ostindien.
„ infumatus (Scl.) . . . . Assam.
„ phoenicobius Gosse . . Jamaica
Aëronautes melanoleucus (Baird.), Westl. Nord-Amerika.
Panyptila cayanensis (Gm.). . . Guayana.
Cypselus melba (L.) . . . . . Schweiz.
„ apus (L.) . . . . . Deutschland.
„ acuticandus Blyth. . . Ostindien.
„ pekinensis (Swinh.). Mandschurei.
„ murinus (Brehm) . . . . Malaga.
„ unicolor (Jardine) . . . Madeira.
„ pacificus (Lath.) . . . . Sibirien.
„ caffer (Licht.) . . . Kapkolonie.
„ streubeli (Hartl.) . . . . Pangani.
„ horus (Heugl.) . . . Somaliland.
„ affinis (Gray) . . . . . Ostindien.
„ galilejensis (Antin.) . Palästina.
„ subfurcatus (Blyth) . . . Amoy.

Fam. Trochilidae.

Hemistephania ludoviciae (B. & M.) . . . Venezuela.
„ rectirostris (Gould), Peru.
Rhamphodon naevius (Dumont), Brasilien.
Threnetes ruckeri (Bourc.) . . . Chiriqui.
Glaucis hirsuta (Gm.) . . . . . Amazonia.
Phaëthornis emiliae (R. & M.), Columbien.
„ superciliosus (L.), Ost-Peru.
„ eurynome (Less.), Rio Grande.
„ longirostris (Less. & Del). . . Honduras.
„ augusti (Bourc.). Venezuela.
„ adolphi Gould . . . Honduras.
Campylopterus hemileucurus (Licht.). . . . . Honduras.
„ lazulus (Vieill.), Venezuela.
Florisuga mellivora (L.) . . . Venezuela.
Melanotrochilus fuscus (V.), Süd-Brasilien.
Aphantochroa cirrhochloris (V.) . . . . . Pernambuco.
Talaphorus taczanowskii (Scl.) . . . Peru.
Patagona gigas (Vieill.). . . . . Chile.
Leucippus chionogaster (Tsch.) . . Peru.
Agyrtria bartletti (Gould) . . . Ost-Peru.

Agyrtria brevirostris(Less.),Süd-Brasilien.
„ viridissima (Less.). . . Surinam.
„ tephrocephala (V.). . . . . Südost-Brasilien.
Lepidopyga goudoti (Bourc.). Columbien.
Saucerottea warscewiczi (C. & H.) . . Nord-Columbien.
„ braccata (Heine). Venezuela.
„ feliciae (Less.). . Venezuela.
„ devillei (B. & Muls.) . . . Guatemala.
Amazilia tzacatl (Llave) . . . Costa Rica.
„ cerviniventris Gould . . . Texas.
„ leucophaea Reichb. . . . . Peru.
Phaeoptila latirostris (Sws.) . . . Arizona.
Hylocharis ruficollis (V.) . . .Rio Grande.
Chrysuronia oenone (Less.). . Venezuela.
Chlorestes caeruleus (V.). . . Venezuela.
Chlorostilbon aureiventris (d'O. & Lafr.) . Argentina.
„ pucherani (B. & M.). . . . . Rio Grande.
„ gibsoni (Fraser), Columbien.
„ stenura (Cab. & Heine). . . . Venezuela.
Ricordia ricordi (Gerv.) . . . . . Cuba.
Panterpes insignis Cab. & Heine . . . . . Costa Rica.
Thalurania glaucopis (Gm.). . . Brasilien.
„ nigrifasciata (Gould) . . Peru.
Eupherusa eximia (Delattre), Guatemala.
Elvira chionura (Gould) . . . . . Veragua.
Chalybura buffoni (Less.). . . Columbien.
Petasophora cyanonota (B. & M.) . . . . . Venezuela.
„ delphinae (Less.) . . . Peru.
„ iolata (Gould) . . . . . Peru.
Lampornis mango (L.) . . . . . Jamaica.
„ violicauda (Bodd.) . . . . Süd-Brasilien.
„ gramineus (Gm.) . Venezuela.
„ virginalis Gould. Puerto Rico.
„ viridis (Vieill.) . Puerto Rico.
Chrysolampis mosquitus (L.) . . . . Bahia.
Sericotes holosericeus (L.) . St. Thomas.
Leucochloris albicollis (V.) . . . Brasilien.
Aithurus polytmus (L.) . . . . . Jamaica.
Topaza pyra (Gould) . . . . . Amazonia.
Oreotrochilus estella (d'O. & Lafr.) . . . . . Süd-Peru.
Oreotrochilus bolivianus Boucard . . Peru.
Sternoclyta cyanipectus (Gould) . . . . . Venezuela.
Eugenes spectabilis (Lawr.), Costa Rica.
Oreopyra leucaspis Gould . . . Chiriqui.
„ calolaema Salvin . . Costa Rica.
Heliodoxa leadbeateri (B. & M.),Venezuela.
Helianthea eos (Gould) . . . . Venezuela.
„ conradi (Bourc.) . Venezuela.
„ torquata (Boiss.) . . Bolivien.
Lafresnayealafresnayei(Boiss.),Columbien.
Aglaeactis cupreipennis (B. & M.), Peru.
Boissonneana flavescens (Lodd.) . . . . . Venezuela.
Eriocnemis vestita (Less.) . . Venezuela.
„ cupriventris (Fraser) . . . . . Venezuela.
„ lugens (Gould) . . . Ecuador.
Spathura underwoodi (Less.) . Venezuela.
Adelomyia melanogenys (Fraser) . . . . . Columbien.
„ aeneosticta Simon, Venezuela.
Heliangulus mavors Gould . . Venezuela.
„ spencei (Bourc.), Venezuela.
„ clarissae (Longuem.) . . . Columbien.
„ viola Gould . . . . . Peru.
Metallura phoebe (L. & Del.) . . . Peru.
„ tyrianthina (Lodd.), Venezuela.
Oxypogon lindeni (Parz.). . . Venezuela.
Eustephanus galeritus (Molina) . . Chile.
Rhamphomicrum microrhynchum (Boiss.) . . . Venezuela.
Cyanolesbia caudata Berl.. . . Venezuela.
Psalidoprymna aequatorialis (Bouc.) . . . . . Ecuador.
„ gouldi (Lodd.), Columbien.
Thaumastura cora (Less.) . . . . . Peru.
Heliomaster furcifer (Shaw) . Argentina
Calothorax lucifer (Sws.) . . . . Arizona.
Myrtis fanny (Less.) . . . . . Peru.
Myrmia micrura (Gould) . . . . . Peru.
Trochilus colubris L. . . . Nord-Amerika.
„ alexandri (B. & M.), Neu-Mexiko.
„ costae (Bourc.), Kap St. Lucas.
„ anna (Less.) . . . Kalifornien.
Selasphorus rufus (Gm.) . . Kalifornien.
„ alleni Hensh. . Kalifornien.
„ scintilla (Gould), Costa Rica.

Selasphorus ardens Salvin. . . Costa Rica.
Chaetocercus rosae (Burch.) . Venezuela.
„ heliodori Salv. . Venezuela.
Atthis heloisa (Less. & Del.) . . . . . Süd-Mexiko.
„ calliope (Gould) . . . . . Nevada.
Mellisuga minima (L.) . . . . . Jamaica.
Bellona cristata (L.) . . . Insel Grenada.
Stephanoxis lalandei (V.), Süd-Brasilien.
Clais guimeti (B. & M.) . . . Venezuela.
Lophornis ornatus (Bodd.) . . Venezuela.
„ stictolophus S. & Ell. . . . . Columbien.

Fam. Coliidae.

Colius striatus Gm. . . . . Caffraria.
„ minor Reichn. . . . . Natal.
„ leucotis Ruepp. . . . . Abessinien.
„ affinis Shelley, Deutsch-Ost-Afrika.
„ colius (L.) . . . . . Kapland.
„ erythromelon Vieill. . . Süd-Afrika.
„ pallidus Reichn. . . . . Mikindani.

Fam. Trogonidae.

Pharomacrus mocinna Llawe . . Honduras.
„ antisianus (d'Orb.) . . . . . Venezuela.
Prionotelus temnurus (Temm.) . . . Cuba.
Trogon collaris Vieill. . . . . Peru.
„ puella Vieill. . . . . Yucatan.
„ atricollis V. . . . Südost-Brasilien.
„ viridis L. . . . . Venezuela.
„ melanocephalus Gould, Honduras.
„ caligatus Gould . . . . Honduras.
„ surucura Vieill. . . . Rio Grande.
„ massena Gould . . . . . Honduras.
Pyrotrogon fasciatus (Penn.) . . Ostindien.
„ ardens (Temm.) . . Mindanao.
„ erythrocephalus Gould, Assam.
„ orescius (Temm.), Tenasserim.
Hapalarpactes reinwardti (Temm.), Java.

Fam. Musophagidae.

Turacus leucotis (Ruepp.), Nordost-Afrika.
„ zenkeri Reichn. . . . . Kamerun.
„ corythaix (Wagl.) . . Süd-Afrika.
Corythaeola cristata (Vieill.), West-Afrika.
Schizorhis africana (Lath.) . . . . Guinea.
Schizorhis zonura Ruepp. . . . Abessinien.
Gymnoschizorhis leopoldi (Shelley) . . Ost-Afrika.

Fam. Cuculidae.

Coccystes glandarius (L.) . . Süd-Europa.
„ coromandus (L.) . . . . Sikkim.
„ jacobinus (Bodd.) . . Ostindien.
„ serratus (Sparrm.), Kapkolonie.
Surniculus lugubris (Horsf.) . . . Sikkim.
Hierococcyx sparveroides (Vig.) . Assam.
„ varius (Vahl) . . . Ostindien.
„ fugax (Horsf.) . . . . Japan.
Cuculus micropterus Gould . . . . Sikkim.
„ gularis Steph. . . . . Kapland.
„ canorus L. . . . . Deutschland.
„ saturatus Hodgs. . . . . Japan.
„ poliocephalus Lath. . . . . Madagascar, Japan.
„ solitarius Steph. . . . Massailand.
„ clamosus Lath. . . . . Transvaal.
„ pallidus (Lath.) . . . Australien.
Cacomantis flabelliformis (Lath.) . . . . . Tasmanien.
„ merulinus (Scop.) . . . Java.
„ variolosus (Horsf.) . . . Neu-Süd-Wales.
„ insperatus Gould, Malakka, Neu-Guinea.
„ castaneiventris Gould . . . . . Queensland.
„ bronzinus (Gray) . . . . Neu-Caledonien.
„ simus (Peale) . . . Viti-Inseln.
„ passerinus (Vahl), Süd-Indien.
Mesocalius palliolatus (Lath.) . . . Nord-Australien.
Chrysococcyx klaasi (Steph.), Ost- u. Süd-Afrika.
„ cupreus (Bodd.) . . . Ladó.
Chalcococcyx maculatus (Gm.) . . Sikkim.
„ basalis (Horsf.) . Australien.
„ lucidus (Gm.) . . Australien.
„ plagosus (Lath.), Australien.
Coccyzus minor (Gm.) . . . . . Florida.
„ maynardi (Ridgw.) . . Jamaica.
„ melanocoryphus V. . Argentina.
„ americanus (L.), Nord-Amerika.
„ occidentalis Ridgw. . . Westl. Nord-Amerika.

Coccyzus erythrophthalmus (Wils.) . . . . . Nord-Amerika.
„ cinereus (Vieill.) . . Argentina.
Eudynamis honorata (L.) . . . . Ostindien.
„ cyanocephala (Lath.) . . . . . Kap York.
Scythrops novae-hollandiae Lath., Celebes.
Centropus ateralbus Less., Neu-Hannover.
„ bernsteini Schl. . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ spilopterus Gray . . Key-Inseln.
„ nigricans (Salvad.), Neu-Guinea.
„ phasianus (Lath.) . Australien.
„ chlororhynchus Blyth, Ceylon.
„ rectunguis Strickl. . Malakka.
„ sinensis (Steph.) . . Ostindien, China.
„ viridis (Scop.) . . . Philippinen.
„ toulou (Müll.) . . Madagascar.
„ bengalensis (Gm.) . . . Ostindien, Formosa.
„ javanicus (Dumont) . . Celebes.
„ monachus Ruepp. . Mikindani.
„ senegalensis (L.) . . . Senegal.
„ burchelli (Sws.) . . . Kapland.
„ superciliosus H. & E. . . . . Ost-Afrika.
„ melanops Less. . . . Mindanao.
„ andamanensis Beavan. . . . Andaman-Inseln.
Saurothera vetula L. . . . . Jamaica.
„ merlini d'Orb. . . . . Cuba.
„ vieilloti Bp. . . . Puerto Rico.
Piaya cayana (L.) . . . . Südost-Brasilien.
„ melanogaster (V.) . . . Amazonia.
Zanclostomus javanicus (Horsf.) . . Java.
Taccocua leschenaulti Less. . . . Assam.
Rhopodytes viridirostris (Jerd.) . Assam.
„ tristis (Less.) . . . Himalaya.
„ borneensis Shp. . . . Nordwest-Borneo.
„ diardi Less. . . . . Malakka.
Phoenicophaïs pyrrhocephalus (Forst.) . . . . . Ceylon.
Rhinococcyx curvirostris (S. & N.) . Java.
Ceuthmochares australis Shp., Ost-Afrika.
Coua caerulea (L.) . . . . . C. Madagascar.
„ raynaudi Puch. . . . . Madagascar.
„ cristata (L.) . . . . . Madagascar.
Coua coquerelli Grand. . W. Madagascar.
Geococcyx mexicanus (Gm.), Kalifornien.
„ affinis Hartl. . . . . Yucatan.
Crotophaga major Gm. . . . . Amazonia.
„ ani L. . . Cuba, Süd-Amerika.
„ sulcirostris Sws. . . . Nicaragua, Yucatan.
Guira guira (Gm.) . . . . . Brasilien.

Fam. Indicatoridae.

Indicator indicator (Gm.), Südost-Afrika.
minor Steph. . . . . Kapkolonie.

Fam. Capitonidae.

Lybius torquatus (Dumont) . . Transvaal.
Burbatula pusilla (Dumont) . . Transvaal.
„ affinis Reichn. . . . Daressalem.
„ bilineata Reichn. . . Mikindani.
Megalaema marshallorum Swinh., Sikkim.
Chotorhea corvina (Temm.) . . . . . Java.
„ javensis (Horsf.) . . . . Java.
„ chrysopogon (Temm.), Sumatra.
Cyanops asiatica (Lath.) . . . . Ostindien.
„ rubescens Baker . . Nord-Cachar.
„ armillaris (Temm.) . . . . Java.
„ franklini (Blyth) . . . . Sikkim.
„ ramsayi (Wald.) . . . . . Assam.
Thereiceryx zeylonicus (Gm.) . . . Ceylon, Ostindien.
„ lineatus (V.) . . . . Assam.
„ viridis (Bodd.) . . . Ostindien.
Mesobucco cyanotis (Blyth) . . . Assam.
Xantholaema haemotocephalum (Müll.) . . . . . Ostindien.
„ rubricapillum (Gm.), Ceylon.
„ malabaricum (Blyth) . . . . . Ostindien.
„ roseum (Dumont) . . Java.

Fam. Rhamphastidae.

Rhamphastos ariel Vig., Südost-Brasilien.
Andigena bailloni (Vieill.) . Rio Grande.
Pteroglossus flavirostris Fraser . . . Peru.

Fam. Galbulidae.

Galbula ruficauda Cuv. . . . . Venezuela.
„ melanogenia Scl. . . . Guatemala.

Fam. Bucconidae.

Bucco maculatus (Gm.) . . . . Argentina.
„ chacuru V. . . . . Paraguay.

Malacoptila torquata (Hahn & K.), Südost-Brasilien.
„ panamensis Lafr., Costa Rica.
Nonnula rubecula (Spix) . . Rio Grande.
Monasa nigrifrons (Spix) . . . . . Peru.
Chelidoptera tenebrosa (Pall.) . . . Peru.

Fam. Picidae.

Geocolaptes olivaceus (Gm.) . . Kapland.
Colaptes auratus (L.). . . Südöstl. Nord-Amerika.
„ luteus Bangs . . . . . Kanada.
„ chrysocaulosus Gould. . . Cuba.
„ chrysoides (Malh.), Kalifornien.
„ mexicanus Sws. . . . . Mexiko.
„ collaris Vig. . . . . Kalifornien.
„ saturatior Ridgw. . . . Britisch Columbien.
„ ayresi Audub. . . . . Kalifornien.
„ campestris (Vieill.) . . Brasilien.
„ agricola (Malh.) . Süd-Brasilien.
„ pitius (Mol.) . . . . . Chile.
Gecinus viridis (L.) . . . . . Deutschland.
„ sharpei Saunders . . . . Spanien.
„ vaillanti (Malh.) . . . . Marokko.
„ awokera (Temm.) . . . . . Japan.
„ squamatus (Vig.) . . . Ostindien.
„ gorii Hargitt . . . Ost-Turkestan.
„ striolatus (Blyth) . . . Ostindien.
„ canus (Gm.) . . . . Deutschland.
„ guerini (Malh.) . . . . . China.
„ hainanus Og. Grant . . . Heinan.
„ occipitalis (Vig.) . . . . . Pegu.
„ chlorolophus (Vieill.) . . Sikkim.
„ chlorogaster (Jerd.), Süd-Indien.
„ puniceus (Horsf.) . . . . . Java.
Chloronerpes erythropsis (V.), Rio Grande.
„ aurulentus (Temm) . . . . Rio Grande.
„ yucatanensis (Cabot) . . . . . Chiriqui.
„ rubiginosus (Sws.) . . . . . Venezuela.
Chrysoptilus melanochlorus (Gm.) . . . . . Rio Grande.
„ cristatus (V.) . . Argentina.
Chrysophlegma flavinucha (Gould) . . . . . Himalaya.
Gecinulus grantia (Mc Clell.) . . Assam.
Asyndesmus torquatus (Wils.). . . . Nord-Amerika.
Melanerpes erythrocephalus (L.) . . . . . Nord-Amerika.
„ formicivorus (Sws.), Mexiko.
„ melanopogon (Temm.) . . . . . Kalifornien.
„ cruentatus (Bodd.). . . Peru.
„ portoricensis (Daud.). . . . . Puerto Rico.
„ cactorum (Lafr. & d'Orb.) . Argentina.
„ superciliaris (Temm.) . Cuba.
„ carolinus (L.) . . . . Florida.
„ dubius (Cabot) . . . Yucatan.
„ aurifrons (Wagl.) . . Mexiko.
„ santacruzi (Bp.) . . Honduras.
„ uropygialis (Baird). . Mexiko.
„ elegans (Sws.) . . . . Mexiko.
Sphyropicus varius (L.) . . Nord-Amerika.
„ ruber (Gm.) . Nord-Amerika.
„ thyroideus (Cass.), Colorado.
Hypopicus hyperythrus (Vig.), Himalaya.
Dendrocopus major (L.) . . Deutschland, Amur.
„ cissa (Pall.) . . Ost-Sibirien.
„ poelzami (Bogd.), Kaukasus.
„ leucopterus (Salvad.) . . . . . Baikalsee.
„ japonicus (Seebohm) . Japan.
„ mauritanus (Brehm). . . . . Marokko.
„ himalayensis (J. & S.) . . . . . Kaschmir.
„ darjilensis (Blyth) . Assam.
„ cathpharius (Blyth) . . . . . Darjiling.
„ syriacus (H. & E.), Smyrna.
„ scindeanus (H. & M.), Nordwest Indien.
„ villosus (L.), Nord-Amerika.
„ harrisi (Audub.), Kalifornien.
„ jardinei (Malh.) . Honduras.
„ pubescens (L.) . . . . . Nord-Amerika.
„ meridionalis (Oberh.) . . . . . New York.
„ gairdneri (Aud.), Kalifornien.
„ nuttalli (Gamb.), Kalifornien.
„ scalaris (Wagl.) . . . Texas.

Dendrocopus borealis (Vieill) . . . Texas.
„ minor (L.) . . Deutschland, Amur.
„ pipra (Pall.) . Insel Ascold.
„ quadrifasciatus (Radde) . . . . . Kaukasus.
„ lignarius (Mol.) . . . Chile.
„ mixtus (Bodd.) . Argentina.
„ macei (Vieill.) . . Ostindien.
„ atratus (Blyth) . . . Assam.
„ auriceps (Vig.) . . . Nordwest-Indien.
„ analis (Horsf.) . . . . Java.
„ andamanensis (Blyth) . . . . Andamanen.
„ leuconotus (Bechst.), Schweden, Amur.
„ cirris (Pall.) . . . . . Altai.
„ lilfordi (Shp. & Dresser) . Nord-Persien.
Picoides tridactylus (L.) . . . . Schweiz.
„ septentrionalis Brehm., Schweden.
„ crissoleucus (Bp.) . . . . . Amur.
„ labradorius Bangs . . . Labrador.
„ americanus Brehm, Aleuten-Insel.
„ arcticus (Sws.) . . Nord-Kanada.
Xenopicus albolarvatus (Cass.) . . . . . Kalifornien.
Dendrocoptes medius (L.) . Deutschland.
Liopicus mahrattensis (Lath.), Ostindien.
Thripias namaquus (Licht.) . . . Namaqua.
Iyngipicus semicoronatus (Malh.), Assam.
„ doerriesi Hargitt, Insel Ascold.
„ kalaensis (Swinh.) . . Hainan.
„ pygmaeus (Vig.) . . . Assam.
„ kizuki (Temm.) . . . . . Japan.
„ seebohmi Hargitt . . . . Japan.
„ nigrescens Seeb. . . . . Japan.
„ canicapillus (Blyth) . . . . . Nord-Cachar.
„ auritus (Gm.) . . . . Sumatra.
„ hardwickei (Jerd.) . Bengalen.
Xiphidiopicus percussus (Temm.) . Cuba.
Pyrrhopicus pyrrhotis (Hodgs.) . Assam.
Miglyptes tukki (Less.) . . . . Malakka.
Micropternus phaeoceps Blyth, Ostindien.
„ brachyurus (V.) . . . Perak.
„ gularis Jerd. . . Süd-Indien.
Brachypternus aurantius (L.), Ostindien.
Tiga javanensis (Ljung) . . . . . Pegu.
„ shorii (Vig.) . . . . . Assam.
Nesoceleus fernandinae (Vig.) . . . Cuba.
Celeus flavescens (Gm.), Südost-Brasilien.
Chrysocolaptes gutticristatus (Tick.) . . . . . Assam.
Campophilus principalis (L.) . . . Oregon.
„ leucopogon (Valenc.) . . . . Argentina.
„ robustus (Licht.) . . Südost-Brasilien.
Hemicercus canente (Less.) . . . Himalaya.
Alophonerpes pulverulentus (T) . . . . . Tenasserim.
Ceophloeus scapularis (Vig.) . . . Mexiko.
Dryotomus pileatus (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ abieticola (Bangs) . . . . Neu-Hemshire.
Picus martius (L.) . . . . . Schweden.
Picumnus temmincki Lafr. . . . . Südost-Brasilien.
„ cirrhatus (T.) . . Rio Grande.
„ orbignyanus Lafr. . Argentina.
„ innominatus Burton . . Sikkim.
„ chinensis (Hargitt) . . . China.
Sasia ochracea Hodgs. . . . . Sikkim.
„ abnormis (Temm.) . . . . . Java.
Iynx torquilla (L.) . . . . . Deutschland.
„ ruficollis Wagl. . . . . Kapland.

Fam. Eurylaemidae.

Calyptomena viridis Raffl. . . . Malakka.
Psarisomus dalhousiae (Jameson), Assam.
Serilophus lunatus (Gould) . . . . . Pegu.
„ rubropygius (Hodgs.), Assam.
Eurylaemus javanicus Horsf. . Malakka.
Corydon sumatranus (Raffl.) . . Malakka.
Cymborhynchus malaccensis Salvad., Borneo, Malakka.

Fam. Menuridae.

Menura superba Davies, Neu-Süd-Wales.
„ victoriae Gould . . . . . Victoria.

Fam. Pteroptochidae.

Scytalopus magellanicus (Gm.) . . . Chile.
„ griseicollis (Lafr.), Venezuela.
„ indigoticus (Pz. W.) . . Südost-Brasilien.

Pteroptochus rubecula Kittl. . . . . Chile.
„ albicollis Kittl. . . . . Chile.
Hylactes tarnii King . . . . . Chile.

Fam. Conopophagidae.

Conopophaga lineata (Pz. W.), Südost-Brasilien.
„ nigrigenys Less. . . . Südost-Brasilien.

Fam. Formicariidae.

Batara cinerea (Vieill.), Südost-Brasilien.
Thamnophilus guttatus V., Süd-Brasilien.
„ transandeanus Scl. . . . . Columbien.
„ melanurus Gould . . . Peru, Ecuador.
„ major Vieill. . Argentina.
„ murinus Pelz. . . Ost-Peru.
„ naevius (Gm.) . . Südost-Brasilien.
„ albiventris Tacz. . . Peru.
„ ruficollis Spix . Amazonia.
„ caerulescens Vieill. . . Südost-Brasilien.
„ gilvicollis Pelz., Rio Grande.
„ ambiguus Sws. . . . Südost-Brasilien.
„ cirrhatus (Gm.) . Surinam.
„ doliatus (L.) . Chiriqui, Yucatan.
„ subradiatus Berl. . . Peru.
„ radiatus Vieill., Paraguay.
„ berlepschi Tacz. . . . . West-Ecuador.
„ palliatus (Licht.), Südost-Brasilien.
„ ruficapillus Vieill. . . Südost-Brasilien.
Pygoptila margaritata (Scl.) . . . . Peru.
Dysithamnus guttulatus (Licht.) . . Südost-Brasilien.
„ mentalis (Temm.) . Südost-Brasilien.
„ semicinereus Scl., Columbien.
„ ardesiacus S. & S., Amazonia.
Myrmotherula surinamensis (Gm.) . . . . . Columbien.
„ gularis (Spix) . . Südost-Brasilien.
„ ménétriesi (d'Orb.) . Peru.
Myrmotherula hauxwelli (Scl.), Amazonia.
„ unicolor (Ménétr.), Südost-Brasilien.
Formicivora ferruginea (Licht.) . . . Südost-Brasilien.
„ striata (Spix), Südost-Brasilien.
„ squamata (Licht.) . . . Südost-Brasilien.
Rhamphocaenus melanurus V. . . . Südost-Brasilien.
„ rufiventris (Bp.) . . . . . Guatemala.
Cercomacra caerulescens (V.) . . . . . Südost-Brasilien.
„ tyrannina (Scl) . . Honduras.
Pyriglena leucoptera (V.) . . . . Brasilien.
„ atra (Sws.) . . . . . Amazonia.
Drymophila squamosa Pelz. . . . . Südost-Brasilien.
Formicarius colma (Gm.), Südost-Brasilien.
„ destructus Hart. . . Ecuador.
„ moniliger Scl. . . Guatemala.
Chamaeza brevicauda (Vieill.) . . . . Südost-Brasilien.
„ olivacea Tsch. . . . . Bolivien.
Grallaria guatemalensis Prév., Guatemala.
„ imperator Lafr. . . . Rio Grande.
„ nigrolineata Berl. . . Venezuela.

Fam. Dendrocolaptidae.

Geositta cunicularia (Vieill.) . Argentina.
Furnarius rufus (Gm.) . . Süd-Brasilien.
„ albigularis (Spix) . . Bolivien.
„ figulus (Licht.) . . . Brasilien.
„ cristatus Burm. . . Argentina.
„ leucopus Sws. . . . . Oberer Amzonas.
„ agnatus Scl. & Salv., Columbien.
„ minor Pelz., Oberer Amazonas.
„ torridus Scl. & Salv., Amazonia.
„ cinnamomeus (Less.) . . Peru.
Upucerthia dumetoria Geoffr. & d'Orb. . . Patagonien.
Cinclodes nigrifumosus (d'Orb. & Lafr.) . . . . . Chile.
„ patagonicus (Gm.) . Süd-Chile.
„ fuscus (Vieill.) . . . Argentina.
„ antarcticus (Garn.) . . . . Falklands-Inseln.
Henicornis melanura Gray . . . . . Chile.

Lochmias nematura (Licht.) . . . . Südost-Brasilien.
Aphrastura spinicauda (Gm.) . . . . Chile.
Sylviorthorhynchus desmursi Gay . Chile.
Phloeocryptes melanops (Vieill.) . . Süd-Brasilien.
Leptasthenura aegithaloides (Kittl.), Chile.
„ platensis Reichb. . . . . Argentina.
„ setaria (Temm.) . . . . Rio Grande.
Synallaxis ruficapilla Vieill. . . Brasilien.
„ frontalis Pelz., Columbien, Peru.
„ superciliosa Cab. . . Argentina.
„ spixi Scl., Rio Grande, Argentina.
„ albescens Temm. . Columbien.
„ pudica Scl. . . . . Columbien, Ecuador.
„ guianensis (Gm.) . . Surinam.
„ cinerascens (Temm.) . . . Südost-Brasilien.
„ cinnamomea (Gm.) . . Brasilien, Guayana.
„ castanea Scl. . . . . Venezuela.
„ terrestris Jard. . . Venezuela.
„ torquata Pz. W. . . . . Peru.
„ gularis Lafr. . . . . Venezuela.
„ phryganophila (V.), Argentina.
Siptornis pallida (Pz. W.) . Rio Grande.
„ striaticeps (d'O. & Lafr.) . . . . Argentina.
„ heterocerca Berl. & L. . . . . Argentina.
„ humicola (Kittl.) . . . . . Chile.
„ sordida (Less.) . . . Patagonien.
„ sulphurifera (Burm.), Argentina.
„ anthoides (King) . . . . . Chile.
„ hudsoni (Scl.) . . . . Argentina.
Coryphistera alaudina Burm. . Argentina.
Anumbius acuticaudatus (Less.), Argentina.
Thryolegus curvirostris (Gould) . . . . . Argentina.
Phacelodomus ruber (Vieill.) . Argentina.
„ rufifrons (Pz. W.) . . . . Argentina.
„ inornatus Ridgw. . . . . Venezuela.
„ sibilatrix Scl. . Argentina.
„ striaticollis (d'Orb & Lafr.), Argentina.
Thripophaga sclateri Berl., Süd-Brasilien.
Pseudosizura lophotes Reichb., Argentina.
Automolus holostictus S. & S., Columbien.
„ rufobrunneus (Lawr.) . . . . . Costa Rica.
„ rubiginosus (Scl.) . . . Mexiko.
„ leucophthalmus (Pz. W.) . . . Südost-Brasilien.
Philydor atricapillus (Pz. W.) . . . . Südost-Brasilien.
„ rufus (Vieill.), Südost-Brasilien.
„ columbianus Cab. & H. . . . . Venezuela.
Sclerurus umbretta (Licht.), Rio Grande.
Margarornis perlata (Less.), Venezuela.
Premnoplex brunnescens Scl., Columbien.
Dendrocichla anabatina Scl. . . Yucatan.
„ meruloides (Lafr.) . . . . . Venezuela.
Sittasomus chapadensis Ridgw., Argentina.
Dendrornis erythropygia Scl. . . . . West-Ecuador.
Picolaptes souleyeti (Des Murs) . . West-Ecuador.
„ angustirostris (V.), Argentina.
Drymornis bridgesi (Eyton) . Argentina.

Fam. Tyrannidae.

Agriornis maritima d'Orb. & Lafr., Chile.
Taenioptera nengeta (L.) . . Argentina.
„ coronata (Veiell.), Argentina.
„ velata (Licht.) . . . Bolivien.
„ dominicata (V.) . . . . . Südost-Brasilien.
„ irupero (V.) . . . Argentina.
„ pyrope (Kittl) . . . . . Chile.
Ochthoeca fumicolor Scl. . . . Columbien.
„ superciliosa S. & S., Venezuela.
Fluvicola pica (Bodd.) . . . . . Guayana.
„ albiventris (Spix) . . Argentina.
„ atripennis Scl. . . . . Ecuador.
Arundinicola leucocephala (L.), Brasilien.
Alectrurus risorius (Vieill.) . . Argentina.
Sisopygis icterophrys (Vieill.) . . . . Südost-Brasilien.
Cnipolegus comatus (Licht.) . . Paraguay.
„ anthracinus Heine, Argentina.
Lichenops perspicillata (Gm.) . . . . . Südost-Brasilien.
Copurus colonus (Vieill.) . . . . Brasilien.

Machetornis rixosa (V.), Brasilien, Bolivien.
Muscisaxicola macloviana (Garn.) . . . . . Patagonien.
„ maculirostris d'Orb. & Lafr. . . . . Chile.
Centrites niger (Bodd.) . . . . . Chile.
„ oreas Scl. & Salv. . . . . Peru.
Platyrhynchus mystaceus (V.) . . . Südost-Brasilien.
„ superciliaris Lawr. . . . . Chiriqui.
Rhynchocyclus olivaceus (Temm.) . . . . Brasilien.
„ sulphurescens (Spix) . . Südost-Brasilien.
„ cinereiceps (Scl.), Veragua.
„ flaviventris (Pz. W.) . . . Columbien.
Todirostrum cinereum (L.), Central-u. Süd-Amerika.
„ poliocephalum (Pz. W.) . . Südost-Brasilien.
„ nigriceps Scl. . . Columbien.
„ maculatum (V.) . . Surinam.
„ schistaceiceps (Scl.), Chiriqui.
Oncostoma cinereigulare (Scl.), Yucatan.
Euscarthmus margaritaceiventer (d'O. & Lafr.) . . Argentina.
„ orbitatus Pz. W. . . Südost-Brasilien.
„ gularis (Temm.) . . Südost-Brasilien.
„ striaticollis (Lafr.) . . . . . Amazonia.
Lophotriccus squamicristatus (Lafr.), Peru.
Orchilus auricularis (V.), Südost-Brasilien.
Phylloscartes ventralis (T.) . . . . Südost-Brasilien.
Hapalocercus flaviventris (d'O. & Lafr.) . Argentina.
Culicivora stenura (Temm) . . Argentina.
Stigmatura budytoides (d'O. & Lafr.) . . . Argentina.
Serphophaga subcristata (V.) . . . . Südost-Brasilien.
„ munda Berl. . . Argentina.
„ grisea Lawr. . . . Veragua.
„ cinerea (Strickl.), Venezuela.
„ nigricans (V.), Süd-Brasilien.
Anaeretes parulus (Kittl.) . . . . . Chile.
Cyanotis rubrigaster (Vieill.) . . . . Chile.
Mionectes oleaginus (Licht.) . Amazonia.
„ rufiventris Cab. . . . . Südost-Brasilien.
Leptopogon amaurocephalus Cab. . . . . Ost-Peru.
Myiopagis placens Scl. . . . . Veragua.
Myiopatis tumbezana (Tacz.) . . . . Peru.
Ornithion pusillum (Cab. & Heine) . . . Südost-Brasilien.
„ cinerascens Pz. W., Argentina.
Elainea pagana (Licht.), Central- u. Süd-Amerika.
„ martinica (L.) . . . . . Grenada.
„ albiceps (d'Orb. & Lafr.) . Chile.
„ frantzii Lawr. . . . . Columbien.
„ obscura (Lafr. & d'Oro.) . . . . Südost-Brasilien.
„ mesoleuca (Cab. & Heine) . . . . Südost-Brasilien.
„ affinis Burm. . . Südost-Brasilien.
Empidagra suiriri (Vieill.) . . Argentina.
Legatus albicollis (Vieill.) . . Guatemala.
Sublegatus arenarum Salvin. . Venezuela.
„ platyrhynchus (Scl. & S.) . . . . Argentina.
Myiozetetes erythropterus (Lafr.) . . . Südost-Brasilien.
„ cayennensis (L.) . . Surinam.
„ similis (Spix) . . . Yucatan.
„ granadensis Lawr. . . Chiriqui.
Pitangus derbianus (Kaup) . . . . Mexiko.
„ rufipennis (Lafr.) . . . Trinidad.
„ sulphuratus (L.) . . . Amazonia.
„ maximiliani (Cab. & Heine) . . Süd-Bralien.
„ bolivianus (Lafr.) . . Argentina.
„ lictor (Cab.) . . . . . Surinam.
„ caudifasciatus (d'Orb.) . . . . . Cuba, Jamaica.
„ taylori Scl. . . . . Puerto Rico.
Myiodynastes luteiventer Bp. . Yucatan.
„ audax (Gm.) . . Venezuela.
„ solitarius (Vieill.) . Südost-Brasilien.
„ bairdi (Gamb.) . . . Peru.
Megarhynchus pitangua (L.), Costa Rica.
Onychorhynchus swainsoni Pelz. . . . . Costa Rica.
„ mexicanus Scl., Yucatan.

Hirundinea bellicosa (Vieill.) . . . . Süd-Brasilien.
Myiobius xanthopygus (Spix) . . . . . Südost-Brasilien.
„ sulphureipygius (Scl.), Chiriqui.
„ cinnamomeus (d'Orb. & Lafr.) . . . . . Bolivien.
„ flavicans Scl. . . . . Venezuela.
„ naevius (Bodd.) . . . Brasilien.
Pyrocephalus rubineus (Bodd.) . . . Süd-Brasilien.
„ mexicanus Scl. . . . Mexiko.
„ dubius Gould . . Galapagos-Inseln.
„ obscurus Gould, West-Peru.
Empidochanes fuscatus (Pz. W.), Südost-Brasilien.
Sayornis phoebe (Lath.) . . . Östl. Nord-Amerika
„ saya (Bp.) . . . . . Mexiko.
„ nigricans (Sws.) . . . . . Mexiko.
„ semiatra (Vig.) . . Kalifornien.
„ aquatica S. & S. . . Costa Rica.
„ cineracea (Lafr.) . . Venezuela.
Empidonax bimaculatus (d'Orb. & Lafr.) . . . . Süd-Brasilien.
„ pusillus (Sws. & Rich.), Westl. Nord-Amerika.
„ alnorum Brewst. . Östl. Nord-Amerika.
„ minimus (Baird.) . . . . Nord-Amerika.
„ virescens Vieill. . . Östl. Nord-Amerika.
„ flaviventris (Baird) . Östl. Nord-Amerika.
„ difficilis Baird . . Kalifornien.
„ salvini Ridgw. . . Guatemala.
„ flavescens Lawr. . Costa Rica.
„ hammondi (De Vesey) . . . Kalifornien.
„ atriceps Salv. . . . Costa Rica.
Nuttallornis borealis (Sws.), Nord-Amerika.
Horizopus virens (L.), Östl Nord-Amerika.
„ richardsoni (Sws.), Nord- und Central-Amerika.
Blacicus caribaeus (d'Orb.) . . . . . Cuba.
„ brunneicapillus Lawr., Dominica.
„ brachytarsus (Scl.) . Guatemala.
Myiarchus crinitus (L.) . . Nord-Amerika.
Myiarchus cinerascens (Lawr.) . . . . . Kalifornien.
„ mexicanus (Kaup) . Yucatan.
„ tyrannulus (Müll.) . . . Peru.
„ oberi Lawr. . . Insel Grenada.
„ ferox (Gm.) . . . . Argentina.
„ lawrencei (Giraud) . Yucatan.
„ nigricapillus Ridgw., Costa Rica.
„ dominicensis (Bryant) . . . . . S. Domingo.
„ stolidus (Gosse) . . . Jamaica.
„ antillarum (Bryant) . . . . . Puerto Rico.
Empidonomus varius (Vieill.) . Südost-Brasilien.
„ inca (Scl.) . . . Argentina.
Tyrannus tyrannus (L.) . Nord-Amerika.
„ verticalis Say . . . Westl. Nord-Amerika.
„ vociferans Sws. . . . Arizona.
„ niveigularis Scl. . . . Ecuador.
„ crassirostris Sws. . . . Mexiko.
„ dominicensis (Gm.) . Antillen.
„ rostratus Scl. . . Insel Grenada.
„ cubensis Richm. . . . . Cuba.
„ melancholicus V. . . Central- u. Süd-Amerika.
„ albigularis Burm. . . . . Südost-Brasilien.
Muscivora tyrannus (L.) . Süd-Amerika.
„ forficatus (Gm.) . . . . . Texas.

Fam. Oxyrhamphidae.

Fam. Pipridae.

Cirrhopipra filicauda (Spix) . . Venezuela.
Antilophia galeata (Licht.) . . . Südost-Brasilien.
Pipra mentalis Scl. . . . . Guatemala.
„ auricapilla L. . . . . Amazonia.
Machaeropterus striolatus (Bp.), Columbien.
Chiroxiphia pareola (L.) . . . . Brasilien.
„ lanceolata (Wagl.), Venezuela.
„ caudata (Shaw) . . . Südost-Brasilien.
Manacus manacus (L.) . . . . . Peru.
„ gutturosus (Desm.) . . . Südost-Brasilien.
Scotothorus virescens (Pz. W.) . . Südost-Brasilien.

Fam. Cotingidae.

Tityra brasiliensis (Sws.) . . . . . Südost-Brasilien.
Platypsaris atricapillus (V.) . . . . . Südost-Brasilien.
„ albiventris Lawr. . . Mexiko.
„ aglaiae (Lafr.) . . . Yucatan.
Pachyrhamphus viridis (V.), Süd-Brasilien.
„ cinereus (Bodd.), Surinam.
„ rufus (Bodd.), Südost-Brasilien.
„ niger Spix . . Amazonia.
„ polychropterus (V.) . . Südost-Brasilien.
„ atricapillus (Gm.) . . . . . Brasilien.
Attila citriniventris Scl. . . . Amazonia.
Xenopsaris albinucha (Burm.), Argentina.
Rupicola sanguinolenta Gould, Columbien.
Phibalura flavirostris Vieill. . . . . Südost-Brasilien.
Ampelion cucullatus (Sws.) . . . . . Südost-Brasilien.
Pyroderus orenocensis (Lafr.), Columbien.

Fam. Phytotomidae.

Phytotoma rara Mol. . . . . Chile.
„ angustirostris Lafr. & d'Orb. . . . . Peru.
„ rutila Vieill. . . . Argentina.

Fam. Pittidae.

Hydrornis nipalensis (Hodgs.), Himalaya.
„ oatesi Hume . . . Tenasserim.
Pitta caerulea (Raffl.) . . . . . Sumatra.
„ cyanea Blyth . . . . . Assam.
„ cyanoptera Temm. . . . . Pegu.
„ brachyura (L.) . . . . . Ostindien.
„ vigorsi Gould . . . . . Insel Babber.
„ strepitans Temm. . . . . Kap York.
„ venusta S. Müll. . . . . Sumatra.
„ erythrogaster Temm. . . Philippinen.
„ propinqua Shp. . . . . Palawan.
„ rufiventris (Cab. & Heine) . . . . . Halmahera.
„ celebensis Westerm. . . . . Celebes.
„ mackloti Temm. . . . . Waigiu, Neu-Guinea.
„ novae-hiberniae Ramsay . . . . . Neu-Irland.
Pitta atricapilla Less. . . . . Palawan.
„ muelleri Bp. . . Insel Labuan, Java.
„ novae-guineae M. & Schl., Aru-Inseln.
„ forsteni M. & Schl . . . . . Celebes.
„ cucullata Hartl. . . . . Assam.
„ iris Gould . . . . . Queensland.
Eucichla cyanura (Bodd.) . . . . . Java.
„ boschi Müll. & Schl., Sumatra.

Fam. Philepittidae.

Philepitta jala (Bodd.) . . . Madagascar.

Fam. Xenicidae.

Acanthidositta chloris (Sparrm.) . . Neu-Seeland.

Fam. Atrichornithidae.

Fam. Hirundinidae.

Chelidonaria urbica (L.) . . Deutschland.
„ cashmiriensis (Gould) . . . . . Kaschmir.
„ dasypus (Bp.) . . . . . Japan.
„ lagopus (Pall.) . Kuku-Nor.
„ nipalensis (Moore), Himalaya.
Clivicola riparia (L.) . . . . Deutschland.
„ paludicola (V.) . . . Süd-Afrika.
„ sinensis (Gray) . . . . . Assam.
Ptyonoprogne rupestris (Scop.) . . . Griechenland.
„ obsoleta (Cab.) . . . Beludschistan.
„ fuligula (Licht.) . . . Süd-Afrika.
„ concolor (Sykes), Ostindien.
Tachycineta albiventris (Bodd.) . . . . . Columbien.
„ leucorrhous (V.) . . Süd-Brasilien, Chile.
„ albilinea (Lawr.), Honduras.
„ meyeni (Cab.) . . . Uruguay.
„ bicolor (Vieill.) . . . Nord-Amerika.
„ thalassinus (Sws.) . . . . . Kalifornien.
Phedina madagascariensis Hartl. . . . . Madagascar.
Hirundo rustica L. . . . . Deutschland.
„ gutturalis Scop. . . . . Sibirien.
„ savignii Steph. . . . Aegypten.

Hirundo erythrogaster Bodd. . . . . Nord-Amerika.
„ tytleri Jerd. . . . Ost-Turkestan.
„ tahitica Gm. . . . . Viti-Inseln.
„ javanica Sparrm., Borneo, Celebes.
„ arcticincta Shp. . . . . Uganda.
„ neoxena Gould . . . Australien.
„ albigularis Strickl. . Transvaal.
„ dimidiata Sundev. . . Süd-Afrika.
„ nigrita Gray . . . . . Kamerun.
„ smithi Leach, Südost-Afrika, Ostindien.
„ griseopyga Sundev., West-Afrika.
„ cucullata Bodd. . . . Süd-Afrika.
„ puella T. & Schl. . Massailand, Senegal.
„ rufula Temm. . Olymp, Smyrna.
„ daurica L. . . . . Daurien.
„ nipalensis Hodgs. . . . . China.
„ striolata Boie . . . . . Assam.
„ erythropygia Sykes . . Ostindien.
„ badia Cass. . . . . Malakka.
„ semirufa Sundev. . . Transvaal.
Cheramoeca leucosternum (Gould). . . . . Australien.
Progne purpurea (L.) . . . Nord-Amerika.
„ cryptoleuca Baird, Bahama-Inseln.
„ dominicensis (Gm.) . Puerto Rico.
„ domestica (Vieill.) . . Argentina.
„ chalybea (Gm.) . . . . Guatemala.
„ tapera (L.) . . . . . Süd-Amerika.
Atticora fasciata (Gm.) . . . . Amazonia.
„ cinerea (Gm.) . . . . . Peru.
„ melanoleuca Pz. W. . . Brasilien.
„ cyanoleuca (V.) . . . Venezuela.
„ pileata Gould . . . . Guatemala.
„ fucata (Temm.), Südost-Brasilien.
Lecythoplastes preussi Reichn., Kamerun.
Petrochelidon nigricans (V.) . Australien.
„ pyrrhonota (V.), N.-Amerika.
„ swainsoni Scl. . . Yucatan.
„ fulva (Vieill.), Cuba, Puerto Rico.
„ spilodera (Sundev.) . . . Süd-Afrika.
„ ariel (Gould), S.-Australien.
„ fluvicola (Blyth), Ostindien.
Psalidoprocne holomelaena (Sundev.) . . . Kapkolonie.
Psalidoprocne nitens (Cass.) . . . Elfenbeinküste.
Stelgidopteryx serripennis (Aud.) . . . Nord-Amerika.
„ ruficollis (Vieill.), Brasilien.
„ uropygialis Lawr., Chiriqui.

Fam. Muscicapidae.

Hemichelidon sibirica (Gm.) . . . Sibirien.
„ fuliginosa Hodgs., Himalaya.
„ griseisticta (Swinh.) . . . . Ussuriland.
„ ferruginea Hodgs. . Assam.
Microeca fascinans (Lath.) . . Australien.
„ pallida De Vis . . . Queensland.
„ flaviventris Salvad. . . . Nord-Queensland.
Alseonax latirostris (Raffl.) . . Ost-Sibirien, Japan.
„ adusta (Boie) . . . . Pondoland.
„ muttui (Layard) . . . . Assam.
„ ruficauda (Sws.) . . . Kaschmir.
Bradyornis infuscatus (Smith), Süd-Afrika.
„ modesta Shelley . . . . Togo.
„ silens (Shaw) . . . Süd-Afrika.
Empidornis semipartita (Rüpp.) . . Ladó.
Newtonia brunneicauda Newton . . . . . Madagascar.
Muscicapa grisola (L.) . . . Deutschland.
„ sibirica Neum. . . . Nord-Mandschurei.
„ lugens (Hartl.) . West-Afrika.
Hedymela atricapilla (L.) . . Deutschland.
„ semitorquata (Homeyer) . . . . . Caspisee.
„ collaris (Bechst.) . . Süd-Deutschland.
Siphia parva (Bechst.) . . . Deutschland.
„ albicilla (Pall.) . . . Ost-Sibirien.
„ hyperythra Cab. . . . . Kaschmir.
Cyornis pallidipes (Jerd.) . . . Süd-Indien.
„ rubeculoides (Vig.) . . . Himalaya.
„ elegans (Temm.) . . . . Malakka.
„ tickelliae Blyth . . . . . Bengalen.
„ banyumas (Horsf.) . . . . . Java.
„ philippinensis (Shp.), Sulu-Inseln.
„ magnirostris Blyth . . . . Assam.
Digenea leucomelanura Hodgs., Kaschmir.
Anthipes moniliger (Hodgs.) . . . Sikkim.

Anthipes leucops Shp. . . . . Assam.
„ poliogenys Brooks. . . . Assam.
Niltava grandis (Blyth) . . . . . Himalaya.
„ sundara Hodgs. . . . . Himalaya.
„ macgrigoriae (Burton), Himalaya.
Petroeca leggei Shp. . . . Süd-Australien.
„ phoenicea Gould, Süd-Australien.
„ multicolor (Gm.), Norfolk-Inseln.
„ rhodinogastra (Drap.), Tasmanien.
„ rosea Gould . . Süd-Australien.
„ goodenovii (Vig. & H.) . . . . . Süd-Australien.
„ bicolor (Vig. & H.) . . . . . Süd-Australien.
„ bivittata De Vis. . Deutsch-Neu-Guinea.
„ toitoi (Garn.) . . . Neu-Seeland.
„ macrocephala (Gm.), Neu-Seeland.
„ vittata (Q. & G.) . . Tasmanien.
Poliomyias luteola (Pall.) . . Ost-Sibirien.
„ hodgsoni (Verr.) . . . Assam.
Muscicapula superciliaris (Jerd.) . . . . . Himalaya.
„ astigma (Hodgs.) . . Assam.
„ hyperythra (Blyth) . . Java, Himalaya.
„ sapphira (Blyth) . . Assam.
Smicrornis brevirostris (Gould), Australien.
„ flavescens Gould. . . . . West-Australien.
Gerygone albigularis Gould, Australien.
„ cinerascens Shp, Neu-Gninea.
Pseudogerygone igata (Q. & G.), Neu-Seeland.
„ modesta (Pelz.) . . Norfolk-Inseln.
„ culicivora (Gould), West-Australien.
„ magnirostris (Gould) . . . Kap York.
„ conspicillata (Gr.) Deutsch-Neu-Guinea.
„ flavilateralis (Gray), Neu-Caledonien.
„ fusca (Gould), Süd-Australien.
„ laevigastra (Gould) . . . Queensland.
„ ramuensis Reichn. Deutsch-Neu-Guinea.
Pseudogerygone chrysogaster (Gray) . . . . Aru-Inseln.
„ chloronota (Gould) . . . Queensland.
„ personata (Gould), Nord-Australien.
Muscylva lessoni Jacq. & Puch., Viti-Inseln.
Miro albifrons (Gm.) . . . . Neu-Seeland.
„ australis (Sparrm.) . . Neu-Seeland.
Metabolus rugensis Hombr. & J. . . . . Insel Ruk.
Heteromyias cinereifrons (Rams.) . . . N.-Queensland.
Poecilodryas cerviniventris (Gould) . . . . Queensland.
„ capito (Gould) . . Neu-Süd-Wales.
„ melanogenys Meyer, Deutsch-Neu-Guinea.
„ nana (Ramsay), Queensland.
Xanthopygia narcissina (Temm.), Japan.
„ xanthopygia (Hay) . . . . . Ost-Sibirien.
Cyanoptila bella (Hay) . . . Ost-Sibirien.
Ochromela nigrirufa (Jerd.), Süd-Indien.
Tarsiger chrysaeus Hodgs. . . . Himalaya.
Stenostira scita (Vieill.) . . . Süd-Afrika.
Polioptila caerulea (L.) . . Nord-Amerika.
„ lembeyi Gundl. . . . . Cuba.
„ dumicola (Vieill.) . Argentina.
„ sclateri Shp. . . . . Venezuela.
„ plumbea (Baird) . . Kalifornien.
„ californica Brewst. . . . Süd-Kalifornien.
„ bilineata (Bp.) . . . . . Chiriqui.
„ albiloris S. & S. . . Guatemala.
Parisoma subcaeruleum (V.), Kalifornien.
„ layardi Hartl. . . . . Süd-Afrika.
Chloropeta natalensis Smith . . . . Natal.
Batis capensis (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ molitor (Hahn & Küst.), Kapkolonie.
Hypothymis azurea (Bodd.) . . Himalaya.
„ occipitalis (Vig.) . Palawan.
Todopsis wallacei Gray . . . Deutsch-Neu-Guinea.
Chelidorhynx hypoxantha (Blyth) . . . . . Himalaya.
Rhipidura flabellifera (Gm.), Neu-Seeland.
„ albiscapa Gould, Süd-Australien.
„ pelzelni Gray, Norfolk-Inseln.

Rhipidura nebulosa Peale, Samoa-Inseln.
„ fuliginosa (Sparrm.) . . . . . Neu-Seeland.
„ albicollis (Vieill.) . . Ostindien.
„ rufifrons (Lath.) . . . Victoria.
„ atra Salvad., Deutsch-Neu-Guinea.
„ perlata Müll. . . . . Borneo.
„ phoenicura M. & Schl. . . Java.
„ leucothorax Salvad., Deutsch-Neu-Guinea.
„ gularis Müll. . . . . Kap York.
„ setosa Q. & G., Neu-Pommern.
„ javanica (Sparrm.) . . . Borneo.
„ nigritorquis Vig. . . . Manila.
„ pectoralis (Jerd.) . . Ostindien.
„ albifrontata Frankl., Ostindien
„ tricolor (Vieill.) . . . Südsee, Molukken.
Neomyias euryura (Müll.) . . . Sumatra.
Zeocephus rufus (Gray) . . . Sulu-Inseln.
„ cyanescens Shp. . . . Palawan.
Terpsiphone paradisi (L.) . Ostindien, Kaschmir.
„ affinis (Blyth) . . Malakka.
„ incei (Gould) . . . . . China.
„ mutata (L.) . . Madagascar.
„ cristata (Gm.) . . . . . Togo.
„ perspicillata Sws. . . . . Süd-Afrika.
„ suahelica Reichn., Mikindani.
„ emini Reichn. . . . . Uganda.
„ princeps (Temm.) . . . Japan.
„ illex Bangs, Liu-Kiu-Inseln.
Culicicapa ceylonensis (Sws.) Ostindien.
Myiagra rubecula (Lath.) . . . Australien.
„ concinna Gould, Nord-Australien.
„ nitida Gould . . . . . Australien.
„ vanicorensis (Q. & G.), Viti-Inseln.
„ albiventris (Peale), Samoa-Inseln.
„ melanura Gray . . Neu-Hebriden.
„ pluto Finsch . . . .Insel Ponapé.
„ latirostris Gould. . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ oceanica Jacq. & Puch., Insel Ruk.
„ aureicapilla Layard, Viti-Inseln.
Cryptolopha burkei (Burton) . . Assam.
„ trivirgata (Strickl.) . . Java.
„ cantatrix (Tick.) . . Assam.
Cryptolopha affinis (Horsf & M.), Assam.
„ tephrocephala (Anders.) . . . . . Thibet.
„ xanthoschista (Hodgs.) . . . . . Assam.
„ jerdoni (Brooks) . . Assam.
„ poliogenys (Blyth) . Assam.
„ castaneiceps (Hodgs.), Assam.
„ sinensis Rickett . . . . China.
„ grammiceps (Strickl.) . Java.
Abrornis schisticeps Hodgs. . . Himalaya.
„ superciliaris Tick. . . . . Assam.
„ albigularis Moore . . . . Assam.
„ fulvifacies Swinh. . . . . China.
Sisura inquieta (Lath.) . . . . Australien.
„ nana Gould . . . . . Queensland.
Arses lauterbachi Reichn. . . . Deutsch-Neu-Guinea.
Piezorhynchus chalybeocephalus (Garn.), Insel Duke of York.
„ nitidus Gould, Queensland.
„ nigrimentum (Gray) . . . . . Amboina.
„ gouldi (Gray) . Kap York.
„ diadematus (Salvad.) . . . Obi-Inseln.
„ verticalis Scl. . Insel Duke of York.
„ heterurus Salvad., Deutsch-Neu-Guinea.
Monarcha melanopsis (Vieill.) . . . Nord-Australien.
„ cinerascens Temm. . . . . Neu-Pommern.
Peltops blainvillei (Garn.) . . Deutsch-Neu-Guinea.
Stoparola indigo (Horsf.) . . . . . Java.
„ albicaudata (Jerd.), Süd-Indien.
„ melanops (Vig.) . . Ostindien.

Fam. Campophagidae.

Artamides larvatus (Müll.) . . . . . Java.
„ caeruleigriseus (Gray) . Deutsch-Neu-Guinea.
Pteropodocys phasianella (Gould) . . Süd-Australien.
Graucalus melanops (Lath.) . Australien.
„ parvirostris Gould . Tasmanien.
„ macii Less. . . . . Ostindien.
„ hypoleucus Gould, Queensland.

Graucalus longicauda De Vis . Deutsch-Neu-Guinea.
„ mentalis Vig. & Horsf. . . . . Australien.
„ lineatus (Sws.) . . . Queensland.
Edoliisoma tenuirostre (Jard.) . . Victoria.
Campophaga hartlaubi (Salvad.), Transvaal.
„ nigra (Vieill.) . . Kapkolonie.
Volvocivora lugubris (Sundev.), Himalaya.
„ melanoptera (Rüpp.) . . Perak.
Pericrocotus flammeus (Forst.), Süd-Indien.
„ exsul Wall. . . . . Java.
„ peregrinus L.) . . . Ostindien.
„ brevirostris (Vig.), Himalaya.
„ miniatus (Temm.) . . . Java.
„ japonicus Stejn. . . . . Japan.
„ cantonensis Swinh. . . China.
„ erythropygius (Jerd.) . . . . . Ostindien.
Lalage sykesi Strickl. . . . . Ostindien.
„ tricolor Sws. . . . . Australien.
„ terat (Bodd.) . . . . . Java.
„ pacifica (Gm.) . . . . Tonga-Inseln.
„ leucopygialis Wald. . . . . Celebes.
„ leucomelaena (Vig. & H.) . . . . . Australien.
„ karu Lesson & Garnot, Aru-Inseln.

Fam. Pycnonotidae.

Aegithina viridissima (Bp.) . . . Malakka.
„ tiphia (L.) . . . . . Ostindien.
„ viridis (Bp.) . . . . . Borneo.
„ scapularis (Horsf.) . . . Java.
„ nigrolutea (Marshall), Bombay.
Chloropsis hardwicki J. & S. . . . Assam.
„ anrifrons (Temm.) . . . Assam.
„ jerdoni (Blyth) . . . Ostindien.
„ chlorocephala (Wald), Assam.
„ icterocephala (Less.), Malakka.
Irena puella (Lath.) . . . . . Tenasserim.
Hypsipetes psaroides Vig. . . . Himalaya.
„ concolor Blyth . . . . Assam.
„ ganeese Sykes . . Süd-Indien.
„ perniger Swinh. . . . Hainan.
„ nigerrimus Gould . Formosa.
„ leucocephalus (Gm.) . . China.
„ amaurotis (Temm.) . . Japan.
„ squamiceps (Kittl.) . . . . . Bonin-Inseln.
Hypsipetes pryeri Stejn., Liu-Kiu-Inseln.
Ixocincla madagascariensis (Müll.) . . . . . Madagascar.
Hemixus flavala Hodgs. . . . Himalaya.
„ hildebrandti Hume . . . Birma.
„ canipennis Seebohm . . . China.
Iole viridescens Blyth . . . . . Assam.
„ everetti Tweedd. . . . . Mindanao.
„ philippensis (Gm.) . . . . . Mindanao.
„ macclellandi (Horsf) . . . . . Assam.
Poliolophus urostictus (Salvad.), Mindanao.
Microtarsus melanocephalus (Gm.) . . . . . Insel Salanga.
„ phaeocephalus (Jerd.) . . . . . Süd-Indien.
Criniger flaveolus (Gould) . . . . Sikkim.
„ salangae Shp. . . Insel Salanga.
„ gularis Horsf. . . . . Java.
„ frater Shp. . . . . Mindanao.
„ tephrogenys (J. & S.), Malakka.
„ ruficrissus (Shp.) . . . . Borneo.
„ chloris Finsch . . . . Halmahera.
Tricholestes criniger (Blyth) . . . . Java.
Alcurus striatus Blyth . . . . . Assam.
Trachycomus ochrocephalus (Gm.) . . . . . Malakka.
Bleda icterica (Strickl.) . . . . Süd-Indien.
„ simplex (Hartl.) . . . . . Liberia.
„ albigularis (Shp.) . . . . . Togo.
„ leucopleura (Cass.) . . . . . Kongo.
Andropadus importunus (V.), Süd-Afrika.
„ oleagineus Peters, Madagascar.
„ flavescens Hartl. . . Sansibar.
Eurillas congener (Reichn.) . . . . Togo.
Phyllostrophus terrestris Sws., Kapkolonie.
Molpastes fuscus (Müll.) . . . Ostindien, Ceylon.
„ burmanicus (Shp.) . . . . Pegu.
„ nigripileus (Blyth) . . Birma.
„ atricapillus (V.) . . . . Thibet.
„ pygaeus Hodgs. . . . Himalaya.
„ intermedius (Jerd.) . Ostindien.
Pycnonotus capensis (L.) . . . Süd-Afrika.
„ tricolor (Hartl.), Damaraland.
„ layardi Gurney, Südost-Afrika.
„ nigricans (Vieill.), Süd-Afrika.
„ xanthopygus (Hempr. & E.) . . . Palästina.
„ aurigaster (V.) . . . . . Java.

Pycnonotus bimaculatus Horsf. . . Java.
„ xanthorrhous S. Anders . . . . . Birma.
„ analis (Horsf.), Insel Salanga.
„ goiavier (Scop.) . Manila, Sulu-Inseln.
„ luteolus (Less.) . Ostindien.
„ finlaysoni Strickl., Malakka.
„ davisoni (Hume) . . . . Pegu.
„ barbatus (Desf.) . . Algerien, Senegal.
„ schoanus Neum. . Abessinien.
„ gabonensis Shp. . . Kamerun.
„ sinensis (Gm) . . . . . China.
„ hainanus (Swinh) . . Hainan.
„ blanfordi Jerd. . . . . Pegu.
„ plumosus Blyth . . Malakka.
„ simplex (Less) . . Ost-Java.
„ salvadorii Shp. . . . Malakka.
Xanthixus flavescens (Blyth). . . Assam.
Otocompsa emeria (L.) . . . . . Ostindien.
„ fuscicaudata Gould, Ostindien.
„ leucogenys (Gray & H.) . . . . . Himalaya.
„ leucotis (Gould) . . Ostindien.
„ flaviventris (Tick.) . . Assam.
Kelaartia penicillata Jerd. . . . . Ceylon.
Rubigula dispar (Horsf.) . . . . . Java.
„ melanictera (Gm.) . . . Ceylon.
„ cyaniventris (Blyth), Malakka.
Spizixus canifrons Blyth . . . . . Assam.
„ semitorques Swinh. . . . Thibet.

Fam. Timeliidae.

Clitonyx ochrocephala (Gm.), Neu-Seeland.
Orthonyx temmincki Vig. & H. . . . . Neu-Süd-Wales.
Cinclosoma punctatum (Lath.) . . . Süd-Australien.
„ castanonotum Gould . . . . Süd-Australien.
Eupetes geislerorum Meyer . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ pulcher Shp., Südost-Neu-Guinea.
„ incertus Salvad. . . . Südost-Neu-Guinea.
„ loriaeSalvad.,Südost-Neu-Guinea.
Pycnoptilus floccosus Gould. . . . Süd-Australien.
Hylacola cauta Gould . . Süd-Australien.
Psophodes crepitans (Lath.). . . . Süd-Australien.
Pterorhinus davidi Swinh., Nord-Thibet.
Trochalopterum affine (Blyth) . . Sikkim.
„ variegatum (Vig.) . . . . . Himalaya.
„ simile Hume, Kaschmir.
„ erythrocephalum (Vig.) . . . . . Himalaya.
„ nigrimentum Hodgs. . . . . Himalaya.
„ chrysopterum (Gould) . . . . . Assam.
„ rufigulare (Gould) . . . Himalaya.
„ squamatum (Gould) . . . Himalaya.
„ austeni Jerdon . . . Nord-Cachar.
„ prjevalskii Menzbier . . . . Kan-su.
„ phoeniceum (Gould) . . . Himalaya.
„ bakeri Hartert . Assam.
„ cachinnans (Jerd.) . . . . Süd-Indien.
„ canorum (L.) . . . China.
„ taivanum (Swinh.) . . . . Formosa.
„ lineatum (Vig.),Himalaya.
„ imbricatum (Blyth) . . . Himalaya.
„ virgatum Godw. Aust. . . Assam.
Ianthocincla lunulata Verr. . . . Thibet.
„ cinereiceps Styan . . . China.
Argya subrufa (Jerd.). . , . . Süd-Indien.
„ hyperythra Shp. . . . . Süd-Indien.
„ earlei (Blyth) . . . . . Ostindien.
„ caudata (Drap.) . . . . Ostindien.
„ squamiceps (Cretzschm.), Arabien.
„ chalybea (Bp.). . . . . Palästina.
„ gularis (Blyth) . . . . . Birma.
„ fulva (Desf.) . . . . . Algerien.
„ acaciae (Licht.) . . . . Erythraea.
„ malcolmi (Sykes) . . . . Ostindien.
„ longirostris (Moore) . . . . Assam.
Pomatorhinus montanus Horsf. . . Java.
„ borneensis Cab. . Malakka.
„ schisticepsHodgs.,Himalaya.

Pomatorhinus olivaceus Blyth, Tenasserim.
„ melanurus Blyth . Ceylon.
„ horsfieldi Sykes, Süd-Indien.
„ austeni Hume . . . Assam.
„ temporalis Vig. & H. . . . . Australien.
„ superciliosus Vig. & H. . . . . Australien.
„ ruficeps Hartl. . . Victoria.
„ rubeculus Gould . . Nord-Australien.
„ ferruginosus Blyth, Assam.
„ phayrei Blyth . . . Assam.
„ stenorhynchus Godw. Aust. . . . . Assam.
„ musicus Swinh. . Formosa.
„ ruficollis Hodgs., Himalaya.
„ stridulus Swinh. . . . China.
„ hypoleucus (Blyth), Assam.
„ erythrogenys Vig., Himalaya.
Xiphorhamphus superciliaris (Blyth) . . . . . Assam.
Garrulax waddellii Og. Grant . . Thibet.
„ leucolophus (Hardw.), Himalaya.
„ belangeri Less. . . . . Pegu.
„ diardi (Less.) . . . , . Malakka.
„ albigularis (Gould) . . . Cachar.
„ pectoralis (Gould) . . . Himalaya.
„ moniliger (Hodgs.) . . Himalaya.
„ picticollis Swinh. . . . . China.
„ gularis (McClell.) . . . Assam.
„ delesserti (Jerd.) . . Süd-Indien.
Stactocichla merulina (Blyth) . . Assam.
Grammatoptila striata (Vig.) . . Himalaya.
„ austeni Oates Nord-Cachar.
Rhinocichla treacheri (Shp.), Nord-Borneo.
Dryonastes ruficollis (J. & S.), Himalaya.
„ castanotis Og. Grant, Hainan.
„ nuchalis (Godw. Aust.), Assam.
„ monachus (Swinh.) . . Hainan.
„ perspicillatus (Gm.) . . China.
„ sannio (Swinh.) . . . . . China.
„ berthemyi (David & Oust.) . . . . . China.
„ caerulatus (Hodgs.), Himalaya.
„ subcaerulatus (Hume) . . . . . Nord-Cachar.
Crateropus reinwardti Sws., West-Afrika.
„ jardinei Smith . . Transvaal.
Crateropus kirki Shp. . . . . Nyassa-See.
„ sharpei Reichn., Südost-Afrika.
„ bicolor Jard. . . . . Süd-Afrika.
„ hartlaubi Bocage. . . . Südwest-Afrika.
„ smithi Shp. . . . . Abessinien.
„ canorus (L.) . . . . . Ostindien.
„ griseus (Gm.) . . . Süd-Indien.
„ striatus (Sws.) . . . . Ceylon.
„ somervillei (Sykes) . . . . . Süd-Indien.
„ rufescens (Blyth) . . . Ceylon.
Calamanthus fuliginosus (V. & H.) . . . . . Tasmanien.
„ campestris (Gould) . . . Süd-Australien.
Cinclorhamphus cruralis (V. & H.) . . Süd-Australien.
„ rufescens (V. & H.) . . . . Australien.
Timelia pileata Horsf. . . . . Java.
„ jerdoni Walden . . . . . Pegu.
„ bengalensis Godw. Aust., Bengalen.
Pyctorhis sinensis (Gm.) . . . . Ostindien.
Ophrydornis albigularis (Blyth), Ostindien.
Dumetia hyperythra (Frankl.), Süd-Indien.
Bowdleria punctatus (Q. & G.) . . . . . Neu-Seeland.
Sphenoeacus africanus (Gm.), Süd-Afrika.
„ transvalensis C. Grant. . . . . Transvaal.
Pellorneum mandelli Blanf. . . . . Sikkim.
„ minus (Hume) . . . . . Pegu.
„ ruficeps Sws. . . . . Ostindien.
„ subochraceum Swinh. . . . . Malakka.
„ palustre Gould . . . . Assam.
„ ignotum Hume . . . . Assam.
Scotocichla fascicapilla (Blyth) . Ceylon.
Bernieria madagascariensis (Gm.) . . . . . Madagascar.
Turdinus abbotti (Blyth) . . . . . Pegu.
„ sepiarius (Horsf.) . . . . Java.
„ magnirostris (Moore), Malakka.
„ macrodactylus (Strickl.), Malakka.
Drymochaera badiceps Finsch, Viti-Inseln.
Drymocataphus capistratus (T.) . . Java.
„ nigricapitatus (Eyton) . . . . Malakka.
„ assamensis Shp. . Assam.

Drymocataphus tickelli (Blyth) . Assam.
Ortygocichla rubiginosa Scl. . . . . Neu-Pommern.
Setaria albigularis Blyth . Insel Salanga.
Xanthomixis zosterops (Shp.), Madagascar.
Crateroscelis murina (Scl.) . Neu-Guinea.
Turdinulus roberti Godw. Aust., Assam.
„ exsul Shp. . . . Nord-Cachar.
Corythocichla striata (Walden) . Cachar.
Rimator malacoptilus Blyth. . . . Assam.
Alcippe nipalensis (Hodgs.) . Himalaya.
„ fratercula Rippon . . . . . Birma.
„ peracensis Shp. . . . . Malakka.
„ morrisonia Swinh. . . . Formosa.
„ poeocephala (Jerd.) . Süd-Indien.
„ phaerei Blyth . . . . . Assam.
„ pyrrhoptera (Bp.) . . . . . Java.
Rhopocichla atriceps (Jerd.) . Süd-Indien.
„ nigrifrons (Blyth) . . Ceylon.
„ bourdilloni (Hume), ... Süd-Indien.
Proparus vinipectus (Blyth) . . Himalaya.
Schoeniparus rufigularis (Mandelli), Assam.
„ mandellii (Godw. Anst.) . . . . . Nord-Cachar.
„ intermedius Rippon., Birma.
„ dubius (Hume), Tenasserim.
Pseudominla castaneiceps (Hodgs.), Assam.
„ cinerea (Blyth) . . . Assam.
Stachyris nigriceps Hodgs. . . . Himalaya.
„ borneensis Shp. . . Nord-Borneo.
„ davisoni Shp. . . . . Malakka.
„ melanothorax (Temm.) . . Java.
„ chrysaea Blyth . . . . Himalaya.
„ assimilis Wald . . . . . Cachar.
Tringorhina oglei (Godw. Anst.) . Assam.
Stachyridopsis ruficeps (Blyth), Himalaya.
„ rufifrons (Hume) . Assam.
„ pyrrhops (Blyth), Kaschmir.
Cyanoderma erythropterum (Blyth) . . . . . Malakka.
Mixornis gularis (Raffl.) . . . . Malakka.
„ rubricapilla (Tick.) . Himalaya.
„ borneensis Bp. . . . . Borneo.
„ montana Shp. . . . Nord-Borneo.
Macronus ptilosus Jard. & Selby . Java.
„ mindanensis Steere . Mindanao.
Myiophoneus temmincki Vig., Himalaya.
„ caeruleus (Scop.) . . China.
Myiophoneus borneensis Scl. . . . Nordwest-Borneo.
„ eugenei Hume . . . Assam.
„ horsfieldi Vig. . . Bengalen.
Arrenga cyanea (Horsf.) . . . . . Java.
Brachypteryx albiventris (Blanf.) . . . . Süd-Indien.
„ rufiventris (Jerd.) . . . . . Süd-Indien.
Heteroxenicus cruralis Blyth. . . Assam.
„ sinensis Rickett . . China.
„ leucophrys (Temm.), Java.
„ nipalensis (Moore), Assam.
„ carolinae (La Touche). . . . . China.
Oligura castaneocoronata (Burt.), Assam.
Tesia cyaniventer Hodgs. . . Nord-Cachar.
Lioptila annectens (Blyth) . . . . Assam.
„ capistrata Vig. . . . . Himalaya.
„ gracilis (McClell.) . . . Assam.
Actinodura egertoni Gould . . Himalaya.
„ khasiana Godw. Aust., Assam.
Staphidia torqueola (Swinh.) . . . . Chile.
„ castaneiceps (Moore) . . . . . Nord-Cachar.
„ everetti (Shp.) . . . . . Borneo.
„ rufigenis (Hume) . . . Himalaya.
Siva striigula Hodgs. . . . . Sikkim.
„ cyanuroptera Hodgs. . . . . Assam.
Yuhina nigrimentum Hodgs. . . Himalaya.
„ pallida La Touche . . . . . China.
Ixulus occipitalis (Blyth) . . . . . Assam.
„ flavicollis Hodgson . . . Himalaya.
Herpornis xantholeuca Hodgs. . . Assam.
Liothrix calipygus Hodgs. . . . Himalaya.
„ luteus (Scop.) . . . . . China.
Pterythius menalotis Hodgs. . . . Assam.
„ flaviscapus (Temm.) . . Java.
„ aenobarbus (Temm.) . . Java.
„ xanthochloris Hodgs. . . . . Nord-Punjab.
Mesia argentauris Hodgs. . . . Himalaya.
Minla igneitincta Hodgs. . . . . Assam.
Psaroglossa spiloptera (Vig.), Nord-Indien.
Paradoxornis flavirostris Gould. . Assam.
„ guttaticollis David, Assam.
Panurus biarmicus (L.) . . . . . Wolga.
„ sibiricus (Bp.) . . . . . Sibirien.
Suthora poliotis Blyth . . . . . Assam.

Suthora bulomachus Swinh. . . Formosa.
„ webbiana Gray . . . . . China.
„ atrisuperciliaris (G. Aust.) . . . . . Nord-Cachar.
Scaeorhynchus ruficeps (Blyth) . Assam.
„ gularis (Gray) . . Assam.

Fam. Troglodytidae.

Cinnicerthia unibrunnea (Lafr.) . . . . . Columbien.
Heleodytes griseus (Sws.) . . . . Orinoco.
„ hypostictus (Gould) . . . . . Amazonia.
„ couesi (Shp.) . . . . . Mexiko.
„ affinis Xantus, Süd-Kalifornien.
„ bryanti Anthony, Kalifornien.
„ balteatus (Baird) . . . . Peru.
Thryophilus longirostris (V.) . . . . . Süd-Brasilien.
„ albipectus (Cab.) . . . Peru.
„ modestus (Cab.) . . . Chiriqui.
„ rufalbus (Lafr.) . Venezuela.
„ sinaloa Baird . . . Mazatlan.
Thryothorus ludovicianus (Lath.), Östl. Nord-Amerika.
„ berlandieri Baird . . . Texas.
„ miamensis Ridgw. . Florida.
„ albinucha (Cabot), Yucatan.
„ rufescens Lawr. . . Dominica.
„ grenadensis Lawr. . . . . Insel Grenada.
„ genibarbis Sws. . . Amazonia, Bolivien.
„ cantator Tacz., Central-Peru.
„ amazonicus Shp., Amazonia.
„ griseipectus Shp., Amazonia.
„ maculipectus Lafr. . . . . Guatemala.
„ rutilus Vieill. . . Venezuela.
„ hyperythrus S. & Godm. . . . . Chiriqui.
Thryomanes bewicki (Audub.), Südwestl. Nord-Amerika.
„ cryptus Oberh. . . . . Texas.
„ bairdi (Salv. & Godm.) . . Mexiko.
„ spilurus (Vig.) . Kalifornien.
Cistothorus palustris (Wils.), Östl. Nord-Amerika.
Cistothorus plesius Oberh. . . . Brit.-Columbien.
„ paludicola Baird, Kalifornien.
„ stellaris (Naum.). . . . Nord-Amerika.
„ platensis (Lath.) . . . . Chile.
„ polyglottus (V.) . . Paraguay.
Troglodytes aëdon (Vieill.), Östl. Nord-Amerika.
„ parkmanni Aud., Kalifornien.
„ aztecus Baird , . . Colorado.
„ intermedius Cab., Costa Rica.
„ musculus Naum. . . Brasilien, Surinam.
„ hornensis Less. . . . . Chile.
„ rufulus Cab. . . . . Guayana.
„ albicans Berl. & T. . . West-Ecuador.
„ rex Berl. & Leverk., Bolivien.
„ tecellatus Lafr. & d'Orb, Peru.
Urocichla longicaudata (Moore) . Assam,
„ caudata (Blyth) . . . . Sikkim.
„ reptata Bingham, Hinterindien.
Salpinctes obsoletus (Say), Nord-Amerika.
Anorthura troglodytes (L.), Deutschland.
„ daurica (Dyb. & Tacz.), Mandschurei.
„ borealis Fischer, Faroer-Inseln.
„ pallida (Hume), Nördl. Mandschurei.
„ pallescens Stejn. . . . Aleuten.
„ hiemalis (Vieill.) . . . . Nord-Amerika.
„ pacifica (Baird) . . . . Oregon.
„ fumigata (Temm.) . . . Japan.
„ neglecta (Brooks), Kaschmir.
Catherpes mexicanus (Sws) . . . Mexiko.
„ conspersus Ridgw. . . . . Texas.
Hemiura solstitialis (Scl.). . . Columbien.
„ frater (Shp.) . . . . . Bolivien.
„ brunneicollis (Scl.) . . Yucatan.
Henicorhina leucophrys (Tsch.) . . . Columbien, Peru.
Pnoepyga albiventris (Hodgs.) . . Assam.
„ pusilla Hodgs. . . . . Assam.
„ rufa Shp. . . . . Java.

Fam. Cinclidae.

Cinclus aquaticus Bechst., Deutschland.
„ albicollis (Vieill.) . . . Schweiz.

Cinclus cinclus (L.). . . . . Schweden.
„ kashmeriensis Gould, Kuldscha.
„ rufiventris H. & J. . . . Palästina.
„ leucogaster (Bp.). . . . . Altai.
„ asiaticus Sws. . . . . Turkestan.
„ pallasi Temm. . . . . Amur.
„ sordidus Gould. . . Nord-Thibet.
„ mexicanus Sws. . . Westl. Nord-Amerika.

Fam. Mimidae.

Mimus polyglottus (L.). . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ leucopterus (Vig.). . . . . Texas.
„ orpheus (L.) . . . . . Jamaica.
„ portoricensis Bryant, Puerto Rico.
„ triurus (Vieill.) , . . . Argentina.
„ longicaudatus (Tsch.) . . . . Peru.
„ thenca (Mol.) . . . . . Chile.
„ lividus (Licht.). . . . . Amazonia.
„ modulator Gould. . Süd-Brasilien.
„ saturninus (Licht.) . . . Brasilien.
„ gilvus (Vieill.). . Insel Grenada, Surinam.
„ gracilis (Cab.) . . . . . Yucatan.
„ patagonicus (Lafr. & d'O.) . . . . Argentinien.
Nesomimus adamsi Ridgw., Galapagos-Insel.
„ melanotis (Gould) . . . Galapagos-Insel.
„ bauri Ridgw., Galapagos-Insel.
„ parvulus (Gould) . . . Galapagos-Insel.
Oreoscoptes montanus (Towns.) . . . Kalifornien.
Galeoscoptes carolinensis (L.) . . . . . Nord-Amerika.
Toxostoma rufum (L.). . . Nord-Amerika.
„ cinereum Xantus . . . Süd-Kalifornien.
„ bendirei Coues . . . . Arizona.
„ longirostre (Lafr.) . . Mexiko.
„ sennetti Ridgw. . . . . Texas.
„ curvirostre (Sws.) . . Mexiko.
„ palmeri Coues . . . . Arizona.
„ redivivum (Gambel) . . . . . Kalifornien.
„ pasadenense Grinnell. . . Süd-Kalifornien
„ lecontei (Lawr.) . . . Arizona.
Toxostoma arenicola Anthony . . Süd-Kalifornien.
„ crissale (Henry) . . . Arizona.
Melanotis hypoleucus Hartl., Guatemala.
Donacobius atricapillus (L.), Süd-Brasilien, Surinam.
Cinclocerthia ruficauda (Gould), Dominica.
Margarops fuscatus (V.), St. Thomas, Puerto Rico.
„ densirostris (V.). . . Dominica.
Allenia montana (Lafr.). . . . . Dominica.

Fam. Turdidae.

Platycichla flavipes (Vieill.) . . . . Süd-Brasilien.
„ venezuelensis Shp,, Venezuela.
Myiedestes dominicanus Stejn, Dominica.
„ townsendi (Aud.), Westl. Vereinigte Staaten.
„ ralloides (d'Orb.) . . . Columbien, Peru.
„ unicolor Scl. . . . Guatemala.
„ melanops Salv. . . Costa Rica.
Cochoa purpurea Hodgs. . . . . Sikkim.
„ viridis Hodgs. . . . . Assam.
Mimocichla rubripes (Temm.) . . . Cuba.
„ schistacea Baird . . Ost-Cuba.
„ ardesiaca (Vieill.), Puerto Rico.
Cichlherminia dominicensis (Lawr.). . . . . Dominica.
Merula merula (L.) . . . . . Deutschland.
„ cabrerae (Hartert) . . . . Canaren.
„ mauritanica (Hartert). . Marokko.
„ intermedia Richm., Ost-Turkestan.
„ maxima Seebohm, Nördl. Mongolei.
„ mandarina Bp. . . . . China.
„ boulboul (Lath.) . . . . Himalaya.
„ albocincta Royle. . . . . Sikkim.
„ atrosericea (Lafr.) . . . Venezuela.
„ samoënsis Tristr. . . Samoa-Inseln.
„ vanicorensis (Q. & G.) . . . . Vanicoro-Insel.
„ nigropileus (Lafr.) . . . Bombay.
„ simillima (Jerd.) . . . . Ostindien.
„ poliocephala (Lath.) . . . . . Norfolk-Inseln.
„ bicolor Layard . . . . . Viti-Inseln.
„ protomomelaena (Cab.) . . Assam.
„ celaenops Stejn . . . . . Japan.
„ rufiventer Vieill. . Süd-Brasilien.

Merula magellanica King . . . . . Chile.
„ falklandica Q. & G. . . . . Falklands-Inseln.
„ grayi Bp. . . . . Guatemala.
„ casius Bp. . . . . Panama.
„ tamaulipennis Nelson . . Yucatan.
„ phaeopygia Cab. . . . . Amazonia.
„ tristis (Sws.) . . . . . Costa Rica.
„ leucauchen Scl. . . . . Guatemala.
„ crotopezus Licht., Nord-Brasilien.
„ albicollis Vieill. . . Süd-Brasilien.
„ gymnophthalmus Cab. . . . . Surinam, Venezuela.
„ amaurochalina Cab. . . Rio Grande.
„ ignobilis Scl. . . . . Columbien.
„ debilis Hellm. . . . . Peru.
„ plebeia Cab. . . . . Costa Rica.
„ nigrirostris Lawr. . Insel Grenada.
„ fumigata Licht. . . . . Venezuela.
„ albiventer Spix . . . . Guayana, Venezuela.
„ aurantia (Gm.) . . . . . Jamaica.
„ cardis (Temm.) . . . . . Japan.
„ unicolor (Tick.) . . . . . Himalaya.
„ vanuensis Seebohm . . Viti-Inseln.
„ olivacea L. . . . . Süd-Afrika.
„ pelios Bp., Abessinien, Kamerun.
„ saturata Cab. . . . . Kongo.
„ cryptopyrrha Cab. . . . . Togo.

Semimerula fuscatra (d'Orb. & Lafr.) . . Bolivien.
„ gigas (Fraser) . . Columbien.
„ pallidiventris (Berl.) . . . . . Venezuela.
„ nigrescens (Cab.), Costa Rica.
„ chinguanco (d'Orb. & Lafr.) . . Bolivien.

Geocichla cyanonota (Jard. & Selby) . . . . . Bombay.
„ citrina (Lath.) . . . . Himalaya.
„ andamanensis Wald . . . . . Süd-Andamanen.
„ rubecula Gould . . . . . Java.
„ wardi (Jerd.) . . . . . Himalaya.

Cichloselys davisoni (Hume) . . . . Japan.
„ sibiricus (Pall.) . . . . . Amur.

Psophocichla litsitsirupa (Smith), Namaqua.

Aegothocichla terrestris (Kittl.) . . . Bonin-Insel.

Hesperocichla naevia (Gm.) . . . Canada.
„ meruloides (Sws.), Britisch-Columbien.

Oreocichla varia (Pall.) . . . . . Japan.
„ dauma (Lath.) . . . . Himalaya.
„ nilghiriensis Blyth, Süd-Indien.
„ horsfieldi Bp. . . . . Java.
„ papuensis (Seebohm) . . . . Neu-Guinea.
„ lanulata (Lath.) . . . . Süd-Australien.
„ macrohyncha Gould, Deal-Insel.
„ mollissima (Blyth) . . Sikkim.

Zoothera monticola Vig. . . Nord-Cachar.
„ andromeda (Temm.) . . . Java.
„ marginata Blyth . . . Himalaya.

Turdus viscivorus L. . . . . Deutschland.
„ bonapartei Cab. . . Ost-Turkestan.
„ pilaris L. . . . . Nord-Europa.
„ pallidus (Gm.) . . . . . Amur.
„ feae Salvad. . . . . Assam.
„ atrigularis Temm. . . . . Sibirien.
„ naumanni (Temm.) . . . . Sibirien.
„ dubius Bechst. . . . . Ost-Afrika.
„ hortulorum (Scl.) . . . . . Amur.
„ ruficollis (Pall.) . . . . . Mongolei.
„ chrysolaus (Temm.) . . . . Japan.
„ obscurus (Gm.) . Amur, Malakka.
„ torquatus (L.) . . . . Schweden.
„ alpestris Brehm, Schweiz, Spanien.
„ castaneus Gould . . . . Himalaya.
„ confinis Baird . . . Kap St. Lucas.
„ migratorius L., Östl. Nord-Amerika.
„ propinquus (Ridgw.) . . . Oregon.

Hylocichla mustelina (Gm.) . New-York
„ fuscescens Steph. . New-York.
„ salicicola (Ridgw.) . . Canada.
„ aliciae Baird. . . . . Labrador.
„ ustulata Nutt. . . . . Oregon.
„ almae (Oberh.), Brit. Columbien.
„ swainsoni Cab., Nord-Amerika.
„ pallasi Cab., Öst. Vereinigte Staaten.
„ guttata Pall. . . . Kalifornien.
„ nana Aud. . . . . Kalifornien.
„ auduboni Baird . . . . Felsen-Gebirge.
„ iliaca L. . . . . Nord-Europa.
„ coburni (Shp.) . . . . . Irland.

Hylocichla musica (L.) . . . Deutschland.
Monticola saxatilis (L.) . . . . . Schweiz.
Petrophila cyanus (L.) . Griechenland, Spanien.
„ manilla Bodd. . . . . China.
„ cinclorhyncha (Vig.) . . . . . Ostindien.
„ rupestris (Vieill.), Süd-Afrika.
„ explorator (Vieill.), Kapkolonie.
„ erythrogaster (Vieill.) . . . . . Himalaya.
Accentor himalayensis (Blyth) . . . Altai.
„ collaris (Scop.) . . . . Schweiz.
Tharrhaleus modularis (L.), Deutschland.
„ rubidus (T. & Schl.). . Japan.
„ montanellus (Pall.) . . Amur.
„ fulvescens (Severtz.) . . . . . Kuldscha.
„ atrigularis (Brandt), Sibirien.
„ rubeculoides (Moore), Thibet.
„ strophiatus (Hodgs.) . . . . . Himalaya.
„ jerdoni (Brooks). . Kaschmir.
Ephthianura albifrons (J. & S.) . . Süd-Australien.
„ tricolor Gould . . Australien.
„ aurifrons Gould . . Victoria.
Henicurus leschenaulti (Vieill.) . . Java.
„ sinensis Gould . . . . . Assam.
„ immalulatus Hodgs. . . Pegu.
„ schistaccus Hodgs. . . Sikkim.
„ guttatus Gould . . . . Sikkim.
Hydrocichla velata (Temm.) . . . . Java.
Microcichla scouleri (Vig.) . . . Himalaya.
Chimarrhornis leucocephala (Vig.) . . . . . Kaschmir.
Phoenicurus phoenicurus (L.), Deutschland.
„ mesoleucus (H. & E.) . . . . Kleinasien.
„ titys (Scop.) . . Deutschland.
„ ochrurus (Gm.) . . Kaspisee.
„ rufiventris (V.) . . . . Altai.
„ semirufus (H. & E.) . . . . Palästina.
„ auroreus (Gm.) . . . . Amur.
„ grandis Gould . . Kuku-Noor.
„ erythronotus (Eversm.) . . . . . Sibirien.
„ frontalis (Vig.) . . . Sikkim.
Diplootocus moussieri (Olph.-G.), Algerien.
Rhyacornis fuliginosa (Vig.) . . . Sikkim.
Cyanecula cyanecula (Wolf), Deutschland.
„ suecica (L.) . . . . Schweden.
„ abbotti Richmond . . Kaschmir.
Aëdon megarhyncha (Brehm.) . . . . . Deutschland.
„ luscinia (L.) . . . . . Ungarn.
„ golzii (Cab.) . . . Altai, Kaukasus.
Erithacus rubecula (L.) . . . Deutschland.
„ superbus Koenig . . . Teneriffa.
„ hyrcanus Blanf. . . . Lenkoran.
„ akahige (Temm.) . . . . . Japan.
Icoturus komadori (Temm.) . . . . Liu-Kiu-Inseln.
Hodgsonius phoenicuroides (Hodgs.) . . . . . Kaschmir.
Calliope calliope (Pall.) . . . . . Sibirien.
„ pectoralis Gould . . . . Kaschmir.
Ianthia cyanura (Pall.) . . . Insel Ascold.
„ rufilata (Hodgs.) . . . . Kaschmir.
Larvivora cyanea (Pall.) . . Amur, Japan.
„ brunnea Hodgs. . . . . Assam.
Notodela leucura (Hodgs.) . . . Himalaya.
Thamnobia cambaiensis (Lath.), Ostindien.
„ fulicata (L.) . . . . Ostindien.
Copsychus mindanensis (Gm.), Mindanao.
„ saularis (L.), Ostindien, Ceylon.
„ musicus (Raffl.), Pegu, Borneo.
„ amoenus (Horsf.) . . . Borneo.
Gervaisia albispecularis (Eyd. & Gerv.) . . Madagascar.
„ pica (Pelz.) . . . . Madagascar.
Cittocincla tricolor (Vieill.) . . Ostindien.
„ minor Swinh. . . . . Hainan.
„ macrura (Gm.), Pegu, Malakka.
„ suavis Scl. . . Central-Borneo.
„ stricklandi (Motl. & Dillw.) . . . . Nord-Borneo.
„ albiventris (Blyth), Andamanen.
Cossypha bicolor (Sparrm.) . . Kapkolonie.
„ caffra (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ heuglini Hartl., Nordost-Afrika.
„ subrufescens Bocage. . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ melanonota (Cab.) . . . Congo.
„ donaldsi Shp. . . . . Abessinien.
Irania gutturalis (Guérin) . . Kleinasien.

Cichladusa arquata Peters . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ guttata Heugl., Nordost-Afrika.
Pseudocossypha sharpei (Gray) . . . Madagascar.
Erythropygia coryphaeus (Less.) . . . . . Süd-Afrika.
„ leucophrys (Vieill.) . . . . . Süd-Afrika.
„ poena A. Smith, Südwest-Afrika.
„ rufiventris Shp., Massailand.
„ leucoptera (Ruepp.) . . . . Erythraea.
Thamnolaea cinnamomeiventris (Lafr.) . . . . . Transvaal.
Pratincola rubetra (L.) . . . Deutschland.
„ rubicola (L.) . . . Deutschland.
„ maura (Pall.) . . . . . Altai.
„ prjevalskii Pleske, Mandschurei.
„ torquata (L.) . . . Süd-Afrika.
„ sybilla (L,) . . . . Madagascar.
„ emmae Hartl. . . . Nyassa-See.
„ variegata (Gm.) . . . . . China.
„ caprata (L.) . . Pegu, Celebes.
„ astrata Kelaart . . Süd-Indien.
Oreicola jerdoni Blyth . . . . . Assam.
„ ferrea (Hodgs.) . . . . . Sikkim.
Myrmecocichla bifasciata (Temm.) . . . Süd-Afrika.
„ formicivora (Vieill.) . . . . Kapkolonie.
Cercomela fusca (Blyth) . . . . Ostindien.
„ asthenia (Temm.) . . . Judaea.
Poliocichla pollux (Hartl.) . . Kapkolonie.
„ sinuata (Sundev.), Kapkolonie.
„ cinerea (Vieill.), Namaqualand.
Saxicola familiaris Steph. . . . Kapkolonie.
„ oenanthe (L.) . . . Deutschland.
„ leucorrhoa (Gm.) . . . . Grönland.
„ albicollis (Vieill.) . . . . Spanien.
„ amphileuca Hempr. & E. . . . . Griechenland.
„ albicans Wahlb. . . . Transvaal.
„ isabellina Cretzschm. . . . . Central-Asien.
„ picata Blyth . . . Beludschistan.
„ capistrata Gould, Ost-Turkestan.
„ opistholeuca Strickl. . . . . Nord-Turkestan.
Saxicola monticola (Vieill.) . . Kapkolonie.
„ monacha Temm. . . . . Palästina.
„ lugens Licht. . . . . Palästina.
„ persica Seebohm . . . . . Persien.
„ pleschanka (Lepech.) . . . . . Wolga, Altai.
„ cypriaca Homeyer . . . . Cypern.
„ leucopyga Brehm . . . . Palästina, Algier.
„ leucura (Gm.) . . . . . Spanien.
„ deserti Temm. . . . . Sahara.
„ oreophila Oberh. . . . . Altai.
„ melanoleuca (Gould). . . Persien.
„ eurymelaena Hempr. & E., Jericho.
„ rufa Steph. . . . . Griechenland.
„ finschi Heugl. . . . . Jericho.
„ turanica Zarudn. . . . . Persien.
Campicola pileata (Gm.). . . . Süd-Afrika.
Catharus melpomene (Cab.). . . . Mexiko.
„ aurantiirostris (Hartl.) . . . . . Venezuela.
„ frantzii Cab. . . . . Costa Rica.
„ fuscater (Lafr.) . . . Venezuela.
„ phaeopleurus S. & S., Columbien.
„ gracilirostris Salv. . Costa Rica.
Sialia sialis L. . . . . Nord-Amerika.
„ mexicana (Sws. & Rich.) . . Mexiko.
„ occidentalis Towns. . . Kalifornien.
„ arctica Sws. . . . . Felsen-Gebirge.

Fam. Sylviidae.

Agrobates galactodes (Temm.) . . Spanien.
„ minor (Cab.) . . . . Erythraea.
„ familiaris (Ménétr.) . . . . . Griechenland.
Locustella fluviatilis (Wolf) . . Schlesien.
„ fasciolata (Gray) . . . . . Ost-Turkestan.
„ luscinioides (Sav.) . . . Ungarn.
„ certhiola (Pall.) . . . . . Amur.
„ naevia (Bodd.) . . Deutschland.
„ straminea (Severtz) . . . . Ost-Turkestan.
„ lanceolata (Temm.), Baikalsee.
Acrocephalus aquaticus (Temm) . . . . Deutschland.
„ phragmitis (Bechst.) . . . Deutschland.
„ bistrigiceps (Swinh.), Amur.

Acrocephalus turdoides (Meyer) . . . Deutschland.
„ orientalis (T. & S.), Sibirien.
„ stentoreus (H. & E.) . . . . . Ägypten.
„ australis Gould, Australien.
„ palustris (Bechst.) . . . Deutschland.
„ streperus (Vieill.) . . . . Deutschland.
„ dumetorum (Blyth), Altai.
„ agricola (Jerd.), Turkestan.
„ baeticatus (Vieill.) . . . . . Transvaal.
„ syrinx (Kittl.), Insel Ponapé, Ruk.
„ rehsei (Finsch), Insel Naura.

Tribura major (Brooks) . . . . . Himalaya.
„ thoracica (Blyth) . . . Sibirien, Himalaya.
„ brunneipectus (Blyth) . . Sikkim.
„ luteiventris Hodgs . . . . Thibet.
„ mandellii (Brooks) . . . . Assam.

Lusciniola melanopogon (Temm.), Italien.

Sutoria sutoria (Forst.), Ostindien, China.
„ edela (Less.) . . . . . Java.
„ maculicollis (Moore) . . Malakka.

Orthotomus frontalis Shp. . . Mindanao.
„ atrigularis (Temm.) . Assam.
„ derbianus Moore . . . . Luzon.
„ ruficeps (Less.) . . . . Perak.
„ sepium Horsf. . . . . Java.

Cisticola ruficapilla Smith . . . Süd-Afrika.
„ rufipileata Reichn. . . . Gaboon.
„ erythrops (Hartl.) . . Nyassa-See.
„ rufa (Fraser) . . . Elfenbeinküste.
„ cisticola (Temm.) . . . Spanien, Celebes, Ostindien.
„ brunneiceps (T. & Schl.), Japan.
„ cherina (Smith) . . Madagascar.
„ textrix (Vieill.) . . . Süd-Afrika.
„ terrestris (Smith) . . Transvaal.
„ exilis (Vig. & Horsf.), Neu-Pommern, Formosa.
„ tinniens (Licht) . . . Süd-Afrika.
„ strangei (Fraser) . . . . . Togo.
„ lugubris Ruepp., Nordost-Afrika.
„ ruficeps (Cretzschm.) . . Nordost-Afrika.

Cisticola subruficapilla (Smith) . . . . . Süd-Afrika.

Franklinia gracilis (Frankl.), Süd-Indien.
„ rufescens (Blyth), Assam, Pegu.
„ buchanani (Blyth), Ostindien.
„ cinereicapilla (Moore), Assam.

Laticilla burnesi (Blyth) . . . . Ostindien.

Nesillas typica Hartl., Östl. Madagascar.
„ lantzi Grandid., Nordwest-Madagascar.

Spiloptila clamans (Cretzschm.) . . . . Abessinien.
„ ocularis (Smith) . . Süd-Afrika.

Megalurus palustris Horsf. . . . . Java.
„ gramineus (Gould) . . . Süd-Australien.
„ ruficeps Tweedd. . . Luzon, Mindanao.
„ macrurus (Salvad.), Südost-Neu-Guinea.
„ interscapularis Scl. . . . . Neu-Pommern.

Schoenicola platyura (Jerd.) . Süd-Indien.

Bradypterus brachypterus (Vieill.) . . . Sansibarküste.

Rhopophilus albisuperciliaris H. & H. . . . . Turkestan.

Chaetocercus locustelloides (Blyth) . . . . . Ostindien.

Calamocichla newtoni (Hartl.), Madagascar.
„ leptorhyncha (F. & R.) . . . . Ost-Afrika.

Origma rubricata (Lath.), Neu-Süd-Wales.

Arundinax aëdon (Pall.) . . . . . Amur.

Hypolais hypolais (L.) . . . Deutschland.
„ polyglotta (Vieill.) . . . Spanien.

Iduna olivetorum Gould . . . Griechenland.
„ languida (Hempr. & E.), Palästina.
„ pallida (Hempr. & E.), Griechenland.
„ opaca (Cab.) . . . . . Spanien.
„ rama (Sykes) . . . . . Ceylon.
„ caligata (Licht.) . . Kirgisensteppe.

Sylvia nisoria (Bechst.) . . . Deutschland.
„ sylvia (L.) . . . . . Deutschland.
„ icterops Ménétr. . . Ost-Turkestan.
„ simplex Lath. . . . . Deutschland.
„ rueppelli Temm. . . . . Smyrna.
„ orpheus Temm., Griechenland, Kleinasien.
„ jerdoni (Blyth) . . , Transcaspien.

Sylvia curruca (L.) . . . . . Deutschland.
„ affinis Blyth . . . . . Sibirien.
„ althea Hume . . . . . Buchara.
„ minuscula Hume . . . . . Thibet.
„ mystacea Ménétr. . . . . Nord-Mandschurei.
„ conspicillata Temm. . . . Spanien.
„ atricapilla (L.) . . . . Deutschland.
„ subalpina Temm. . . Griechenland.
„ melanothorax Tristr. . . . Cypern.
Melizophilus melanocephalus (Gm.) . . . . . Spanien.
„ undatus (Bodd.) . . . Spanien.
„ deserticola Tristr. . Algier.
„ sardus Temm. . . . Sardinien.
Phylloscopus sibilator (Bechst.) . . . Deutschland.
„ trochilus (L.) . Deutschland.
„ bonelli (Vieill.) . . Schweiz.
„ minor (Forst.), Deutschland.
„ canariensis Hartert . . . . . Teneriffa.
„ tristis Blyth . . . . . Altai.
„ tytleri Brooks . . Kaschmir.
Oreopneuste affinis (Tickell) . . . Thibet.
„ fuscatus (Blyth) . . Sibirien.
Reguloides pulcher Blyth . . . . Himalaya.
„ proregulus (Pall.) . . . China.
„ superciliosus (Gm.) . . . . . Nord-Thibet.
„ humei (Brooks) . . . Kaschmir.
Acanthopneuste borealis (Blas.) . . Kola.
„ xanthodryas (Swinh.) . . . . . Japan.
„ viridana (Blyth) . . Nord-Indien.
„ plumbeitarsus (Swinh.) . . . . Kaschmir.
„ magnirostris (Blyth) . . . . Kaschmir.
„ coronata (Temm.) . Amur, Japan.
„ occipitalis (Blyth) . . . . Kaschmir.
„ trochiloides (Sundev.) . Nord-Indien.
„ davisoni Oates . . . . Tenasserim.
Chthonicola sagittata (Lath.), Australien.
Acanthiza nana Vig. & H., Neu-Süd-Wales.
Acanthiza pusilla (White), Süd-Australien.
„ diemensis Gould . . Tasmanien.
„ apicalis Gould, West-Australien.
„ pyrrhopygia Gould . . . . West-Australien.
„ lineata Gould, Süd-Australien.
„ chrysorrhoa (Q. & G.) . . . Neu-Süd-Wales.
„ reguloides Vig. & H. . . Neu-Süd-Wales.
Sericornis citreigularis Gould . . . . . Neu-Süd-Wales.
„ frontalis (Vig. & H.) . Süd-Australien.
„ magnirostris (Gould) . . . . . Queensland.
„ laevigaster Gould . Kap York.
„ sylvia Reichn. . Deutsch-Neu-Guinea.
„ maculata Gould . . . . . Neu-Süd-Wales.
„ osculans Gould, Süd-Australien.
„ humilis Gould . . . Tasmanien.
Apalis thoracica (Shaw & N.), Süd-Afrika.
Dryodromas fulvicapilla (V.), Damaraland.
Neomixis tenella Hartl. . . . . Madagascar.
Eremomela flaviventris Burch., Transvaal.
„ erlangeri Reichn., Somaliland.
Camaroptera olivacea (V.) . . Pondoland.
„ tincta Cass. . . . . Senegal.
„ pileata Reichn., Deutsch-Ost-Afrika.
Scotocerca inquieta (Cretzschm.), Punjab, Palästina.
„ saharae (Loche) . . . Algerien.
Neornis flavo-olivacea Blyth . . . Sikkim.
Horornis fortipes Hodgs. . . . . Himalaya.
„ davidiana (Verr.) . . . . Thibet.
„ brunnescens Hume . . . Sikkim.
„ pallida Brooks . . . . Kaschmir.
„ pallidipes (Blanf.) . . . Sikkim.
„ major (Moore) . . . . . Assam.
„ cantans (T. & Schl.) . . . Japan.
„ diphone (Kittl.) . . . . Seven-Isl.
„ canturians (Swinh.) . . . Amur.
„ montana (Horsf.) . . . . . Java.
Phyllergates cucullatus (Temm.) . . Java.
„ coronatus (Jerd. & Bl.) . . . Himalaya.
Horeites brunneifrons (Hodgs.) . Sikkim.

Cettia cetti (Marm.) . . . Spanien, Wolga.
„ orientalis Tristr. . . . . Amur.
Urosphena squamiceps (Swinh.) . . Japan.
Suya crinigera Hodgs. . . . . Ostindien.
„ atrigularis Moore . . . . . Himalaya.
„ khasiana Godw.-Aust. . . . Assam.
„ superciliaris Anderson . . Sumatra.
„ blythi Bp. . . . . Java.
Prinia familiaris Horsf. . . . . Java.
„ flavicans (Vieill.) . . . . Transvaal.
„ maculosa (Bodd.) . . . Süd-Afrika.
„ hypoxantha Shp. . . . . Pondoland.
„ mystacea Ruepp. . . . . Ost-Afrika.
„ inornata Sykes . . . . . Ostindien.
„ blanfordi (Wald.) . . . . . Pegu.
„ jerdoni (Blyth) . . . . . Ceylon.
„ extensicauda Swinh. . . . . China, Formosa.
„ sylvatica Jerd. . . . . Ostindien.
„ polichroa (Temm.) . . . . . Java.
Burnesia flaviventris (Deless.) . . . Pegu.
„ sonitans (Swinh.) . . . . . Amoy.
„ superciliaris (Salvad.) . Borneo.
„ substriata (Smith) . Süd-Afrika.
„ socialis (Sykes) . . . Ostindien, Ceylon.
„ gracilis (Cretzschm.) . Nordost-Afrika.
„ lepida (Blyth) . . . . Ostindien.
Malurus cyaneus (Ellis), Neu-Süd-Wales.
„ gouldi Shp . . . . . Tasmanien.
„ splendens (Q. & G.) . . . . West-Australien.
„ leucopterus Q. & G. . . . . Neu-Süd-Wales.
„ lamberti Vig. & H. . . Victoria.
„ amabilis Gould, Nord-Queensland.
„ melanocephalus V. & H. . . . . Süd-Australien.
„ dorsalis Lewin . Nord-Australien.

Fam. Vireonidae.

Vireo calidris (L.), Jamaica, Puerto Rico.
„ barbatulus (Cab.) . . . . . Cuba.
„ olivaceus (L.) . . . . Nord-Amerika.
„ flavoviridis (Cass.) . . . . . Mexiko, Guatemala.
„ chivi (Vieill.) . . . . . Brasilien.
„ philadelphicus (Cass.) . . . . . New-Hampshire.
Vireo gilvus (Vieill.), Östl. Nord-Amerika.
„ swainsoni (Baird) . . Kalifornien.
„ flavifrons (Vieill.) . . . New-York.
„ solitarius (Wils.) . . . . . Oregon.
„ cassini Xantus . . . . . Oregon.
„ plumbeus (Coues) . . . . . Arizona.
„ atricapillus Woodhouse . . . Texas.
„ noveboracensis (Gm.) . . . Florida.
„ belli Audub. . . . . Texas.
„ pusillus Coues . . . . . Kalifornien.
„ huttoni Cass. . . . . Kalifornien.
„ vicinior Coues . . . . . Arizona.
„ gundlachi Lembeye . . . . . Cuba.
„ latimeri Baird . . . . Puerto Rico.
Pachysilvia poecilotis Temm. . . . Südost-Brasilien.
„ aurantiifrons Lawr. . . . . Venezuela.
„ ochraceiceps Scl. . . . Chiriqui.
Cyclorhis subflavescens Cab. . . . Chiriqui.
„ viridis Vieill. . . . Argentinien.
„ cearensis Baird . . . . Amazonia.

Fam. Ampelidae.

Ampelis garrulus L. . . . . Lappland.
„ cedrorum (Vieill.), Nord-Amerika.
Phainopepla nitens (Sws.) . . . . Mexiko.

Fam. Artamidae.

Artamus leucogaster (Valenc.) . . . . Australien, Java.
„ mentalis Jard. . . . . Viti-Inseln.
„ fuscus Vieill. . . . . Ostindien.
„ superciliosus (Gould) . . Victoria.
„ personatus (Gould) . . Victoria.
„ cinereus Vieill, West-Australien.
„ hypoleucus Shp. . . . Queensland.
„ melenops Gould . . . Australien.
„ sordidus (Lath.) . . . Australien.
„ minor Vieill. . . Neu-Süd-Wales.

Fam. Vangidae.

Artamia bicolor (L.) . . . . . Madagascar.
Abbottornis chabert (Müll.), Madagascar.
Vanga curvirostris (Gm.) . . . Madagascar.

Fam. Prionopidae.

Grallina picata (Lath.) . . . . Australien.
Hemipus obscurus (Horsf.) . . . . . Java.
„ picatus (Sykes) . . . . Ostindien.

Tephrodornis pondicerianus (Gm.) . . . . . Ostindien.
„ pelvicus (Hodgs.), Hainan.
„ sylvicola Jerd., Süd-Indien.
„ gularis (Raffl.), Malakka.
Fraseria ocreata (Strickl.) . . . . Liberia.
Eurocephalus rueppelli Bp., Abessinien.
Pseudorhectes ferrugineus (Bp.), Deutsch-Neu-Guinea.
„ clarus Meyer, Deutsch-Neu-Guinea.
„ leucorhynchus (Gray) . . . . . Waigiu.
Collyriocincla harmonica (Lath.) . . . . . Australien.
„ rectirostris (J. & S.) . . . . Tasmanien.
„ brunnea Gould. . . . Nord-Australien, Neu-Guinea.
„ rufiventris Gould . . . . . Queensland.
„ pallidirostris Shp. . . . . Queensland.
Pinarolestes megarhynchus Q. & G., Deutsch-Neu-Guinea.
„ madaraszi Rothsch. & H. . Deutsch-Neu-Guinea.
„ parvulus (Gould) . . . . . Queensland.
„ rufiventris Shp., Queensland.
„ vitiensis (Hartl.), Viti-Inseln.
Prionops plumata (Shaw) . . . . . Guinea.
„ talacoma A. Smith . . . Uganda.

Fam. Aerocharidae.

Fam. Laniidae.

Gymnorhina tibicen (Lath.) . Australien.
„ leuconota Gray . . . . . Süd-Australien.
„ hypoleuca (Gould) . . . . . Tasmanien.
Cracticus quoyi (Lath.) . . . . Aru-Inseln.
„ nigrigularis (Gould) . . . . . Queensland.
„ picatus Gould, Nord-Australien.
„ cassicus (Bodd.), Aru-Inseln, Neu-Guinea.
„ leucopterus Gould . . . . . West-Australien.
„ destructor Temm. . . . . Süd-Australien.
Cracticus cinereus (Gould) . . Tasmanien.
Lanius minor Gm. . . . . Deutschland.
„ borealis Vieill. . . . . Labrador.
„ major Pall. . . . . Wermland.
„ excubitor L. . . . . Deutschland.
„ homeyeri Cab. . . . Siebenbürgen.
„ sphenocercus Cab. . Ost-Sibirien.
„ mollis Eversm. . . Ost-Turkestan.
„ hemileucurus F. & H. . . Algerien.
„ elegans Sws. . . . . Süd-Tunis.
„ pallens Cass. . . . . Alexandrien.
„ assimilis Brehm . . . Kamtschatka.
„ pallidirostris Cass. . . . . Jericho.
„ lahtora (Sykes) . . . . . Ostindien.
„ algeriensis Less. . . . . Algerien.
„ meridionalis Temm. . . . Spanien.
„ ludovicianus (L.) . . Süd-Carolina.
„ excubitoroides Sws. . . Kalifornien.
„ gambeli Ridgw. . . . . Arizona.
„ anthonyi Mearns . . . Kalifornien.
Phoneus nubicus (Licht.), Griechenland, Kleinasien.
„ pomeranus Sparrm. Deutschland.
„ rutilus (Lath.) . . . . . Palästina.
Fiscus humeralis (Stanley) . . Abessinien.
„ marwitzi (Reichn.). . Langenburg.
„ collaris (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ caudatus (Cab.) . . . . Ost-Afrika.
Enneoctonus collurio (L.). . Deutschland.
„ vittatus (Val.) . . Ostindien.
„ hypoleucus (Blyth). . Birma.
„ tigrinus (Drap.). . . Ussuri.
Cephalophoneus bucephalus (T. & Schl.) . . . . Japan.
„ tephronotus (Vig.) . . . . . Sikkim.
„ caniceps (Blyth). . . . Süd-Indien.
„ erythronotus (Vig.) . . . . . Ostindien.
„ schach (L.) . . China, Formosa.
„ bentet (Horsf.) . . Java.
„ nigriceps (Frankl.). . . . Ostindien.
„ nasutus (Scop.) . Luzon.
„ fuscatus (Less.), Hainan.
Otomela phoenicuroides (Severtz.), Altai.
„ cristata (L.) . . . . Amur, Pegu.

Otomela isabellina (H. & E.) . . . Altai.
„ lucionensis (L.) . . . . . China.
„ superciliosa (Lath.) . . . . Japan.
Malaconotus poliochlamys (Gadow) . . . . West-Afrika.
Chlorophoneus rubiginosus (Sundev.) . . . Kapkolonie.
Pelicinius gutturalis (Müll.), Süd-Afrika.
Laniarius rufiventris (Sws.) . . Kapland.
„ sublacteus (Cass.) . . Sansibar.
„ leucorhynchus (Hartl.) . . . . . Goldküste.
„ funebris (Hartl.) . . . . Ugogo.
„ fuelleborni Reichn., Nyassa-See.
Dryoscopus cubla (Shaw) . . . Kapkolonie.
Pomatorhynchus senegalus (L.) . Algerien, Senegal.
„ „ blanfordi (Shp.) . . . . Abessinien.
„ australis (Smith) . . . Süd-Afrika.
„ congener Reichn. . . . Nyassa-See.
„ frater Reichn. . . Congo.
„ minor (Reichn.) . . Mikindani.
„ tschagra (Vieill.) . . . Kapkolonie.
Antichromus minutus (Hartl.) . . . Togo.
Nilaus bubru (Lath.) . . . . . Kapland.
Falcunculus frontatus (Lath.) . Victoria.
Oreoica cristata (Lewin), Süd-Australien.
Pachycephala obiensis Salvad. Obi-Inseln.
„ melanura Gould. . . . Neu-Pommern.
„ rosseliana Hartert. . . . Rossel-Insel.
„ vitiensis Gray, Viti-Inseln.
„ gutturalis (Lath.) . . Süd-Australien.
„ occidentalis Ramsay. . West-Australien.
„ glaucura Gould, Tasmanien.
„ falcata Gould. . . Nord-Australien.
„ xanthetraea (Forst.) . . Neu-Caledonien
„ rufiventris (Lath.) . . . . . Australien.
„ gilberti Gould. . . West-Australien.
Pachycephala olivacea (Vig. & H.) . . Tasmanien.
„ xanthoprocta Gould . . . Norfolk-Inseln.
„ salvadorii Rothsch., Deutsch-Neu-Guinea.
Hyloterpe grisola (Blyth) . . . . . Java.
„ homeyeri W. Blas, Sulu-Inseln.
Pachycephalopsis fortis Gadow, Fergusson-Insel.
Eopsaltria australis (White) . . . Süd-Australien.
„ chrysorrhoa (Gould). . . . Neu-Süd-Wales.
„ magnirostris Ramsay . Nordost-Australien.
„ flaviventris (Shp.) . . . . Neu-Caledonien.

Fam. Paridae.

Poecile communis Baldenstein . Schweiz.
„ palustris (L.) Nordost-Deutschland.
„ dresseri (Stejn.) . . . . . England.
„ brevirostris (Tacz.) . . . . . Südost-Sibirien.
„ crassirostris (Tacz.) . . . . Ussuri.
„ borealis (Selys-Longch.), Schweden.
„ baicalensis Swinh. . . . Baikalsee.
„ restricta (Hellm.) . . . . . Japan.
„ kamtschatkensis Bp., Kamtschatka.
„ lugubris (Temm.) . . Griechenland.
„ songara (Severtz.) . . . Kuldscha.
„ cincta (Bodd.) . . . . . Lappland.
„ obtecta (Cab.) . . . . . Sibirien.
„ hudsonica (Forst.), Nord-Amerika.
„ rufescens (Towns.) . . Kalifornien.
„ neglecta (Ridgw.), Küste von Kalifornien.
„ sclateri (Kleinschm.) . . . Mexiko.
„ carolinensis (Audub.) . . . . . Nord-Amerika.
„ agilis (Sennett) . . . . . Texas.
„ atricapilla (L.) . . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ occidentalis (Baird) . . Kalifornien.
„ septentrionalis (Harris) . . . . . Washington.
Poeciloides gambeli (Ridgw.) . . . Oregon.
Sittiparus varius Bartram. . . . . Japan.
Lophophanes cristatus (L.) . . Schweden.

Lophophanes mitratus (Brehm) . . . . Deutschland.
„ wollweberi (Bp.) . . Mexiko.
„ bicolor (L.), Nord-Amerika.
„ texensis (Sennett) . . Texas.
„ atricristatus (Cass.) . Texas.
„ inornatus (Gambel) . . . Kalifornien.
Periparus ledouci (Malh.) . . . . Algerien.
„ phaeonotus (Blanf.) . . . . . Nord-Persien.
cypriotes (Dresser) . . Cypern.
„ ater (L.) . . . . . Deutschland.
„ britannicus (Shp. & Dresser) . . England.
„ rufipectus (Severtz.) . . . . . Thian-Shan.
„ pekinensis (David) . . . . . Mandschurei.
„ melanolophus (Vig.), Kaschmir.
Machlolophus xanthogenys (Vig.) . . . . . Himalaya.
„ haplonotus (Hodgs.) . . . . Süd-Indien.
„ spilonotus (Blyth), Assam.
Pardaliparus elegans (Less.) . . Mindoro.
Parus minor L. . . . . Deutschland.
„ aphrodite Madarasz . . . . Cypern.
„ cinereus Vieill. . . . . Sikkim.
„ bokhariensis Licht. . . . . Kuldscha.
„ transcaspius Zarudn. Transcaspien.
„ monticola Vig. . . . . Himalaya.
Pentheres niger (Bonn & V.), Kapkolonie.
„ afer (Gm.) . . . . . Süd-Afrika.
„ parvirostris (Shelley) . . . Südwest-Afrika.
Cyanistes caeruleus (L.) . . Deutschland.
„ persicus (Blanf.), Nord-Persien.
„ ombriosus (Meade — Walde) . . . . . Kanaren.
„ teneriffae (Lessen) . . Teneriffa.
„ ultramarinus (Bp.) . . Algerien.
„ pleskei (Cab.) . . . . . Rußland.
„ cyanus (Pall.) . . . . . Sibirien.
„ tianschanicus (Severtz.) . . . . . Turkestan.
„ flavipectus (Severtz.) . . . . Ost-Turkestan.
Aegithaliscus erythrocephalus (Vig.) . . . . . Himalaya.
Psaltriparus minimus (Towns.) . Nord-Kalifornien.
„ californicus Ridgw. . . . . Kalifornien.
„ plumbeus (Baird) . . . Felsen-Gebirge.
„ lloydi Sennett . . . . . Texas.
Aegithalus caudatus (L.) . . Deutschland.
„ macrurus (Seebohm) . . . Oberer Amur.
„ roseus (Blyth) . . . England.
„ trivirgatus (T. & Schl.), Japan.
„ tephronotus (Günther), Smyrna.
„ glaucogularis (Gould) . China.
Psaltria exilis Temm. . . . . Java.
Remiza pendulina (L.) . . . . . Ungarn.
„ stoliczkae (Hume), Nord-Mongolei.
„ caspia (Pöltzam) . . . Astrachan.
„ coronata (Severtz.) . . Turkestan.
„ macronyx (Severtz.), Transkaspien.
Anthoscopus minutus (Lath.), Süd-Afrika.
„ flavifrons (Cass.) . . Senegal.
Auriparus flaviceps (Sundev.), Kalifornien.
Cephalopyrus flammiceps (Burton) . . . . . Kaschmir.
Aphalocephala leucopsis (Gould) . Neu-Süd-Wales.
Sphenostoma cristatum Gould . . . Süd-Australien.
Certhiparus novae-zealandiae (Gm.) . . . . . Neu-Seeland.

Fam. Chamaeidae.

Chamaea fasciata (Gambel) . Kalifornien.

Fam. Regulidae.

Regulus regulus (L.) . . . . Deutschland.
„ tristis Pleske . . . . Turkestan.
„ azoricus Seebohm . . . . Azoren.
„ japonicus Seebohm . . . . Japan.
„ teneriffae Seebohm . . Teneriffa.
„ satrapa Licht. . . . . Mexiko.
„ ignicapillus (Brehm), Deutschland.
„ maderensis Vernon H. Madeira.
„ calendula (L.) . . Nord-Amerika.
Leptopoecile sophiae Severtz. Turkestan.

Fam. Sittinae.

Sitta europaea L. . Schweden, Lappland.
„ uralensis Licht. . . . . Ural.
„ baicalensis Tacz. . . . . Baikalsee.

Sitta albifrons Tacz. . . . . Kamtschatka.
„ amurensis Swinh. . . . . Amur.
„ neymayeri Michah. . . . Kleinasien.
„ syriaca Ehr. . . . . Kleinasien.
„ tephronota Shp. . . . . Afghanistan.
„ caesia Meyer & Wolf Deutschland.
„ cinnamomeiventris Blyth . . Assam.
„ sinensis Verr. . . . . Ost-Thibet.
„ krueperi Pelz. . . . . Kleinasien.
„ castaneiventris Frankl. . . Ostindien.
„ leucopsis Gould . . . . . Kaschmir.
„ carolinensis Lath., Vereinigte Staaten.
„ aculeata Cass. . . . . Washington.
„ atkinsi Scott . . . . . Florida.
„ canadensis L. . . . . Nord-Amerika.
„ pygmaea Vig. . . . . Oregon.
„ pusilla Lath. . . . . Arizona.
Dendrophila formosa Blyth . . . . Assam.
„ frontalis (Sws.) . . . . Java.
Neositta chrysoptera (Lath.) . . . . . Süd-Australien.
„ leucocephala (Gould) . Victoria.

Fam. Certhiidae.

Certhia familiaris L. . . . . Deutschland.
„ scandulaca Pall. . Ost-Turkestan.
„ brachydactyla Brehm . Rumänien.
„ americana Bp. . . . Nord-Amerika.
„ mexicana Gloger . . . . . Mexiko.
„ himalayana Vig. . . . . Sikkim.
„ nipalensis Hodgs. . . Nord-Cachar.
Salpornis spilonotus (Frankl.), Ostindien.
Tichodroma muraria (L.) . . . . Schweiz.
Climacteris melanura Gould, Queensland.
„ rufa Gould West-Australien.
„ picumnus (Temm.) . . Victoria.
„ scandens Temm. . . . . Süd-Australien.

Fam. Zosteropidae.

Zosterops japonica Temm. & Sch., Japan.
„ gouldi Bp. . . West-Australien.
„ erythropleura Swinh. . Thibet.
„ xanthochroa Gray . . . . . Neu-Caledonien.
„ ceylonensis Holdsw. . . Ceylon.
„ annulosa Swains., Süd-Afrika.
„ madagascariensis Gm. . . . . Madagascar.
Zosterops novae-guineae Salvad. . . . . Aru-Inseln.
„ palpabrosa (Temm.), Ostindien.
„ nicobarica Blyth, Ishigaki-Inseln.
„ aureiventer Hume . . Malakka.
„ simplex Swinh., Liu-Kiu-Inseln.
„ stejnegeri Seebohm . . . Japan.
„ flava (Horsf.) . . . . . Java.
„ siamensis Blyth . . . . . Birma.
„ flavifrons (Gm.), Neu-Hebriden.
„ semperi Hartl. . . Insel Ponapé.
„ owstoni Hart. . . . Insel Ruk.
„ virens Sundev. . . . Pondoland.
„ atrifrons Wall. . . . Minahassa.
„ hypoxantha Salvad. . . . . Neu-Pommern.
„ olivacea (L.), Insel Reunion.
„ javanica (Horsf.) . . . . Java.
„ conspicillata (Kittl.), Insel Guam.
„ frontalis Reichb. . . . . Java.
„ lateralis (Lath.), Neu-Seeland.
„ flaviceps Peale . . . Viti-Inseln.
„ griseinota Gray . . . . . Neu-Caledonien.
„ albigularis Gould. . . . . Norfolk-Inseln.
„ tenuirostris Gould. . . . . Norfolk-Inseln.
„ ponapensis Finsch, Insel Ponapé.
Malacirops mauritiana (Gm.), Mauritius.

Fam. Dicaeidae.

Dicaeum flammeum (Sparrm.) . . . Java.
„ cruentatum (L.) . . . . . Pegu.
„ nigrimentum Salvad. . . . . Neu-Borneo.
„ hirundinaceum (Shaw) . . . . Nord-Australien.
„ celebicum Müll. & Schl., Celebes.
„ sanguinolentum Temm. . Java.
„ schistaceiceps Gray . . . Batjan.
„ trigonostigma (Scop.) . . Java.
„ cinereigulare Tweedd., Mindanao.
„ ingnipectus (Hodgs.) . . . . . Nord-Cachar.
„ chrysorrhaeum Temm. . Assam.
„ concolor Jard. . . . . Madras.
„ olivaceum Wald. . . . . Assam.
„ erythrorhynchum (Lath.) . . . . . Ostindien.

Pardalotus ornatus Temm., Süd-Australien.
„ affinis Gould . . . . Victoria.
„ punctatus (Shaw.) . . . Süd-Australien.
„ xanthopygius McCoy . . . . Süd-Australien.
„ rubricatus Gould . . . . Neu-Süd-Wales.
„ melanocephalus Gould . . . . Neu-Süd-Wales.
„ uropygialis Gould . . . . Nord-Australien.
„ quadrigintus Gould, Tasmanien.
Prionochilus percussus Temm. . . . Java.
„ xanthopygius Salvad. . . . . Nord-Borneo.
Piprisoma squalidum (Burt.) . . Ostindien.

Fam. Nectariniidae.

Nectarinia famosa (L.) . . . . Süd-Afrika.
„ johnstoni Shelley . . . Kilimandscharo.
„ pulchella (L.) . . . . . Senegal.
„ melanogaster F. & R. . . . . Massailand.
Drepanorhynchus reichenowi (Fischer). . Ost-Afrika.
Aethopyga saturata (Hodgs.), Himalaya.
„ eximia Horsf. . . . . Java.
„ seheriae (Tick.) . . Himalaya.
„ flavostriata Wall. . . Celebes.
„ gouldiae (Vig.) . . . . Assam.
„ dabryi (Verr.) . . . . Thibet.
Arachnechthra asiatica (Lath.), Ostindien.
„ brevirostris (Blaf.). . . Beludschistan.
„ lotenia (L.) . . Südindien.
Leptocoma minima (Sykes) . . . Ostindien.
„ grayi (Wall.) . . . . . Celebes.
„ zeylonica (L.) . . . . Sikkim.
Hermotimia aspasia (Less.) . . Insel Jobi.
„ corinna Salvad. . . . . Neu-Pommern.
„ christianae (Tristr.) . Fergusson-Inseln.
„ aspasioides (Gray), Amboina.
„ auriceps Gray . . Halmahera.
„ sangirensis (Meyer) . . . Sangir-Inseln.
Cinnyris cupreus (Shaw) . . West-Afrika.
Cinnyris notatus (Müll.) . . Madagascar.
„ superbus (Shaw). . . . . Togo.
„ splendidus (Shaw). . . . . Togo.
„ mariquensis Smith . Damaskus.
„ osiris (Finsch) . . . . Ost-Afrika.
„ microrhynchus Shelley . . . . . Sansibar-Küste.
„ bifasciatus (Shaw), West-Afrika.
„ osea Bp. . . . . Palästina.
„ venustus (Shaw) . . . . Liberia.
„ nyassae Reichn. . . . . Gasaland.
„ falkensteini F. & R. . . . Songea.
„ souimanga (Gm.) . Madagascar.
„ afer (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ chalybea (L.) . . . . Kapkolonie.
„ chloropygius (Jard.) . . . Liberia.
Chalcomitra senegalensis (L.) . . . . . West-Afrika.
„ aequatorialis Reichn. . . . . Nyassa-See.
„ gutturalis (L.) . Sansibar, Ost-Afrika.
„ amethystina (Shaw) . . . . . Süd-Afrika.
„ kirki (Shelley) . Ost-Afrika.
„ kalckreuthi Cab., Ost-Afrika.
Elaeocerthia fusca (Vieill.) . Damaraland.
„ verreauxi (Smith) . . . . . Kapkolonie.
Cyrtostomus flammaxillaris (Blyth), Pegu.
„ andamanicus (Hume) . . . . Andamanen.
„ rhizophorae (Swinh.), Hainan.
„ jugularis (L.) . Sulu-Inseln.
„ frenatus (Müll.), Duke of York-Insel.
„ pectoralis (Horsf.) . Borneo.
„ zenobia (Less.) . . . Ceram, Amboina.
Arachnothera longirostris (Lath.) . . . . . Ostindien.
„ magna (Hodgs.), Ostindien.
„ affinis (Horsf.) . . . . Java.
Arachnoraphis robusta (Müll. & H.) . . Borneo, Malakka.
Anthothreptes orientalis Hartl. . . Kilimandscharo.
„ collaris (Vieill.), Sansibar.
„ hypodila (Jard.) . . . . . Ost-Afrika.

Anthothreptes gabonica (Hartl.), Kamerun.
„ malaccensis (Scop.) . . . Borneo, Java.
„ celebensis Shelley, Celebes.

Fam. Promeropidae.

Promerops cafer (L.) . . . . . Kapkolonie.

Fam. Meliphagidae.

Melithreptes atricapillus (Lath.) . . Süd-Australien.
„ validirostris (Gould) . . . . . Tasmanien.
„ melanocephalus (Gould) . . . . . Tasmanien.
Plectorhamphus lauceolatus Gould . . . . . Victoria.
Myzomela rubratra (Less.), Palau-Inseln.
„ nigriventris Peale . . . . . Samoa-Inseln.
„ sauguinolenta (Lath.) . . . . . Queensland.
„ erythromelaena Salvad. . . . . Neu-Pommern.
„ jugularis Peale . . Viti-Inseln.
„ nigra Gould . . . . . Victoria.
„ pectoralis Gould . . . Nord-Queensland.
„ scalteri Forbes, Neu-Pommern.
„ eques (Less) . . . Neu-Guinea.
„ cineracea Scl. . Neu-Pommern.
Acanthorhynchus tenuirostris (Lath.) . . . Australien.
Glyciphila melanops (Lath.) . . . . West-Australien.
„ albifrons Gould, Süd-Australien.
„ fasciata Gould . . . Queensland.
„ modesta Gray . . . Aru-Inseln.
Conopophila albigularis Gould, Queensland.
„ rufigularis (Gould) . . Nord-Australien.
Certionyx variegatus (Less.) . . . . Süd-Australien.
Meliphaga phrygia (Lath.) . . . . Neu-Süd-Wales.
Melilestes megarhynchus (Gray) . Deutsch-Neu-Guinea.
Melipotes fumigatus Meyer . Deutsch-Neu-Guinea.
Stigmatops ocularis Gould . . Queensland.
„ subocularis Gould, Queensland.
Stigmatops squamata Salvad. . . . . Dammar-Insel.
„ blasii Salvad. . . . . Amboina.
Ptilotis carunculata (Gm.), Samoa-Inseln.
„ procerior F. & H. . . . Viti-Inseln.
„ analoga Reichb. . . Waigiu, Neu-Guinea.
„ sharpei R. & H. . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ fusca Gould . . . . Queensland.
„ chrysotis Lath. . Neu-Süd-Wales.
„ provocator Layard . . Viti-Inseln.
„ sonora Gould . . . . . Victoria.
„ chrysops (Lath.), Süd-Australien.
„ flavicollis Vieill. . . . Tasmanien.
„ leucotis (Lath.) . . . . . Victoria.
„ auricomis (Lath.), Neu-Süd-Wales.
„ ornata Gould . . . . . Victoria.
„ flava Gould . . . Nord-Australien.
„ penicillata Gould, Neu-Süd-Wales.
„ cinerea Scl. . . . . Neu-Guinea.
„ unicolor Gould . . . . Queensland.
Xanthotis lessoni (n. em.) . . Neu-Guinea.
Meliornis pyrrhoptera (Lath.) . . . . Neu-Süd-Wales.
„ novae-hollandiae (Lath.) . . . . . Victoria.
„ longirostris Gould . . . . . West-Australien.
Anthornis melanura (Sparrm.) . . . . Neu-Seeland.
Prosthemadera novae-zealandiae (Gm.) . . . . Neu-Seeland.
Manorhina melanophrys (Lath.) . . . . . Victoria.
Myzantha garrula (Lath.), Süd-Australien.
„ obscura Gould . . . . West-Australien.
„ flavigula Gould, Süd-Australien.
Acanthochaera carunculata (Lath.) . . . . Australien.
„ inauris Gould . Tasmanien.
Anellobia chrysoptera Lath. . . . . Süd-Australien.
„ lunulata Gould . . . . . West-Australien.
Acanthogenys rufigularis Gould, Victoria.
Entomyza cyanotis (Lath.) . . . . Neu-Süd-Wales.
„ albipennis Gould, Queensland.

Tropidorhynchus novae-guineae (Müll.) . . . . . Waigiu.
„ jobiensis Meyer, Deutsch-Neu-Guinea.
„ argenticeps Gould . . . Queensland.
„ buceroides Sws. . . . . Kap York.
„ corniculatus (Lath.), Neu-Süd-Wales.
Philemon citreigularis (Gould) . . . . . Queensland.
„ sordidus (Gould) . Queensland.
„ cockerelli Scl. . . Neu-Pommern.
Philemonopsis meyeri (Salvad.). . . Neu-Guinea.

Fam. Mniotiltidae.

Mniotilta varia (L.), Östl. Nord-Amerika.
Helinaia swainsoni Aud. . . Süd-Carolina.
Helminthotherus vermivorus (Gm.) . . Nord-Amerika.
Protonotaria citrea (Bodd.). Östl. Nord-Amerika.
Vermivora chrysoptera (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ pinus (L.), Östl. Nord-Amerika.
„ peregrina (Wils.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ celata (Say) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ rubricapilla (Wils.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ lutescens (Ridgw.), Westl. Nord-Amerika
„ virginiae (Baird) . . Colorado.
„ luciae (Cooper) . . . . Arizona.
Oreothlypis superciliosa (Hartl.). Yucatan.
Parula americana (L.), Östl. Nord-Amerika.
„ pitiayumi (V.), Südwest-Brasilien.
„ nigrilora (Coues) . . . . . Mexiko.
Dendroeca aestiva (Gm.), Nord-Amerika.
„ sonorana Brewst. . . . Arizona.
„ gundlachi Baird . . . . . Cuba.
„ aureola Gould . . . Galapagos-Inseln.
„ ruficapilla (Gm.) . . Dominica.
„ maculosa (Gm.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ tigrina (Gm.) . . Neu-Braunschweig.
Dendroeca caerulescens (Gm.) . . Canada.
„ coronata (L.) . Nord-Amerika.
„ auduboni (Towns.) . . Oregon.
„ nigrescens (Towns.) . Oregon.
„ virens (Gm.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ chrysoparia S. & S. . . . Texas.
„ caerulea Wilson . . New-York.
„ blackburniae (Gm.), New-York.
„ dominica (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ graciae Baird . . . . Colorado.
„ pennsylvanica (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ castanea (Wils.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ striata (Forst.) . . . . Canada.
„ vigorsi (Aud.) . Nord-Carolina.
„ discolor Vieill. . . Östl. Nord-Amerika.
„ palmarum (Gm.). . . Manitoba.
„ plumbea Lawr. . . . Dominica.
Oporornis formosa (Wils.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ agilis (Wils.) . . . Connecticut.
„ philadelphia (Wils.) . . Neu-Braunschweig.
„ tolmiei (Towns.) . Kalifornien.
Siurus auricapillus (L.) . . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ motacilla (Vieill.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ noveboracensis (Gm.) . . . . Östl. Nord-Amerika.
Geothlypis trichas (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ brachydactyla (Sws.), Canada.
„ occidentalis (Brewst.) . . . . . Kalifornien.
„ arizela Oberh. . . Kalifornien.
„ melanops Baird . . . . Mexiko.
„ chiriquensis Salv. . . Chiriqui.
„ cucullata (Lath.), Brasilien, Argentina.
„ bairdi Nutting . . . Honduras.
Icteria viridis (Gm.), Östl. Nord-Amerika.
„ longicauda (Lawr.) . . Kalifornien.
Granatellus sallaei Bp. . . . . Honduras.
„ boucardi Ridgw. . . Yucatan.

Wilsonia mitrata (Gm.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ pusilla (Wils.) . Nord-Amerika.
„ pileolata (Pall.) . . . Kalifornien.
„ chryseola Ridgw. . . Kalifornien.
„ canadensis (L.) . . . . Östl. Nord-Amerika
Setophaga ruticilla (L.) . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ picta Sws. . . . . Yucatan.
Myioborus verticalis (Lafr. & d'O.) . . . . . Peru.
„ aurantiacus (Baird), Costa Rica.
„ albifrons (S. & S.), Venezuela.
„ chrysops (Salvin), Columbien.
Myiothlypis nigricristatus (Lafr.) . . . . . Venezuela.
Basileuterus culicivorus (Licht.) . . . . . Costa Rica.
„ tristriatus (Tschudi) . Peru.
„ meridanus Shp. . Venezuela.
„ bivittatus (d'Orb.), Bolivien.
„ auricapillus (Sws.), Brasilien.
„ mesochrysus Scl., Costa Rica.
„ leucoblepharus (V.) . . Rio Grande do Sul.
„ strangulatus (Licht.) . Südost-Brasilien.
„ semicervinus Scl., Columbien.
„ leucopygius S. & S . . . . . Costa Rica.
Certhidea olivacea Gould, Galapagos-Insel
„ fusca S. & S., Galapagos-Insel

Fam. Drepanididae.

Heterorhynchus wilsoni Rothsch. . Hawai-Inseln.

Fam. Motacillidae.

Motacilla lugubris Temm. . . . England.
„ alba L. . . . . Deutschland.
„ dukhunensis Sykes . . . . . Ost-Turkestan.
„ baikalensis Swinh . . Baikalsee.
„ ocularis Swinh. . . . . Sibirien.
„ lugens Kittl. . . . . Amur.
„ persica Blanf. . . . Nord-Persien.
„ personata Gould . . . . . Altai.
„ leucopsis Gould. . Ost-Sibirien.
„ hodgsoni Blyth . . . . Kaschmir.
Motacilla vidua Sund. . . . . Ost-Afrika.
„ maderaspatensis Gm., Himalaya.
„ grandis Shp. . . . . Japan.
„ capensis L. . . . . Süd-Afrika.
„ flaviventris Verr., Madagascar.
„ boarula L. . . . . Deutschland.
„ melanope Pall. . . . . Altai.
„ citreola Pall. . . . . Sibirien.
„ citreoloides (Gould), Kuldscha.
„ rayi Bp. . . . . England.
„ campestris Pall., Südost-Europa.
„ flava L. . . . . Deutschland.
„ beema Syk. . . . . Turkestan.
„ borealis Sundev. . . . Lappland.
„ cinereicapilla Sav. . . . Wolga.
„ taivana Swinh. . . . Nord-Mandschurei.
„ feldeggi Michah , Griechenland.
„ xanthophrys Shp. . . . Lenkoran.
„ melanogrisea (v. Homeyer), Ost-Turkestan.
Dendranthus indicus (Gm.) . . . . Ussuri.
Anthus chloris Licht. . . . . Kapkolonie.
„ trivialis (L.) . . . . Deutschland.
„ nilghiriensis Shp. . . . Süd-Indien.
„ maculatus Hodgs. . . . . Amur.
„ pyrrhonotus (Vieill.), Süd-Afrika.
„ sordidus Ruepp., Nord-Ost-Afrika.
„ captus Hartert . . . . . Palästina.
„ jerdoni Finsch . . Beludschistan.
„ richardi Vieill. . . . . Ost-Asien.
„ striolatus Blyth . . . . . Assam.
„ campestris (L) . . . Süd-Ost-Europa, Altai.
„ rufulus Vieill., Ostindien. Süd-Ost-Afrika.
„ pratensis (L) . . . . Deutschland.
„ cervinus (Pall.) . . . . . Lappland.
„ rosaceus Hodgs. . . . . Himalaya.
„ bertheloti Bolle . . . . Teneriffa.
„ madeirensis Hart. . . . Madeira.
„ spipoletta (L.) . . . . . Schweiz.
„ blakistoni Swinh. . . Turkestan.
„ pennsylvanicus Lath., Labrador.
„ obscurus (Lath.) . . . . England.
„ rupestris Nilsson . . . Schweden.
„ bogotensis Scl. . . . . Venezuela.
„ fuscatus Lafr. & d'Orb., Argentina.
„ rufus (Gm) . . . . Süd-Brasilien.

Anthus chii Vieill. . . . . Buenos-Ayres.
„ correndera Vieill. . . . . Chile, Süd-Brasilien.
„ australis Vig. & Horsf., Australien.
„ novae-zealandiae (Gm.) . . . . . Neu-Seeland.
Xanthocorys nattereri Scl. . . . Süd-Ost-Brasilien.
Neocorys spraguei (Aud.) . . . . . Canada.
Orocorys sylvanus (Hodgs.) . . Kaschmir.
Macronyx capensis (L.) . . . . Süd-Afrika.
„ croceus (Vieill.) . . Ost-Afrika.

Fam. Alaudidae.

Certhilauda capensis (Bodd.), Süd-Afrika.
„ albofasciata Lafr., Süd-Afrika.
Alaemon alaudipes (Desf.) . . . Algerien.
„ desertorum (Stanley), Abessinien.
„ semitorquata (Smith), Ondonga.
Chersophilus duponti (Vieill.), Algerien.
Rhamphocorys clot-bey (Bp.) . . . Tunis.
Otocorys alpestris (L.) . . . Nord-Europa, Britisch Nord-Amerika.
„ bilopha (Temm.) . . . Algerien.
„ brandti Dresser . . . . . Altai.
„ elwesi Blanf. . . . . Turkestan.
„ teleschowi Przew. . . . Thibet.
„ bicornis Brehm . . . Kleinasien.
„ albigula Bp. . . . . Turkestan.
„ leucolaema (Coues). . . . . Nord-Amerika.
„ praticola Hensh. . . . Östl. Nord-Amerika.
„ chrysolaema (Wagl.), Arizona.
„ rubea Hensh. . . . . Kalifornien.
Melanocorypha calandra (L.), Süd-Europa.
„ bimaculata (Ménétr.), Ost-Turkestan.
„ sibirica (Gm.). Südöstl. Russland.
„ mongolica (Pall.), Daurien.
„ yeltoniensis (Forst.). . . . . Wolga.
Tephrocorys cinerea (Gm.) . . Süd-Afrika.
Alauda arvensis L., Deutschland, Mongolei.
„ gulgula Frankl. . . . . Ostindien.
„ guttata Brooks . . . . . Kaschmir.
„ japonica T. & Schl. . . . . Japan.
„ inopinata Bianchi . . . . . Thibet.
„ coelivox Swinh. . . . . Amoy.
Alauda sala Swinh. . . . . Formosa
Calandrella brachydactyla (Leisl.), Süd-Europa, Ostindien.
„ tibetana Brooks . . Kaschmir.
Alaudula raytal (Blyth) . . . . Ostindien.
„ adamsi (Hume) . . . . Ostindien.
„ heinei (Homeyer), Süd-Rußland.
„ leucophaea (Severtz.) . . . . . Mandschurei.
„ cheeleensis Swinh. . . . . China.
„ baetica Dresser . . . Andalusien.
„ minor (Cab.) . . . . . Tunis.
„ polatzeki Hartert . . Canaren.
„ persica Shp. . . . . Nord-Persien.
Mirafra nivosa (Sws) . . . . . Süd-Afrika.
„ apiata (Vieill.) . . . . Süd-Afrika.
„ hova Hartl. . . . . Madagascar.
„ javanica Horsf. . . . . Java.
„ horsfieldi Gould . . . Australien.
„ cantillans Blyth . . . Ostindien.
„ africana Smith . . . . Süd-Afrika.
„ assamica Mc Clell . . Himalaya.
„ erythroptera Jerd . . . Ostindien.
„ affinis Jerd. . . . . Ostindien.
„ microptera Hume . . . . . Birma.
Spizalauda deva (Sykes) . . . . Ostindien.
Galerida cristata (L.), Deutschland, Griechenland.
„ pallida Brehm . . . . Süd-Afrika.
„ macrorhyncha Tristr. . Algerien.
„ arenicola Tristr. . . . . Tunis.
„ brachyura Tristr. . . . Palästina.
„ magna Hume . . . Transcaspien.
„ chendoola (Frankl.) . . Ostindien.
„ thecklae Brehm . . . . . Spanien.
„ superflua Hartert . . . . . Tunis.
„ malabarica (Scop.) . . Ostindien.
Lullula arborea (L.) . . . . Deutschland.
„ pallida Sarudny . . . . . Persien.
Calendula crassirostris (Vieill.), Süd-Afrika.
Ammomanes arenicolor (Sundev.) . Tunis.
„ phoenicura (Frankl.) . . . . . Ostindien.
„ phoenicuroides (Blyth) . . . . . Ostindien.
„ isabellina (Temm.), Palästina.
„ algeriensis Shp. . . . Tunis.
„ grayi Wahlb. . Damaraland.

Ammomanes ferruginea (Smith) . . . . . Süd-Afrika.
Eremopteryx australis (Smith), Transvaal.
„ leucopareia F. & R. . . . . Massailand.
„ grisea (Scop.). . . Ostindien.

Fam. Catamblyrhynchidae.

Fam. Fringillidae.

Geospiza propinqua Ridgw. . . . . Galapagos-Inseln.
„ dubia Gould . Galapagos-Inseln.
„ albemarlei Ridgw. . . . . Galapagos-Inseln.
„ fortis Gould . Galapagos-Inseln.
„ fratercula Ridgw. . . . . Galapagos-Inseln.
„ fuliginosa Gould . . . . Galapagos-Inseln.
„ minor Rothsch. & H. . . . . Galapagos-Inseln.
„ acutirostris Ridgw. . . . . Galapagos-Inseln.
Platyspiza crassirostris Gould . . . Galapagos-Inseln.
Camarhynchus prosthemelas Scl. & S., Galapagos-Inseln.
„ salvini Ridgw., Galapagos-Inseln.
Ligurinus chloris (L.) . . . . Deutschland.
„ aurantiiventris (Cab.) . . . . Spanien, Sizilien.
„ chloroticus Bp. . . . . Palästina.
„ sinicus L. . . . . China.
„ minor (T. & Schl.) . . . Japan.
„ ussuriensis Hart. . . . . Amur.
„ karawahiba (T. & Schl.) . . . Kamtschatka.
Eophona melanura (Gm.) . . . . . China.
„ personata (T. & Schl.) . . Japan.
Coccothraustes coccothraustes (L.) . . . . . Deutschland.
„ japonicus T. & Schl. . . . . Japan.
Mycerobas carneipes (Hodgs.) . . . . Ost-Turkestan.
Perrissospiza icteroides (Vig.) . Kaschmir.
Zamelodia ludoviciana (L.), Nord-Amerika.
„ melanocephala (Sws.) . . . . . Nord-Amerika.
Guiraca caerulea (L.) . . . . Süd-Carolina.
„ lazula (Less.) . . . . . Mexiko.
Cyanocompsa cyanoides (Lafr.), Columbien.
„ cyanea (L.) . . . . Brasilien.
„ argentina (Shp.), Argentina.
„ glancocaeruba d'Orb. . . . . Argentina.
„ parellina (Bp.) . . Yucatan.
Oryzoborus torridus (Scop.) . Brasilien, Venezuela.
„ crassirostris (Gm.) . Amazonia.
Pyrrhulagra grenadensis Cory . . . . . Insel Grenada.
Loxigilla anoxanthus (Gosse) . . Jamaica.
Sporophila hypoleuca (Licht.) . Brasilien.
„ grisea (Gm.) . Columbien, Venezuela.
„ superciliaris (Pelz.) . . . . . Rio Grande.
„ plumbea (Pz. W.) . . Brasilien.
„ telasco (Less.) . . . Ecuador.
„ castaneiventris Cab., Amazonia.
„ parva Lawr. . . . . Mexiko.
„ ruficollis Cab. . . . Argentina.
„ minuta (L.) . . Venezuela, Guayana.
„ nigroaurantia (Bodd.) . . . . Süd-Brasilien.
„ pileata (Scl.) . Süd-Brasilien.
„ melanocephala (V.), Argentina.
„ americana (Gm.) . . Guayana.
„ moreleti (Bp.) . . . Guatemala.
„ caerulescens (Vieill) . . . . Süd-Brasilien.
„ gutturalis (Licht.), Columbien, Venezuela.
„ ocellata (S. & S.), Amazonia, Venezuela.
„ lineola (L.) . . . . . Guayana.
„ luctuosa (Lafr.) . . Columbien.
„ corvina (Scl.) . . . Guatemala.
Melopyrrha nigra (L.) . . . . . Cuba.
Euethia olivacea (L.) . . . . . Cuba.
„ bryanti Ridgw. . . . Puerto Rico.
„ pusilla (Sws.) . . . . Guatemala.
„ canora (Gm.) . . . . . Cuba.
„ bicolor (L.) . . . . Bahama-Inseln.
„ omissa (Jard.), Puerto Rico, Venezuela.

Euethia marchei (Baird) . . Jamaica, St. Berthol.
Volatinia jacarini (L.) . . . . . Brasilien.
„ splendens (Vieill.) . . Chiriqui.
Pyrrhuloxia sinnata Bp., Arizona, Mexiko.
„ texana Ridgw. . . . . Texas.
Cardinalis cardinalis (L.) . . . . Vereinigte Staaten.
„ coccineus Ridgw. . . Yucatan.
„ superbus Ridgw. . . . . Arizona.
„ igneus Baird . . . . Kalifornien.
Caryothraustes poliogaster (Du Bus) . . . Guatemala.
Saltator atriceps Less. . . . . Yucatan.
„ lacertosus Bangs . . . . Chiriqui.
„ medianus Ridgw. . . Guatemala.
„ intermedius (Lawr.) . . Veragua.
„ magnus (Gm.) . . . . . Peru.
„ atripennis Scl. . . West-Ecuador.
„ similis Lafr. & d'O. . . . . Südost-Brasilien.
„ grandis (Licht.) . . . . Yucatan.
„ plumbeiceps Lawr. . . . Mexiko.
„ olivascens Cab. . . . . Venezuela.
„ caerulescens Vieill. . Argentina.
„ azarae d'Orb. . . Nordwest-Peru.
„ aurantiirostris V. . . Argentina.
„ laticlavius S. & S. . . Nord-Chile.
„ atricollis V. . . . . Paraguay.
„ rufiventris Lafr. & d'O., Bolivien.
„ albicollis V. . . . . Dominica.
„ striatipectus Lafr. . . Columbien.
Fringilla teydea Webb. & Berth., Canaren.
„ coelebs L. . . . . Deutschland.
„ maderensis Shp. . . . . Madeira.
„ moreleti Puch. . . . . Azoren.
„ palmae Tristr. . . . . Canaren.
„ canariensis Vieill. . . . Teneriffa.
„ spodiogenys Bp. . . . . Algerien.
„ montifringilla L. . Nord-Europa.
Carduelis carduelis (L.) . . . Deutschland.
„ africana Hartert. . . . . Tunis.
„ major Tacz. . . . Ost-Turkestan.
„ caniceps Vig. . . . . Himalaya.
„ orientalis (Eversm.) . . . Altai.
Spinus xanthogaster (Du Bus), Columbien.
„ stejnegeri Shp. . . . . Bolivien.
„ atratus (d'Orb. & Lafr.), Bolivien.
„ spinus (L.) . . . . . Nord-Europa.
Spinus citrinellus (L.) . . . . Süd-Europa.
„ tottus (Sparrm.) . . . Kapkolonie.
„ barbatus (Mol.) . . . . . Chile.
„ ictericus (Licht.) . . . . . Chile.
„ capitalis (Cab.) . . . . West-Peru.
„ notatus (Du Bus) . . . . . Mexiko.
„ nigriceps (Ruepp.) . . . Ost-Afrika.
„ pinus (Wils.) . . . . Kalifornien.
Hypacanthis spinoides (Vig) . . Himalaya.
Astragalinus tristis (L) . . Nord-Amerika.
„ pallidus (Mearns) . . Mexiko.
„ psaltria (Say), Westl. Nord-Amerika.
„ arizonae (Coues) . . Arizona.
„ mexicanus (Sws.) . . Mexiko.
„ columbianus (Lafr.) . . . . . Venezuela.
„ lawrencei (Cass.), Kalifornien.
Linaria flavirostris (L.) . . . Nord-Europa.
„ brevirostris Moore . . . . . Altai.
„ rufostrigata Walton . . . Thibet.
„ cannabina (L.) . . . Deutschland.
„ fringillirostris (Bp. & Schl) . . . . . Transcaspien.
„ linaria (L.) . . . . . Nord-Europa.
„ holboelli (Brehm) . Nord-Europa.
„ rostrata (Coues) . . . . Grönland.
„ rufescens (Vieill.) . . . England.
„ exilipes (Coues) . . . . Schweden.
„ hornemanni (Holboell), Grönland.
Montifringilla nivalis (L.) . . . Schweiz.
„ alpicola (Pall.), Kaukasus.
„ altaica (Eversm.), Kaschmir.
„ arctoa (Pall.) . . . Sibirien.
„ griseinucha (Brandt) . . . . . Alaska.
Rhodopechys sanguinea (Gould) . . . Ost-Turkestan.
Rhodospiza obsoleta (Licht.) . . . . . Transcaspien.
Erythrospiza githaginea (Licht.), Tunis.
„ amantum Hartert, Canaren.
„ mongolica (Swinh.) . . Central-Asien.
Petronia petronia (L.) . . . . Süd-Europa.
„ barbara Erlanger . . . Algerien.
„ intermedia Hartert . Turkestan.
„ brevirostris Tacz. . . . . Sibirien.
„ puteicola Festa . . . . Palästina.

Petronia maderensis Erlanger . Madeira.
„ superciliaris Blyth, Kapkolonie.
Gymnorhis flavicollis (Frankl.), Ostindien.
Carpospiza brachydactyla (Bp.), Palästina.
Passer montanus (L.) . . . . Deutschland.
„ saturatus Stejn . . . Amur, Liu-Kiu-Inseln.
„ malaccensis Dubois . . . . . Java
„ dilutus Richmond, Ost-Turkestan.
„ domesticus (L.) . . . . . Deutschland, Sibirien.
„ tingitanus Loche . . . . Algerien.
„ indicus Jard. & S. . . . . Ostindien.
„ pyrrhonotus Blyth. . . . . Punjab.
„ italiae (Vieill.). . . . Süd-Europa.
„ griseigularis Shp. . . Mandschurei.
„ hispaniolensis (Temm.), Griechenland, Spanien.
„ flückigeri Kleinsch. . . . . Biskra.
„ cinnamomeus (Gould), Kaschmir.
„ rutilans Temm. . . . China, Japan.
„ flaveolus Blyth . . . . . , Birma.
„ melanurus (S. Müll.), Süd-Afrika.
„ moabiticus Tristr. . . . . Palästina.
„ yatei Shp. . . . . Persien.
„ jagoensis (Gould) . . Kap Verden.
„ molitensis Smith . . . Süd-Afrika.
„ ruficinctus F. & R. . . . Massailand.
„ ammodendri Severtz. . Turkestan.
„ simplex (Licht.) . . . . Erythraea.
„ saharae Erlanger . . . . Algerien.
„ griseus (Vieill.) . . . West-Afrika.
„ suahelicus Reichn. . . . . Deutsch-Ost-Afrika.
„ diffusus (Smith). . . . . Östl. Süd-Afrika.
„ swainsoni (Rüpp.), Nordost-Afrika.
Alario alario (L.) . . . . . Kapland.
Auripasser luteus (Licht.), Nordost-Afrika.
„ euchlorus Bp. . . Süd-Arabien.
Poliospiza albigularis (Smith), Kapkolonie.
„ leucopygia (Sundev.), Nordost- und West-Afrika.
„ gularis (Smith) . . Süd-Afrika.
„ tristriata (Rüpp.) . . Marangu.
Serinus canicollis (Sws.) . . . Kapkolonie.
„ sulphuratus (L.) . . . Kapkolonie.
„ flaviventris (Sws.) . . Kapkolonie.
„ icterus (Vieill.), Süd-Afrika, Togo.
Serinus maderaszi Reichn. . . Mikindani.
„ hartlaubi (Bolle) . . West-Afrika.
„ serinus (L.) . . . . . Süd-Europa.
„ canarius (L.) . . . . . Canaren.
„ syriacus (Bp.) . . . . . Palästina.
„ pusillus (Pall.) . . . . Turkestan.
Sycalis flaveola (L.). . . . . Brasilien.
„ columbiana Cab. . . . Venezuela.
„ pelzelni Scl. . . . . Paraguay.
„ arvensis Kittl. . . Uruguay, Chile.
Carpodacus erythrinus (Pall.) . . Sibirien.
„ roseatus (Hodgs.) . . . Altai.
„ severtzovi Shp., Ost-Turkestan.
„ purpureus (Gm.) . . Östl. Nord-Amerika.
„ californicus Baird., Kalifornien
„ cassini Baird . . Neu-Mexiko.
„ roseipectus Shp. . Guatemala.
„ mexicanus (S. Müll.) . Mexiko.
„ rhodocolpus Cab. . . . Kalifornien, Texas.
„ ruberrimus Ridgw. . . . . Kalifornien.
„ frontalis (Say) . . Vereinigte Staaten.
„ amplus Ridgw. . . Kalifornien.
Propasser rhodochlamys (Brandt) . . . . Ost-Turkestan.
„ pulcherrimus Hodgs. . Thibet.
„ rhodochrous (Vig.), Kaschmir.
„ thura Bp. & Schl. . . . Sikkim.
„ waltoni Shp. . . . . Süd-Thibet.
Loxia curvirostra L., Lappland, Schweden.
„ albiventris Swinh. . . . Turkestan.
„ himalayensis Blyth . . . Himalaya.
„ pityopsittacus Borkh. . Schweden.
„ bifasciata (Brehm) . . Archangelsk.
„ leucoptera Gm. . . . Nord-Amerika.
Pyrrhula pyrrhula (L.) . . . Nord-Europa.
„ kamtschatica Tacz., Kamtschatka.
„ europaea Vieill. . . Deutschland.
„ griseiventris Lafr. . . . . Japan.
„ rosacea Seebohm . . . . . Japan.
Pinicola enucleator (L.). . . Nord-Europa.
„ kamtschatkensis Tacz. . . . . Kamtschatka.
„ canadensis Cab. . Nordöstl. Vereinigte Staaten.
Uragus sibiricus (Pall.) . . . . . Sibirien.

Uragus sanguinolentus (T. & Schl.) . . . . . Sibirien.
Pyrrhulorhyncha pyrrhuloides (Pall.) . . . . Caspisee.
„ palustris (Savi) . . . Süd-Europa.
Emberiza schoeniclus (L.) . Deutschland.
„ pallasi (Cab.) . . . Ost-Sibirien.
„ pusilla Pall. . . . . Sibirien.
„ yessoensis (Swinh.) . . . Japan.
„ rustica Pall. . . . . Sibirien
„ fucata Pall. . . . . Amur.
„ elegans Temm. . . . . Amur.
„ flaviventris (Steph.) . . . . . Süd-Afrika.
„ melanocephala Scop. . . . . Griechenland.
„ luteola Sparrm. . Central-Asien.
„ aureola Pall. . . . . Sibirien.
„ rutila Pall . . . . . Amur.
„ citrinella L. . . . Deutschland.
„ sulphurata T. & Schl. . . Japan.
„ personata Temm. . . . . Japan.
„ spodocephala Pall. . . . Sibirien.
„ cirlus L. . . . . Süd-Europa.
„ cinerea Strickl. . . . . Smyrna.
„ hortulana L. . . . Deutschland.
„ buchanani Blyth . . . . . Altai.
„ caesia Cretzschm., Griechenland.
„ stewarti (Blyth) . . . Himalaya.
„ cia L. . . . . Süd-Europa.
„ stracheyi Moore, Central-Asien.
„ godlewskii Tacz. . . Turkestan.
„ cioides Brandt . . . . . Amur.
„ castaneiceps Moore . Baikalsee.
„ ciopsis Bp. . . . . Japan.
„ tristrami Swinh. . . . . Amur.
„ leucocephala Gm. . . . Sibirien.
Miliaria miliaria (L.) . . . . Deutschland.
„ thanneri Tschusi . . . . Teneriffa.
Fringillaria capensis (L.) . . . Süd-Afrika.
„ tahapisi (Smith) . Ost- u. Süd-Afrika.
„ striolata (Licht.) . . . Nordost-Afrika.
„ saharae (Tristr.) . . . . Tunis.
Melophus melanicterus (Gm.) . . Sikkim.
Plectrophenax nivalis (L.) . Nord-Europa, Nord-Amerika.
Plectrophenax townsendi Ridgw. . . Nord-Sibirien.
Calcarius lapponicus (L.) . . Nord-Europa.
„ pictus (Sws.) . . Nord-Amerika.
„ ornatus (Towns.), Nord-Amerika.
Rhynchophanes maccowni (Lawr.) . Nord-Amerika.
Calamospiza melanocorys Stejn. . . . . Nord-Amerika.
Spiza americana (Gm.) . . Nord-Amerika.
Chondestes grammacus (Say) . . Östl. Vereinigte Staaten.
„ strigatus (Sws.) . . Montana.
Pooecetes gramineus (Gm.) . . . . . Nord-Amerika.
„ confinis Baird . . . . Montana.
„ affinis Müller . . . . . Oregon.
Passerculus sandwichensis (Gm.) . Alaska.
„ savanna (Wils.) . Östl. Nord-Nmerika.
„ alaudinus (Bp.) . . Nordwest-Amerika.
„ beldingi Ridgw. . . Colorado.
„ rostratus (Cassin) . . . . . Kalifornien.
„ guttatus (Lawr.) . . . Süd-Kalifornien.
Centronyx bairdi (Aud.) . Nord-Amerika.
Coturniculus passerinus (Wils.) . . . Nord-Amerika.
„ bimaculatus (Sws.) . . Jowa.
Ammodromus maritimus (Wils.) . . Östl Vereinigte Staaten.
„ peninsulae Allen . Florida.
„ candacatus (Gm) . . Östl. Vereinigte Staaten.
„ subvirgatus Dwight . . . . . Michigan.
„ henslowi (Aud.) . Östl. Vereinigte Staaten.
Myiospiza manimbe (Licht.) . . . Süd-Brasilien.
Plagiospiza superciliosa (Sws.) . . Mexiko.
Haemophila carpalis Coues . . . . Arizona.
„ rufescens (Sws.) . Guatemala.
„ ruficeps (Cass.) . . Kalifornien.
„ cassini Woodh. . . . . Texas.
„ aestivalis (Licht.) . . Georgia.
„ bachmanni (Aud.) . . . . . Süd-Carolina.
„ botterii (Scl.) . . . . Mexiko.

Rhynchospiza stolzmanni (Tacz.) . . Peru.
Amphispiza bilineata (Cass.) . . . Arizona.
„ deserticola Ridgw. . . . Texas.
„ belli (Cass.) . . . Kalifornien.
Poospiza melanoleuca (d'Orb & Lafr.) . . . . . Argentina.
„ cinerea Bp. . . . Minas-Geraes.
„ personata (Sws.) . . Argentina.
„ lateralis (Nordm.) . . . Südost-Brasilien.
„ assimilis Cab. . . . Rio Grande, Uruguay.
Junco hyemalis (L.) . . . . Nord-Amerika.
„ oregonus (Towns.) . . . Kalifornien.
„ thurberi Anthony . . . Kalifornien.
„ caniceps (Woodh.) . . . Westl. Vereinigte Staaten.
„ phaeonotus Wagl. . . . . Mexiko.
„ dorsalis Henry . . . . . Arizona.
Spizella monticola (Gm.) . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ socialis (Wils.), Östl. Vereinigte Staaten.
„ arizonae Coues . . . Westl. Nord-Amerika.
„ pusilla (Wils.), Östl Vereinigte Staaten.
„ arenacea Chadbourne . Nebraska.
„ atrigularis (Cab.) . . Kalifornien.
„ pallida (Sws.) . . . Nord-Amerika.
„ breweri Cass. . . . Nord-Amerika.
Zonotrichia coronata (Pall.) . . . . Oregon.
„ leucophrys (Forster), Labrador.
„ gambeli (Nuttall) . . . Alaska.
„ nuttalli Ridgw. . . Kalifornien.
„ albicollis (Gm.) . . Östl. Nord-Amerika.
Brachyspiza pileata (Bodd.), Süd-Brasilien, Argentina, Bolivien.
„ peruviana (Less.), Venezuela.
„ whitei Shp. . . . Argentina.
„ strigiceps (Gould), Argentina.
„ canicapilla (Gould) Patagonien.
Melospiza melodia (Wils.), Nord-Amerika.
„ montana (Henshaw), Washington-Inseln.
„ fallax (Baird) . . Kalifornien.
„ heermanni Baird . Kalifornien.
„ cooperi Ridgw. . . Kalifornien.
„ samuelis (Baird) . Kalifornien.
Melospiza rufina (Bp.) . . . . . Alaska.
„ lincolni (Aud.) . Nord-Amerika.
„ georgiana (Lath.) . . Östl. Nord-Amerika.
Passerella iliaca (Merrem) Nord-Amerika.
„ analaschensis (Gm.) . . Alaska.
„ townsendi (Aud.) . . . . Vancouver-Insel.
„ schistacea Baird . Kalifornien.
Passerina cyanea (L.), Östl. Nord-Amerika.
„ amoena (Say) . . . Kalifornien.
„ ciris (L.) . Südl. Vereinigte Staaten.
„ versicolor (Bp.) . Nord-Amerika.
Oreospiza chlorura (Townsend) . . . Kalifornien.
Pipilo macronyx Sws. . . . . Mexiko.
„ maculatus Sws. . . . . Mexiko.
„ arcticus (Sws.) . . . . . Montana.
„ megalonyx Baird . . . Kalifornien.
„ oregonus Bell. . . . . Oregon.
„ erythrophthalmus (L) . . . Östl. Vereinigte Staaten.
„ alleni Coues . . . . . Florida.
„ aberti Baird. . . . . Neu-Mexiko.
„ fuscus Sws. . . . . Mexiko.
„ mesoleucus Baird . . . . Arizona.
„ albigula Baird . . Süd-Kalifornien.
„ crissalis (Vig.) . . . . Kalifornien.
Melozone cabanisi (S. & S.) . Costa Rica.
„ biarcuatum (Prévest) Guatemala.
Saltatricula multicolor (Burm.) Argentina.
Arremonops rufivirgatus (Lawr.) . . Texas.
„ crassirostris Ridgw. . Mexiko.
„ chloronotus (Salv.) Yucatan.
„ conirostris (Bp.) . . Chiriqui.
„ venezuelensis Ridgw. . . . . Venezuela.
Embernagra platensis (Gm.) . . . . . Süd-Brasilien.
Coryphospiza albifrons (V.) . . Argentina.
Emberizoides macrurus (Gm.), Venezuela.
„ herbicola (Vieill.), Brasilien.
Pseudochloris luteicephala (d'O. & Lafr.) . . Bolivien.
„ uropygialis (d'O. & Lafr.) . . . . Peru.
Phrygilus gayi (Eydoux & Gervais) . . . . . Süd-Chile

Phrygilus melanoderus (Quoy & Gaim.) . . Falklands-Inseln.
„ fruticeti (Kittl.) . . Patagonien.
„ unicolor (d'Orb. & Lafr.) . . . . . Ecuador.
„ plebeius Cab. . . . . Bolivien.
Haplospiza unicolor Cab., Südost-Brasilien.
Diuca diuca (Mol.) . . . . . Chile.
„ minor Bp. . . . . Patagonien.
Coryphospingus cristatus (Gm.), Paraguay.
„ pileatus (Pz. W.) . . . Venezuela.
Rhodospingus cruentus (Less.). Ecuador.
Paroaria cucullata (Lath.) . . Argentina.
„ larvata (Bodd.) . . . . Uruguay.
„ capitata (d'Orb. & Lafr.) . . . . . Argentina.
„ nigrigenis (Lafr.) . . Venezuela.
Gubernatrix cristata (Vieill.). Argentina.
Arremon spectabilis Scl. . . Columbien.
„ semitorquatus Sws. . . . . Südost-Brasilien.
Lysurus castaneiceps (Scl.) . . Columbien.
Atlapetes gutturalis Lafr. . . Guatemala.
Buarremon brunneinucha (Lafr.). . . . . Venezuela.
„ latinucha Du Bus . . . . Peru.
„ castaneifrons S. & S., Venezuela.

Fam. Coerebidae.

Coereba bahamensis (Reichb.) . . . . . Bahama-Inseln.
„ luteola Cab. . . . . Venezuela.
„ chloropyga Cab. . Süd-Brasilien.
„ portoricensis Bryant Puerto Rico.
„ flaveola (L.) . . . . . Jamaica.
„ saccharina Lawr. . Insel Grenada.
„ dominicana Taylor . . . Dominica.
„ newtoni Baird . . . . . St. Croix.
„ welsi Cory . . . . Insel Grenada.
Diglossa sittoides (d'O. & Lafr.) Venezuela.
„ gloriosa S. & S. . . . Venezuela.
„ albilateralis Lafr. . . Columbien.
„ personata (Fraser) . Columbien.
Diglossopis careulescens Scl., Columbien.
Conirostrum cinereum (d'Orb. & Lafr.). . . . Chile.
Dacnis cayana (L.) . . . . Süd-Brasilien.
Cyanerpes cyaneus (L.) . . . . . Cuba.
Cyanerpes caeruleus (L.) . . . . Bolivien.
Chlorophanes spiza (L.) . . . . . Amazonia.

Fam. Procniatidae.

Procnias viridis Illig . . Südost-Brasilien.

Fam. Tanagridae.

Chlorophonia longipennis (Du Bus) . . . . . Bolivien.
„ pretrei (Lafr.) . Venezuela.
„ occipitalis (Du Bus), Mexiko.
Euphonia elegantissima (Bp.). Costa Rica.
„ affinis (Less.). . . . . Yucatan.
„ violacea (L.) Südost.-Brasilien.
„ hirundinacea Bp. . . . Yucatan.
„ chalybea (Mikan) . . . . Südost-Brasilien.
Tanagrella velia (L.) . . . . . Surinam.
Calospiza tricolor (Gm.), Südost-Brasilien.
„ guttata (Cab.) . . . Venezuela.
„ cayana (L.) . . . . . Venezulea.
„ cucullata (Sws.), Insel Grenada.
„ boliviana (Bp.) . . . . Amazonia.
„ gyroloides (Lafr.) . . . Chiriqui.
„ nigriviridis (Lafr.) . Columbien.
„ cabanisi (Scl.) . . . Guatemala.
„ larvata (Du Bus). . . Honduras.
„ cyanoptera (Sws.) . Venezuela.
Stephanophorus leucocephalus (V.) . . Südost-Brasilien.
Compsocoma sumptuosa (Less.), Venezuela.
Tanagra episcopus L. . . . . Guayana.
„ coelestis Spix . . . . . Peru.
„ sclateri Berlepsch . . . Trinidad.
„ cana Sws. . . . . Venezuela.
„ diaconus Scl. . . . . Chiriqui.
„ cyanoptera (Vieill.), Argentinien.
„ sayaca L. . . . . Südost-Brasilien.
„ palmarum Pz. W. . . . Guayana.
„ melanoptera Scl. . . . Bolivien.
„ ornata Sparrm. . Südost-Brasilien.
„ abbas Licht. . . . . Guatemala.
„ bonariensis (Gm.) . Argentinien.
„ darwini Bp. . . . . Bolivien.
Sporothraupis cyanocephala (d'O. & Lafr.) . . Bolivien.
„ auricrissa (Scl.), Venezuela.
Spindalis pretrei (Less.) . . . . . Cuba.
Rhamphocoelus brasilius (L.) . . . . Ost-Brasilien.

Rhamphocoelus nigrigularis (Spix) . . . . . Amazonia.
„ dimidiatus Lafr. . . . . Columbien.
„ jacapa (L.) . . . Amazonia, Guayana, Venezuela.
„ atrosericeus Lafr. & d'O. . . . . Peru.
„ passerinii Bp. . . Chiriqui.
„ flammigerus (Jard. & S.) . Columbien.
„ chrysonotus Lafr. . . . . Columbien.
„ icteronotus Bp., Columbien.
Phlogothraupis sanguinolenta (Less) . . . . Guatemala.
Pyranga aestiva (L.) . . . Nord-Amerika.
„ testacea Scl. & Salv. . . . Peru.
„ hepatica Sws. . . . . Arizona.
„ rubra L. . . . . Nord-Amerika.
„ ardens (Tsch.) . . . . Venezuela.
„ bidentata Sws . . . . Costa Rica.
„ ludoviciana (Wils.) Nord-Amerika.
Phoenicothraupis rubica (V.) . . Südost-Brasilien.
„ gutturalis Scl. . . . . Columbien.
Tachyphonus rufus (Bodd.) . . Venezuela, Süd-Brasilien.
„ luctuosus Lafr. & d'O. . . Venezuela.
„ coronatus (V.) . . . Südost-Brasilien.
Eucometis cristata (Du Bus) . Columbien.
Trichothraupis melanops V. . . . . Südost-Brasilien.
Cypsnagra ruficollis (Licht.), Matto Grosso.
Pyrrhocoma ruficeps (Strickl.), Rio Grande.
Lamprotes loricatus (Licht.), Ost-Brasilien.
Chlorospingus albitempora (Lafr.) . . . . . Çosta Rica.
„ flavipectus (Lafr) . . . . . Columbien.
Cissopis leveriana (Gm.) . . . . Bolivien.
„ major Cab. . . . Südost-Brasilien.
Schistochlamys capistrata (Þz. W.) Südost-Brasilien.

Fam. Ploceidae.

Vidua serena L. . . . . Kapland.
Steganura paradisea (L.) . . . . . Guinea.
Diatropura procne (Bodd.) . . Transvaal.
Coliostruthus ardens (Bodd.) . . Kapland.
„ laticauda (Licht.) . . . . . Massailand.
„ albonotata (Çass.) . . Natal.
Penthetriopsis macrura (S. Müll.) . . West-Afrika.
Urobrachya axillaris (Smith) . . . . Natal.
„ phoenicea (Heugl.), Sansibar.
Pyromelana flammiceps (Sws.), Ost- und West-Afrika.
„ sylvatica Neum. . . . Kongo.
„ nigriventer (Çass.), Ost-Afrika.
„ orix (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ franciscana (Isert) . . . . . West-Afrika.
„ diademata (F. & R.), Pangani.
„ capensis (L.) . . . . Kapland.
„ xanthomelaena (Rüpp.) . . . . Südost-Afrika.
„ taha (Smith) . . . Süd-Afrika.
„ afra (Gm.) . . . West-Afrika.
Ploceipasser mahali Smith . . Kapkolonie.
„ ansorgei Hart. . Mossamedes.
„ melanorhynchus Rüpp. . Deutsch-Ost-Afrika.
Pseudonigrita arnaudi Bp. . . Massailand.
Pyrenestes ostrinus (Vieill.) . . . . Togo.
„ coccineus Cass . . . . Liberia.
Quelea erythrops (Hartl.) . . West-Afrika.
„ quelea (L.) . . . . . West-Afrika.
„ cardinalis (Hartl.) . . . . . Ladó.
Lepidopygia bicolor (Fraser), West-Afrika.
„ nigriceps (Cass.) . Sansibar.
„ nana (Pucher.) . Madagascar.
Spermestes cucullatus Sws., West-Afrika.
„ scutatus (Heugl.) . Ost-Afrika.
Amauresthes fringilloides (Lafr.), Ost- u. West-Afrika.
Ortygospiza atricollis (V.) . West-Afrika.
Lagonosticta senegala (L.) . West-Afrika.
„ brunneiceps Shp. . . . . Ost-Afrika.
„ rufopicta (Fraser) . . . Senegambien.
„ rhodoparia Heugl. . . . . Nyassa-See.
Stictospiza formosa (Lath.) . . . Ostindien.
Amadina fasciata (Gm.) . . . West-Afrika.
„ erythrocephala (L.) . Süd-Afrika.

Steganopleura guttata (Shaw), Australien.
Zonaeginthus bellus (Lath) . . Australien.
„ oculatus (Quoy & Gaim) . West-Australien.
Zonogastris melba (L.) . . . Deutsch-Ost-Afrika.
Pytelia phoenicoptera Sws.. Senegambien.
„ afra (Gm.) . . . . . Nyassa-See.
Coccopygia dufresnei (Vieill.), Kapkolonie.
Hypochaera ultramarina (Gm.) . . Nubien.
Taeniopygia castanotis Gould, Australien.
Stizoptera bichenovii (Vig. & H.) . . . . . Australien.
„ annulosa Gould . Nordwest-Australien.
Sporaeginthus amandava (L.) . . Ostindien.
„ flaviventris (Wall.) . . . . . Birma.
„ subflavus (Vieill.) . . . West-Afrika.
Munia orizivora (L.) . . . Java, Sumatra.
„ malacca (L.) . . . . . Ostindien.
„ ferruginosa (Sparrm.) . . . . Java.
„ maja (L.) . . . . . Sumatra.
„ atricapilla (Vieill.) . . . Ostindien.
„ brunneiceps Wald. . . . . Borneo.
„ castaneithorax (Gould) . . . . . Nord-Australien.
„ sharpei (Madar.) . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ nigriceps (Ramsay) . Neu-Guinea.
„ spectabilis Scl. . . . Neu-Pommern.
„ forbesi Scl. . . . Neu-Mecklenburg.
„ melaena Scl. . . . . Neu-Pommern.
„ punctulata (L.) . . . . . Ostindien.
„ topela Swinh. . . . . Formosa.
„ nisoria (Temm.) . . . . . Celebes.
Uroloncha acuticauda (Hodgs.) . Ostindien.
„ squamicollis Shp. . . . . China.
„ striata (L.) . . . . . Ostindien.
„ fumigata (Wall.), Andamanen.
„ leucogaster (Blyth) . Malakka.
„ everetti (Tweedd.) . Mindanao.
„ leucogastroides (Horsf. & M.) . . . . . Java.
„ fuscans (Cass.) . . . . . Borneo.
„ pectoralis (Jerd.) . Süd-Indien.
„ kelaarti (Jerd) . . . . Ceylon.
„ molucca (L.), Amboina, Batjan.
„ propinqua Shp. . . . . Celebes.
Aidemosyne modesta (Gould), Australien.
„ malabarica (L.) . . Ostindien.
„ cantans (Gml.) . Ost-Afrika.
Aegintha temporalis (Lath.) . Australien.
Bathilda ruficauda (Lath.) . . Australien.
Poëphila acuticauda (Gould) . . . . Nord-Australien.
„ nigrotecta Hartert . Queensland.
„ cincta (Gould) . . . . Australien.
„ personata Gould . . . Queensland.
„ leucotis Gould . Nord-Australien.
„ gouldiae (Gould) . . Queensland.
„ mirabilis Des Murs . . . Nord-Australien
Erythrura prasina (Sparrm.) . . . . Java.
„ psittacea (Gml.) . . . . Neu-Caledonien.
„ pealei Hartl. . . . . Viti-Inseln.
„ cyanovirens (Peale) . . . . . Samoa-Inseln.
„ trichoa (Kittl.) . . Insel Ruk.
Chlorura hyperythra Reichb. . . . . Java.
Neochmia phaeton (Hombr. & J.) . . . Queensland.
Estrilda astrilda (L.) . . . . . Süd-Afrika.
„ minor (Cab.) . . . . . Erythraea.
„ cinerea (Vieill.) . . West-Afrika.
„ larvata (Rüpp.) . Nordost-Afrika.
„ caerulescens (V.) . West-Afrika.
Granatina ianthinogaster Reichn. . . . . Erythraea.
Uraeginthus phoenicotis Sws. . Senegambien, Nyassa-See.
„ angolensis (L.) . . Deutsch-Ost-Afrika.
Sporopipes squamifrons (Smith) . . . . . Süd-Afrika.
„ frontalis (Daud.) . . . . Ladó.
Textor albirostris (V.) . . Nordost-Afrika.
„ senegalensis Shelley West-Afrika.
„ intermedius Cab.. . . . Somaliland.
„ niger (Smith) . . . . Damaraland.
Dinemellia dinemelli (Rüpp.) . . . . . Galla-Land.
Malimbus rubricollis (Sws.), West-Afrika.
„ malimbicus (Daud.) . . . . . West-Afrika.
„ scutatus (Cass.) . . . Kamerun.
Anaplectes melanotis (Lafr.) . . . . Ladó.
Sycobrotus kersteni F & H.. Ost-Afrika.

Sycobrotus stictifrons (F. & Reichn.). Deutsch-Ost-Afrika.
„ bicolor (Vieill.). Kapkolonie.
Othyphantes emini (Hartl.), Abessinien.
„ reichenowi (Fischer) Deutsch-Ost-Afrika.
Heteryphantes nigricollis (V.) . . . . . West-Afrika.
„ melanoxanthus (Cab.) . . . . . Ost-Afrika.
Hyphanturgus ocularius (Smith) . . . . Kapkolonie
„ crocatus (Hartl.) . . . Nyassa-Land.
„ brachypterus (Sws.) Guinea.
„ aurantius (Vieill.), Guinea.
Melanopteryx nigerrima (V.), West-Afrika.
„ castaneofasca (Less.) . . . . West-Afrika.
Hyphantornis abyssinicus (Gm.) . . . . . Abessinien.
„ femininus O. Grant, Uganda.
„ bohndorffi (Reichn.), Kongo.
„ cucullatus (S. Müll.) . . West-Afrika.
„ collaris (Vieill.) . . . West-Afrika.
„ nigriceps Layard . . . . . Ost-Afrika.
„ spilonotus (Vig.) . . . . . Süd-Afrika.
Sitagra jacksoni Shelley . . . . . Uganda.
„ dimidiata Antin. . . . Ost-Afrika.
„ fischeri (Reichn.) . . . Ost-Afrika.
„ capitalis (Lath.) . . Süd-Nigeria
„ melanocephala (L.), West-Afrika.
„ intermedia (Rüpp.) . . . Sansibar.
„ cabanisi Peters . . . . Ost-Afrika.
„ pelzelni (Hartl.) . . . Ost-Afrika.
„ monacha Shp . . . . West-Afrika.
„ luteola (Licht.), West- und Ost-Afrika.
„ bertrandi Shelley . . Nyassa-Land.
„ velata (Vieill.) . . . . Kapkolonie.
„ finschi Reichn., Süd-West-Afrika.
„ vitellina (Licht.), Nord-Ost-Afrika, Senegal.
„ reichardi (Reichn.) . . Ost-Afrika.
„ capensis (L.) . . . . . Kapland.
„ olivacea (Hahn) . . . . Kapkolonie.
Sitagra xanthops Hartl. . . . . Uganda.
„ jamesoni Shp. . . Süd-Ost-Afrika.
„ subaurea (Smith) . . Damaraland.
„ aureiflava (Smith) . . . Sansibar.
„ bojeri Finsch & Hartl., Ost-Afrika.
„ xanthoptera F. & H., Nyassa-See.
„ galbula (Rüpp.) . . . . Abessinien.
„ castanops (Shelley) . . . . Uganda.
Foudia madagascariensis (L.) . . . Madagascar, Mauritius.
Nelicurvius nelicourvi (Hartl.) . . . . . Madagascar
Ploceella javanensis (Less.), Java, Pegu.
Ploceus baya Blyth . . . . . Ostindien.
„ atrigula (Hodgs.) . . . . Himalaya.
„ bengalensis (L.) . . . Süd-Indien.
„ manyar (Horsf.) . . . . Ostindien.
Amblyospiza albifrons (Vig.), Transvaal.
„ unicolor (F. & R.) . . . . Ost-Afrika
„ melanonota (Heugl.), Ladó.
„ capitalba (Bp.), West-Afrika.
Spermospiza haematina (V.) . . . Guinea.

Fam. Icteridae.

Zarhynchus wagleri (Gray) . . Guatemala.
Gymnostinops montezumae (Less.) . . . . . Costa Rica.
„ guatimozinus (Bp.) . . . . . Columbien.
Ostinops decumanus (Pall.) . . Venezuela.
„ salmoni Scl. . . . . Columbien.
Cacicus persicus (L.) . . . . . Amazonia.
„ flavicrissus Scl. . . . . Ecuador.
„ vitellinus Lawr. . . . Columbien.
„ albirostris Vieill. . . . Rio Grande.
„ haemorrhous (L.) . . Süd-Brasilien.
Amblycercus solitarius (V.), Argentinien.
„ holosericeus (Licht.) . . . . . Yucatan.
Cassiculus melanicterus (Bp.) . . Mexiko.
Cassidix oryzivora (Gm.) . . . . Brasilien.
Dolichonyx oryzivorus (L.), Nord-Amerika.
Tangarius involucratus Less. . . Yucatan.
„ aeneus (Wagl.) . . . . Mexiko.
Molothrus ater (Bodd.) . . Nord-Amerika.
„ obscurus (Gm.) . . . . Mexiko.
„ bonariensis (Gm.) . . . . . Süd-Brasilien.

Molothrus purpurascens (H. & K.), Peru.
„ atronitens Cab. . . Venezuela.
„ cassini Finsch . . . Venezuela.
„ rufo-axillaris Cass. . . . . Süd-Brasilien.
„ badius (Vieill.) . Argentinien.
Agelaeus phoeniceus (L.) . Nord-Amerika.
„ sonoriensis Ridgw., Kalifornien.
„ neutralis Ridgw. . . Kalifornien.
„ tricolor (Aud.) . . . Kalifornien.
„ humeralis (Vig.) . . . . . Cuba.
„ xanthomus (Scl.) . Puerto Rico.
„ thilius (Mol.) . Chile, Uruguay.
„ cyanopus (Vieill.) . Argentina.
„ icterocephalus (L.) . Venezuela.
„ flavus (Gm.) . . . . . Uruguay.
„ ruficapillus (Vieill.), Argentina.
Leistes guianensis (L.) . . . . . Surinam.
„ superciliaris (Bp.) . . Argentina.
Xanthocephalus xanthocephalus (Bp.) . . Nord-Amerika.
Amblyrhamphus holosericeus (Scop.) . Buenos Ayres.
Pseudoleistes guirahuro (V.) . . . . . Süd-Brasilien.
„ virescens (V.) . Argentina.
Curaeus aterrimus (Kittl.) . . . . . Chile.
Trupialis militaris (L.) . . . . . Chile.
„ bellicosa (De Fil.) . . Bolivien.
„ defilippii Bp. . . . Argentina, Uruguay.
Sturnella magna (L.) . . . Nord-Amerika.
„ mexicana Scl. . . . . Mexiko.
„ inexpectata Ridgw.. Guatemala.
„ neglecta Aud. . . . Kalifornien.
„ hippocrepis (Wagl.) . . . Cuba.
„ meridionalis Scl. . . Venezuela.
Icterus baltimore (L.). . . Nord-Amerika.
„ bullocki Sws. . . . . Kalifornien.
„ spurius (L.), Östl. Nord-Amerika.
„ pyrrhopterus (V.) . . . Argentina.
„ chrysocephalus (L.) . Venezuela.
„ cayanensis (L.) . . . . . Guayana.
„ dominicensis (L.) . San Domingo.
„ portoricensis Bryant Puerto Rico.
„ wagleri Scl. . . . . Guatemala.
„ prosthemelas (Strickl.) . Yucatan.
„ parisorum (Bp.) . . . Kalifornien.
„ melanocephalus (Wagl.) . Mexiko.
Icterus auduboni Giraud . . . . . Mexiko.
„ cucullatus Sws. . . . . Kalifornien, Yucatan.
„ sennetti Ridgw. . . . . Texas.
„ nelsoni Ridgw. . . . . Arizona.
„ auricapillus (Cass.) . . Venezuela.
„ mesomelas (Wagl.) . . Guatemala.
„ giraudi (Cass.) . . . Guatemala, Yucatan.
„ xanthornus (Gm.). . . Columbien.
„ auratus Bp. . . . . Yucatan.
„ gularis (Wagl.) . . . Yucatan, Guatemala.
„ sclateri Cass. . . . . Guatemala.
„ spectoralis (Wagl.) . . Guatemala.
„ pustulatus (Wagl.) . . . . Mexiko.
Lampropsar tanagrinus (Spix) . . . Peru.
Euphagus carolinus (S. Müll.) . . . Nord-Amerika.
„ cyanocephalus (Wagl.). . . . . Kalifornien.
Dives dives (Licht.). . . . . Yucatan.
„ warcewiezi (Cab.) . . . . . Peru.
Quiscalus quiscalus (L.) . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ aglaeus Baird . . . . . Florida.
„ aeneus Ridgw. . Nord-Amerika.
Megaquiscalus major Vieill. . . . Florida.
„ macrurus Sws.. Guatemala.
„ graysoni Cass. . . Mexiko.
„ assimilis Scl. . . . . Peru.
„ tenuirostris Sws. . Mexiko.
Holoquiscalus gundlachi Cass. . . . Cuba.
„ jamaicensis (Daud.) . . . . . Jamaika.
„ brachypterus Cass. . . . . Puerto Rico.
„ fortirostris Lawr. . . . Insel Barbados.
„ luminosus Lawr. . . . Insel Grenada.
„ lugubris Sws. . Venezuela.
Hypopyrrhus pyrypogaster (De Tarr.) . . . Columbien.
Gnorimopsar chopi (Vieill.) . . Argentina.

Fam. Sturnidae.

Sturnus vulgaris L. . . . . Deutschland.
„ faroënsis Feilden. Faroer-Inseln.
„ menzbieri Shp. . . . Mandschurei.

Sturnus indicus Hodgs. . . . . Kaschmir.
„ poltoratzskii Finsch . . . . Altai.
„ caucasicus Lorenz . . . Kaukasus.
„ purpurascens Gould . Turkestan.
„ porphyronotus Shp. . . . . Nördl. Mongolei.
„ unicolor Temm. . . . . Spanien.
Spodiopsar cineracens Temm. . . Sibirien.
„ burmanicus (Jerd.) . . . Birma.
„ andamanensis (Beavan) . . . . Andamanen.
„ malabaricus (Gm.). . Ostindien.
„ nemoricolus (Jerd.). . . Pegu.
„ blythi (Jerd.) . . . Südindien.
Sturnopaster jalla (Horsf.) . . . . . Java.
„ contra (L) . . . . Ostindien.
„ superciliaris Blyth . . Pegu.
Creatophora carunculata (Gm.). . . . . Süd-Afrika.
Pastor roseus (L.), Süd-Europa, Kleinasien.
Sturnia sinensis (Gm.) . . . . . Amoy.
„ violacea (Bodd.) . . . . . Japan.
Agropsar sturninus (Pall.) . . . Sibirien.
Temenuchus pagodarum (Gm.), Ostindien.
Graculipica nigricollis (Pagk.) . . . China.
„ melanoptera (Daud.) . . Java.
Acridotheres tristis (L.) . . . Ostindien.
„ melanosternum Legge . . . . . Ceylon.
„ ginginianus (Lath.) . . . . . Ostindien.
Aethiopsar fuscus (Wagler) . Ostindien.
„ javanicus Cab. . . . . Java.
„ grandis Moore . . . . Birma.
„ cristatellus (Gm.) . . . . China.
„ albocinctus Godw.-A . Birma.

Fam. Eulabetidae.

Sarcops calvus (L.) . . . . . Mindanao.
Eulabes religiosa (L.) . . . . . Süd-Indien.
„ javanensis (Osbeck) . . Malakka.
„ intermedia (A. Hay) . Ostindien.
Mino kreffti Scl. . . . . Neu-Pommern.
Hartlaubius auratus (S. Müll.), Madagascar.
Aplonis pacificus (Gm.) . Carolinen-Inseln.
„ cantoroides Gray . . . Deutsch-Neu-Guinea.
„ brevirostris (Peale), Samoa-Inseln.
„ vitiensis Layard . . . Viti-Inseln.
Aplonis fusca Gould . . . Norfolk-Inseln.
„ atrifusca Peale . . Samoa-Inseln.
„ kittlitzi F. & H. . . Insel Ponapé.
Lamprocorax metallica (Temm.), Australien, Neu-Pommern.
„ purpureiceps (Salvad.), Admiralitäts-Inseln.
„ chalybea (Horsf.) . . Sumatra, Borneo.
„ panayensis (Scop.) . . . . . Philippinen.
Lamprotornis caudatus (S. Müll.) . . West-Afrika.
„ porphyropterus Hengl. . . Nordost-Afrika.
Pyrrhochira caffra (L.) . . . . Süd-Afrika.
Amydrus morio (L.). . . . . Süd-Afrika.
Hagiopsar tristrami (Scl.). . . . Palästina.
Lamprocolius splendidus (V.), Goldküste.
„ purpureus (S. Müll.) . . West-Afrika.
„ sycobius Hartl, Massailand.
„ chalcurus (Nordm.) . . . West-Afrika.
„ phoenicopterus (Sws.) . . . . . Kapkolonie.
Spreo bicolor (Gm) . . . . . Süd-Afrika.
„ pulcher (S. Müll.) . . Senegambien.
„ rufiventris (Rüpp.) . . . Erythraea.
Scissirostrum dubium (Lath.), Minahassa.
Creadion carunculatus (Gm.), Neu-Seeland.

Fam. Paramythiidae.

Fam. Buphagidae.

Fam. Oriolidae.

Oriolus galbula (L) . . . . . Deutschland.
„ kundoo Sykes . . . . . Ostindien.
„ diffusus Shp. . . . . China.
„ tennirostris Blyth . Nord-Cachar.
„ maculatus Vieill. . . . . Java.
„ andamanensis T. & B., Andamanen.
„ celebensis (Walden) . Minahassa.
„ acrorhynchus Vig. . . . Mindanao.
„ melanocephalus (L.) . . Ostindien.
„ larvatus Licht. . . . . Kapkolonie.
„ trailli (Vig.) . . . . . Assam.
Mimeta flavicincta (King) . . Queensland.
„ striata (Q. & G.) . . . Deutsch-Neu-Guinea.

Mimeta sagittata (Lath.), Neu-Süd-Wales.
Sphecotheres maxillaris (Lath.) . . Neu-Süd-Wales.
„ flaviventris Gould Kap York.

Fam. Dicruridae.

Dicrurus annectens (Hodgs.) . . . Assam.
Chibia hottentotta (L.) Ostindien, China.
Dicruropsis bracteata (Gould) . . Nord-Queensland.
„ atrocaerulea (Gray) . Batjan.
„ carbonaria (Bp.). Neu-Guinea, Ferguson-Inseln.
„ laemosticta (Scl.) N.-Pommern.
„ leucops Wall. . . Minahassa.
Chaetorhynchus papuensis Meyer Deutsch-Neu-Guinea.
Chaptia aenea (Vieill.) . . . . . Ostindien.
Buchanga atra (Herm.) Ostindien, China.
„ adsimilis (Bechst.) Kapkolonie.
„ longicaudata (Jerd.) Ostindien.
„ nigrescens Oates . . . . Assam.
„ stigmatops Shp. . Nord-Borneo.
„ cineracea (Horsf.) . . . . Pegu.
„ leucogenys Walden . . . China.
„ caerulescens (L.) . . Ostindien.
„ leucopygialis (Blyth) . Ceylon.
Edolius forficatus (L.). . . . Madagascar.
Bhringa remifer (Temm.) . . . . . Assam.
Dissemurus paradiseus (L.) . . . Ostindien.
Dissemurulus lophorhinus (V.) Süd-Indien.

Fam. Paradiseidae.

Craspedophora alberti (Elliot), Kap York.
Paradisea augustae-victoriae Cab. . . . Deutsch-Neu-Guinea.
Phonygama jamesi Shp. . . . Südost-Neu-Guinea.
Manucodia atra (Less.) . Südwest-Neu-Guinea.
„ chalybata (Penn.), Deutsch-Neu-Guinea.
Lycocorax obiensis Bernst. . . . Insel Obi.

Fam. Ptilonorhynchidae.

Lophorina latipennis Rothsch., Deutsch-Neu-Guinea.
Ptilonorhynchus violaceus (V.) . . Neu-Süd-Wales.
Amblyornis inornatus (Schl.), Britisch-Neu-Guinea.
Sericulus chrysocephalus (Lewin) . . . . Neu-Süd-Wales.
Chlamydodera cerviniventris Gould Britisch-Neu-Guinea.
„ maculata Gould . . Neu-Süd-Wales.
„ nuchalis Gould Queensland.
Aeluroedus viridis (Lath.), Neu-Süd-Wales.
„ maculosus Ramsay. Queensland.
„ geislerorum Meyer . Deutsch-Neu-Guinea.

Fam. Corvidae.

Trypanocorax frugilegus (L.), Deutschland.
„ pastinator Gould. . Sibirien.
Heterocorax capensis (Licht.), Süd-Mexiko.
Corvus corax L. . . . . Deutschland.
„ kamtschaticus Dybowski . . . . . Kamtschatka.
„ ussurianus Tacz. . . . . Ussuri.
„ sibiricus Tacz. . . . . Ost-Sibirien.
„ canariensis H. & Kl. . . Teneriffa.
„ tingitanus Irby . . . . . Marokko.
„ lawrencei Hume, Nordwest-Indien.
„ umbrinus Sundev. . . . Aegypten.
„ principalis Ridgw. . . . Grönland.
„ cryptoleucus Couch . . . . . Texas.
„ coronoides V. & H. . . Australien.
„ australis Gould . . . . Australien.
„ macrorhynchus Wagl. . . . . Ostindien, Java.
„ japonensis Bp. . . . . Japan.
„ philippinus Bp. . . . . Cuba.
„ enca (Horsf.) . . . . . Java.
„ torquatus Less. . . . . China.
„ scapulatus Daud. . . . Madagascar.
„ cornix L. . . . . Deutschland.
„ charpei Oates . . . . . Turkestan.
„ capellanus Scl. . . . . Persien.
„ corone L. . . . . Deutschland.
„ orientalis Eversm. . . . . Japan.
„ caurinus Baird . . . . . Oregon.
„ ossifragus Wils. . . . . Östl. Nord-Amerika.
„ splendens Vieill. . . . Ostindien.
„ insolens Hume . . . . . Pegu.
„ brachyrhynchus L. Brehm . . Östl. Nord-Amerika.
„ pascuus Coues . . . . . Florida.
„ mexicanus Gm. . . . . Mexiko.

Corvultur albicollis (Lath.) . . Süd-Afrika.
Coloeus monedula (L.) . . . Deutschland.
„ collaris (Drummond) . . Kaukasus.
„ neglectus (Schl.) . . Mandschurei.
„ dauricus (Pall.) . . . . . Amur.
Rhinocorax affinis (Rüpp.) . . . Palästina.
Physocorax moneduloides (Less.) . . . Neu-Caledonien.
Nucifraga caryocatactes (L.) . . . Ostpreußen, Schweiz.
„ rothschildi Hart. Ost-Turkestan.
„ japonica Hartert . . . . . Japan.
Pica pica (L.) . . . . . Deutschland.
„ bactriana Bp. . . . . Sibirien.
„ hudsonia (Sabine), W. Nord-Amerika.
„ mauritanica Malh. . . . . Algerien.
„ bottanensis Deless. . . . . Thibet.
„ nuttalli (Aud.) . . . . . Kalifornien.
Cyanopolius cyanus (Pall.) . Ost-Sibirien.
„ cooki (Bp) . . . . . Spanien.
Urocissa occipitalis (Blyth) . . . . . Siam.
„ erythrorhyncha (Gm.) . . . China.
„ flavirostris (Blyth) . . . Assam.
Dendrocitta rufa (Scop.) . . . . Ostindien.
„ frontalis Mc Clell. . . Sikkim.
„ leucogaster Gould, Süd-Indien.
„ himalayensis (Blyth) . . . . . Himalaya.
„ sinensis (Lath.) . . . . China.
„ bayleyi (Tytler), Andamanen.
Crypsirhina varians (Lath.), Pegu, Java.
Cissa chinensis (Bodd.) . . . . . Himalaya.
„ thalassina (Temm.) . . . . . Java.
„ ornata (Wagl.) . . . . . Ceylon.
Calocitta colliei (Vig.) . . West-Mexiko.
Garrulus glandarius (L.) . . Deutschland.
„ hyrcanus Blanf. . . Nord-Persien.
„ bambergi Lönnberg. . Mongolei.
„ caspius Seebohm . . . Lenkoran.
„ krynicki Kalenicz. . . Kaukasus.
„ atricapillus Geoffr. . . Palästina.
„ melanocephalus Génée, Smyrna.
„ japonicus Schl. . . . . Japan.
„ brandti Eversm. . . . . Sibirien.
„ cervicalis Bp. . . . . Algerien.
„ bispecularis Vig. . . . Himalaya.
„ sinenis Swinh. . . . . China.
Laletes lanceolatus (Vig.) . . . Himalaya.
Cractes infaustus (L.) . . . . . Lappland.
„ sibiricus (Bodd.) . . Süd-Sibirien.
„ canadensis (L.) . . . . . Kanada.
Cyanocitta cristata (L.) . . . Östl. Nord-Amerika.
„ florincola Coues . . . . Florida.
„ stelleri (Gm.) . . . Kalifornien.
„ diademata (Bp.) . . . Colorado.
„ coronata (Sws.) . . Guatemala.
Aphelocoma cyanea (V.) . . . . . Florida.
„ californica (Vig.), Kalifornien.
„ hypoleuca Ridgw. . . . Süd-Kalifornien.
„ woodhousei (Baird), Montana.
„ arizonae (Ridgw.) . Arizona.
Cyanocorax chrysops (Vieill.) . Paraguay.
„ affinis Pelz . . . . Columbien.
„ mystacalis (Geoffr.), Ecuador.
„ cyanomelas (Vieill.), Paraguay.
„ chilensis (Bp.) . . . Bolivien.
„ caeruleus (Vieill.), Rio Grande.
Xanthura yncas (Bodd.) . . . . Columbien.
„ caeruleocephala (Dubois) . . . . . Venezuela.
„ luxuosa (Less.) . . . . Yucatan.
Cissolopha yucatanica (Dubois) . Yucatan.
„ beecheyi (Vigors), West-Mexiko.
„ melanocyanea (Hartl.) . . . . . Honduras.
Cyanolyca nana Du Bus . . . . . Mexiko.
Cyanocephalus cyanocephalus (Pz. W.) . . Nord-Mexiko.
Psilorhinus morio (Wagl.) . . . . Mexiko.
„ mexicanus Ruepp. . Yucatan.
„ vociferus (Cabot) . . Yucatan.
Struthidea cinerea Gould . . . Australien.
Graculus graculus (L.) . . . . . Spanien.
Pyrrhocorax alpinus Vieill., Griechenland, Schweiz.
Corcorax melanorhamphus (V.), Australien.
Podoces panderi Fischer . . . Turkestan.
„ humilis Hume . . . . . Thibet.

Fam. Streperidae.

Strepera graculina (White) . . Queensland.
„ arguta Gould . . . . Tasmanien.
„ melanoptera Gould, S.-Australien.
„ versicolor (Lath.), Süd-Australien.
„ plumbea Gould, West-Australien.
„ fuliginosa (Gould) . . Tasmanien.

Nach dem Druck vorstehender Kapitel mir noch zugegangene Eier.

Fam. Treronidae.

5781. XXI, 215. **Ducula cuprea (Jerdon)** . . . Süd-Indien (Travancore).
(370) 45×32 mm.

Fam. Falconidae.

5782. I, 255. **Lophotriorchis kieneri (Geoffr.)** Süd-Indien (Travancore).
(1489) Weiß mit kaum sichtbaren violettbraunen Schalenflecken. Nur mattgrünlich durchschimmernd. 65×52 mm

5783 „ 352. **Baza lophotes (Temm.)** . . . . . Assam.
(1525) Gelblichweiß mit braunen Wolken. 38 ×30,5 mm.

5784. „ —. **Baza ceylonensis Legge** . . . . . Ceylon.
(1527) Gelblichweiß mit braunen Wolken. 34,5 ×29 mm.

Fam. Psittacidae.

5785. XX, 501. **Psittinus incertus (Shaw)** . . . . . Malakka.
(1756) 22,5×18 mm.

5786. „ 527. **Loriculus indicus (Gm.)** . . Süd-Indien (Travancore).
(1761a) 22×17 mm.

Fam. Caprimulgidae.

5787 XVI, 586. **Stenopsis decussata (Tsch.)** . . . . . Peru.
(1937) Weiß, etwas rötlich schimmernd. 27×20 mm.

Fam. Cuculidae.

5788. XIX, 262. **Penthoceryx sonnerati Lath.**. . . . . Ostindien.
(2145) Graurötliche Grundfarbe mit helleren und dunkeleren mattrötlichen verwischten motacillaartigen Flecken, die am stumpfen Pole etwas gedrängter stehen, ohne einen Kranz zu bilden. 20,5×16 mm.

5789. XIX, 393. **Rhinortha chlorophaea (Raffl.)** . . . . . Perak.
(2189) Schmutzig gelblichweiß mit gelegentlichen braunen Wolken. Elliptisch. 31×22 mm.

Fam. Capitonidae.

5790. XIX, 50. **Calorhamphus hayi (Gray)** . . . . . Perak.
(2204b) Weiß, gestreckt. 28×11,5 mm.

5791. „ 52. **Megalaema virens (Bodd.)** . . . . . Birma.
(2204c) Weiß, ins gelbliche schimmernd. 29—31 ×21,5—22 mm.

Fam. Tyrannidae.

5792. XIV, 71. **Todirostrum sclateri Berl. & Tacz.** . . . . . Peru.
(2507) Weiß oder mit nur sehr einzelnen und kaum sichtbaren rostbraunen Pünktchen. 15×11,5 mm.

5793. „ 111. **Mionectes striaticollis (d'Orb. & Lafr.)** . . . Peru.
(2528) Weiß. 20×15 mm.

Fam. Campophagidae.

5794. IV, 71. **Pericrocotus speciosus (Lath.)** . . . Nordwest-Indien
(2905a) Bläulichweiße Grundfarbe mit violettgrauen Unter- und aschgrauen bis schwärzlichen gleichmäßig verteilten und wenig markierten Oberflecken. 20,5×15,5 mm. (Murree Hills).

5795. „ 81. **Pericrocotus roseus (Vieill.)** . . . . . Nord-Cachar.
(2910) Weiß mit geringem rötlichen Schimmer. Die gleichmäßig verteilten hellgrauen und graubräunlichen Flecken sind nur wenig markiert und stehen sehr dicht. 18×14.5 mm.

5796. „ 82. **Pericrocotus solaris Blyth** . . . . . Nord-Cachar.
(2910a) Weiß mit grauen und schwarzbraunen meist gleichmäßig verteilten wenig markierten Flecken. 16,5×12,5 mm.

Fam. Pycnonotidae.

5797. VI, 22. **Chloropsis malabarica (Gm.)** . . . . . Süd-Indien.
(2925c) Gelblichweiße Grundfarbe mit sehr verwischten dichtstehenden mattfuchsigen Flecken, welche am stumpfen Pole zu einem Kranze verdichtet sind, unseren Erithacus rubecula nicht unähnlich 22×16 mm.

5798. VI, —. **Criniger burmanicus Oates** . . . . . Birma.
(2948)
Hellrötlichbraune Grundfarbe mit rötlichvioletten bis dunkelkirschbraunen meist gleichmäßig verteilten in die Länge gezogenen und umschatteten Flecken. 27×18 mm.

Fam. Timeliidae.

5799. VII, 352. **Babax lanceolatus (Verr.)** . . . . . Birma.
(3011)
Tief dunkelblau. 28,5×21 mm.

5800. „ 445. **Dryonastes galbanus (Godw. Austen)** . . . Birma.
(3078)
Einfarbig bläulichweiß oder himmelblau. 27—28×20—21 mm.

5801. „ 631. **Yuhina gularis Hodgs.** . . . . . Darjiling.
(3175)
Bläulichgrauer Grund mit gleichmäßig verteilten und mit recht dicht stehenden rostbraunen Fleckchen. 18×13 mm.

5802. „ 113. **Pterythius erythropterus (Vig.)** . . . . . Assam.
(3181)
Weißer bis schmutzigweißer Grund mit violettbraunen unregelmäßigen Unter- und schwarzbraunen Oberflecken, welche am stumpfen Pole kranzartig gehäuft stehen. 22×18 mm.

Fam. Troglodytidae.

5803. VI, 279. **Elachura formosa (Wald.)** = *punctata Blyth* . Sikkim.
(3244)
Einfarbig weiß oder mit sehr feinen violettbraunen Unterflecken und sehr scharf markierten kaum nadelstichgroßen rostbraunen Pünktchen. 18×14 mm.

Fam. Turdidae.

5804. V, 239. **Merula serrana (Tschudi)** . . . . . Peru.
(3318)
Grundfarbe graubläulich mit matt rostbräunlichen sehr dicht stehenden Flecken. 28×20 mm.

5805. „ 251. **Merula bourdilloni Seebohm** . . . . . Süd-Indien.
(3323)
Hellblaugrünlicher Grund mit meist verwischten oder in die Länge gezogenen drosselartigen hell- und rostbraunen gleichmäßig verteilten Flecken. 30,5×22 mm.

5806. „ 252. **Merula kinnisi Blyth** . . . . . Ceylon.
(3323a)
Gelblichweißer ins grünliche spielender Grund mit rostbraunen verwischten meist größeren gleichmäßig verteilten Flecken. 24,5×18,5 mm.

5807. VII, 656. **Tharrhaleus immaculatus (Hodgs.)** . . . . Sikkim.
(3420)
Dunkelblau. 19,5×14 mm.

5808. V, 344. **Phoenicurus hodgsoni Moore** . . . . . Kaschmir.
(3441)
Einfarbig mattblau. 19×14,5 mm.

5809. „ 353. **Adelura caeruleocephala (Vig.)** . . . . . Kaschmir.
(3464)
Rötlichweiße Grundfarbe mit sehr feinen fuchsigen Flecken, welche am stumpfen Pole kranzartig verdichtet sind. In der Färbung unseren Rotkehlchen ähnlich. 19,5×14 mm.

5810. „ 194. **Pratincola leucura Blyth** . . . . . Bhutan.
(3498)
Graurötlicher Grund mit rotbräunlichen Flecken wie die übrigen Pratincola-Arten. 19×14,5 mm.

Fam. Certhiidae.

5811. VIII, 328. **Certhia discolor Blyth** . . . . . Assam.
(3998)
Rötlichweißer Grund mit sehr feinen fuchsigbraunen Fleckchen in verschiedenen Nuancen, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen. 15,5×12 mm.

5812. „ —. **Certhia hodgsoni Brooks,** Nordwest-Indien (Murree Hills).
(2999)
Wie vorige gefärbt.

Fam. Nectariniidae.

5813. IX, 25. **Aethopyga ignicauda (Hodgs.)** . . . . . Assam.
(4067)
Weiß mit sehr feinen zarten violettrötlichen und braunen Pünktchen, welche am stumpfen Pole einen Kranz bilden. 15×11 mm.

5814. „ 115. **Anthothreptes longuemarei (Less.)** . . Elfenbeinküste.
(4111)
Sehr dunkel, nahezu schwarzbraun, mit einzelnen tiefschwarzen Stricheln am stumpfen Pole und sonstigen feinen Haarlinien. 18×13 mm.

Fam. Fringillidae.

5815. XII, 100. **Sporophila simplex (Tacz.)** . . . . . Peru.
(4425a)
Bläulichgrauer Grund mit schwarzen, schwarzbraunen und gelblichgrauen zum Teil sehr großen unregelmäßigen Flecken. 19×13 mm.

5816. „ 383. **Sycalis luteiventris (Meyer)** . . . . . Peru.
(4581)
Weiße bis bläulichweiße Grundfarbe mit roströtlichen und mattbräunlichen meist markierten Flecken, welche am stumpfen Pole gehäuft stehen oder einen Kranz bilden. 18—19×13 mm.

5817. „ 397. **Haematospiza indica (Gm.)** = *sipahi (Hodgs.)* . Assam.
(4581a)
Grünlichweißer Grund mit wenigen meist markierten hell- und dunkelrostbraunen Flecken, welche hauptsächlich am stumpfen Pole stehen. 19,5×16 mm.

5818. XII, 453. **Pyrrhula nipalensis Hodgs.** . . . . . Darjiling.
(4601a)
Hellgraue Grundfarbe mit rötlichvioletten Unter- und rostbraunen bis schwarzen Oberflecken und Schnörkeln. 20×14,5 mm.

5819. „ 566. **Tisa (Fringillaria) variabilis (Temm.)** . . . Japan.
(4641)
Sehr hellgrauer Grund mit verwischten meist in die Länge gezogenen graugelben helleren und dunkleren lerchenartigen, mithin sehr dicht stehenden Flecken, welche am stumpfen Pole dichter stehen und zuweilen auch einen Kranz bilden. 22×16 mm.

Fam. Tanagridae.

5820. XI, 55. **Chlorophonia torrejoni Tacz.** . . . . . Peru.
(4787)
Weiß mit feinen rostbraunen und wenigen eingesprengten violettbraunen schwalbenartigen Flecken. 19×13 mm.

5821. „ 217. **Eucometis penicillata (Spix)** . . . . . Peru.
(4840)
Weiß bis gelblichgraue Grundfarbe. Die sehr dicht stehenden fuchsigbraunen, grauen und sehr wenig schwärzlichen Flecken sind ganz gleichmäßig verteilt. 25—27×19 mm.

Fam. Eulabetidae.

5822. XIII, 109. **Eulabes ptilogenys (Blyth)** . . . . . Ceylon.
(5140)
Dunkelhimmelblau mit sehr matten rötlichbraunen einzelnen großen unregelmäßigen Flecken, welche am stumpfen Pole kranzartig zusammenstehen. 31×22 mm.

Druck von Albert Limbach, Braunschweig.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00313686 8
nhbird QL675.N39
Nachtr?age zu Nehrkorn's Eierkatalog /